

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

04.02.2005

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 10 2004 018 117.9

Anmeldetag: 14. April 2004

Anmelder/Inhaber: Dr. Per Sonne Holm ,
82256 Fürstenfeldbruck/DE

Bezeichnung: Neue Adenoviren, dafür codierende
Nukleinsäuren und deren Verwendung

IPC: C 12 N 15/33

BEST AVAILABLE COPY

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 28. Januar 2005
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Stanschus

BOHMANN & LOOSEN

Anwaltssozietät

BOHMANN & LOOSEN, Sonnenstr. 8, 80331 München

Deutsches Patent- und Markenamt

80297 München

Patentanwalt – European Patent Attorney
Dr. Armin K. Bohmann, Dipl.-Biol.*¹

Rechtsanwalt
Peter Loosen, LL.M.²

*Zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Markenamt, Alicante
Professional Representation at the Community Trademark Office, Alicante

Zustelladresse:
Sonnenstr. 8
D-80331 München

Unser Zeichen
Our ref

H 10020

Ihr Zeichen
Your ref

Neuanmeldung
(Patent)

Datum
Date

München, 14. April 2004

Dr. Per Sonne Holm, Meisenstr. 27, 82256 Fürstenfeldbruck

Neue Adenoviren, dafür codierende Nukleinsäuren und deren Verwendung

Die Erfindung betrifft Adenoviren, dafür codierende Nukleinsäuren und Verwendung derselben, insbesondere zur Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung von Tumoren.

Bei der Behandlung von Tumoren werden derzeit eine Vielzahl von Therapiekonzepten verfolgt. Neben der Verwendung chirurgischer Techniken stehen dabei die Chemotherapie und die Strahlentherapie im Vordergrund. All diese Techniken sind jedoch für den Patienten mit nicht unerheblichen Nebenwirkungen verbunden. Mit der Verwendung von replikationsselektiven onkolytischen Viren wurde eine neue Plattform für die Behandlung von Tumoren geschaffen. Dabei wird eine selektive intratumorale Replikation eines viralen Agens herbeigeführt, die in der Folge zur Virusreplikation, Lyse der infizierten Tumorzelle und Verbreitung des Virus auf benachbarte Tumorzellen führt. Infolge der Beschränkung der Replikationsfähigkeit des Virus auf Tumorzellen bleibt normales Gewebe von der Replikation und damit der Lyse durch das Virus verschont.

¹Sonnenstr. 8 • D-80331 München • Tel.: 089/ 51 55 64 0 • FAX: 089/ 51 55 64 13 • e-mail: BOHMANN-LAW@t-online.de

²Schaafenstr. 43 • D-50676 Köln •

Derzeit finden verschiedene virale Systeme in klinischen Studien mit dem Ziel der Tumorlyse Anwendung. Ein Beispiel für einen derartigen Adenovirus ist dl1520 (Onyx-015), der bereits erfolgreich in den klinischen Phasen I und II eingesetzt wurde (Khuri, F. et al. *Nature Medicine* 6, 879-885, 2000). Onyx-015 ist ein Adenovirus, bei dem das E1B-55kDa-Gen vollständig deletiert ist. Die vollständige Deletion des E1B55kDa-Proteins des Adenovirus beruht dabei auf der Beobachtung, dass im adenoviralen Vektor die Replikation und somit die Lyse von Zellen mit defektem p53 möglich ist (Kim, D. et al., *Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.* 17, 391a, 1998), wobei normale Zellen nicht geschädigt werden. Genauer ist das E1B-55kDa-Genprodukt beteiligt an der Inhibierung von p53, dem Transport viraler mRNA und dem Abschalten der Proteinsynthese der Wirtszelle. Die Inhibierung von p53 erfolgt dabei durch Ausbilden eines Komplexes aus p53 und dem adenoviral codierten E1B-55kDa Protein und/oder Komplex bestehend aus E1B-55kDa und E4orf6. Von p53, codiert von TP53, geht ein komplexer regulatorischer Mechanismus aus (Zambetti, G.P. et al., *FASEB J.* 7, 855-865, 1993), der u.a. auch dazu führt, dass eine effiziente Replikation von Viren wie Adenoviren in der Zelle unterdrückt wird. Das Gen TP 53 ist in etwa 50 % aller menschlichen Tumoren deletiert oder mutiert mit der Folge, dass es zu keiner – erwünschten – Apoptose infolge einer Chemotherapie oder einer Bestrahlungstherapie kommt und damit der Erfolg dieser Tumorbehandlungen im Normalfall unterbleibt.

Ein weiteres Konzept tumorlytischer Viren beruht auf der Beobachtung, dass wenn das E1A-Protein in einer bestimmten Weise deletiert vorliegt bzw. eine oder mehrere Mutationen aufweist, welche die Bindung von Rb/E2F und/oder p107/E2F und/oder p130/E2F nicht beeinflussen, solche Adenoviren den Eintritt der infizierten Zellen in die S-Phase nicht induzieren und zur Replikation in Tumorzellen befähigt sind, die kein funktionelles Rb-Protein aufweisen. Zudem kann das E1A-Protein am N-Terminus deletiert vorliegen bzw. eine oder mehrere Mutationen im Bereich der Aminosäurepositionen 1 bis 76 des E1A-Proteins umfassen, um die Bindung von E1A an p300 zu unterbinden, um somit eine selektivere Replikation in Tumorzellen zu bewerkstelligen. Diese Vorgehensweisen sind beispielhaft beschrieben in dem europäischen Patent EP 0 931 830. Beispiele derartiger Adenoviren sind AdΔ24, dl922 – 947, E1Ad/01/07 und CB016 (Howe, J. A. et al., *Molecular Therapy* 2, 485-495, 2000; Fueyo, J. et al., *Oncogene* 19, 2-12, 2000; Heise, C. et al., *Nature Medicine* 6, 1134-1139, 2001; Balague, C. et al., *J. Virol.* 75, 7602-7611, 2001). Diese im Stand der Technik bekannten adenoviralen Systeme zur Onkolyse weisen somit bestimmte Deletionen im E1A Protein auf, wobei diese

Deletion vorgenommen worden war unter der Annahme, dass intakte Rb-Proteine bzw. Komplex bestehend aus intaktem Rb-Protein und E2F einer effiziente Replikation in vivo entgegenwirken würden und um eine adenovirale Replikation in vivo nur in Rb-negativen/mutierten Zellen sicher zu stellen. Diese adenoviralen Systeme nach dem Stand der Technik gehen auf E1A zurück, um mittels des frühen E2-Promotors (engl. E2 early Promotor) und freiem E2F die in vivo Replikation zu steuern (Dyson, N. *Genes & Development*, 12, 2245-2262, 1998).

Eine weitere Form von tumorlytischen adenoviralen Systemen beruht auf dem Einsatz selektiver Promotoren, um das virale Onkogen E1A spezifisch zu exprimieren, was eine selektive Replikation in Tumorzellen erlaubt (Rodriguez, R. et al., *Cancer Res.* 57, 2559-2563, 1997).

Wie vorstehend beschrieben kommt es bei den verschiedenen Konzepten adenoviraler tumorlytischer Viren auf die Auswahl eines für das dem jeweiligen Konzept zugrundeliegenden Wirkmechanismus geeigneten zellulären Hintergrundes an. Mit anderen Worten, die verschiedenen derzeit bekannten adenoviralen Systeme zur Tumorlyse können nur bei Vorliegen bestimmter molekularbiologischer Voraussetzungen angewandt werden. Dies beschränkt die Anwendung derartiger Systeme auf bestimmte Patientenkollektive.

Ein besonderes Problem bei der Behandlung von Tumorerkrankungen stellt sich dann ein, wenn die Patienten eine sogenannte klassische Vielfachresistenz (engl. multidrug resistance (MDR)) entwickeln, die eine besonders gut untersuchte Resistenzform von Tumoren gegenüber Zytostatika darstellt (Gottesman und Pastan, *Annu. Rev. Biochem.* 62, 385-427, 1993). Sie beruht auf der Überexpression des membranständigen Transportproteins P-Glykoprotein, das zu den sogenannten ABC-Transportern gehört (Stein, U. et al., *JBC* 276, 28562-69, 2001, J. Wijnholds, *Novartis Found Symp.*, 243, 69-79, 2002). Bargou, R. C. et al. und Oda, Y. et al (Bargou, R. C. et al., *Nature Medicine* 3, 447-450, 1997; *Clin. Cancer Res.* 4, 2273-2277, 1998) konnten zeigen, dass die Kernlokalisation des humanen Transkriptionsfaktors YB-1 unmittelbar an der Aktivierung der Expression des P-Glykoproteins beteiligt ist. Weitere Untersuchungen belegen, dass YB-1 durch verschiedene Streßbedingungen in den Zellkern gelangt, wie z.B. UV-Bestrahlung, Zytostatika-Applikation (Koike, K. et al., *FEBS Lett* 17, 390-394, 1997) und Hyperthermie (Stein, U. et al., *JBC* 276, 28562-69, 2001). Weitere Untersuchungen belegen, dass die nukleäre Lokalisation von YB-1 einen Einfluss auf einen weiteren

ABC-Transporter ausübt. Dieser ABC-Transporter wird als MRP (engl. multidrug resistance-related protein) bezeichnet und ist mit der Ausbildung des sogenannten atypischen, nicht P-Glykoprotein-abhängigen Vielfachresistenz beteiligt (Stein, U. et al., JBC 276, 28562-69, 2001).

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine technische Lehre und insbesondere ein Mittel bereitzustellen, welches erlaubt, einen Organismus, speziell einen menschlichen Organismus bzw. ein Patientenkollektiv spezifisch mit tumorlytisch wirkenden Agenzien zu behandeln. Weiterhin ist es eine der vorliegenden Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe, ein Mittel bereitzustellen, welches geeignet ist, bei Patienten mit Tumorerkrankungen eine Tumorlyse herbeizuführen, die gegenüber Zytostatika resistent sind, insbesondere solche, die eine Vielfachresistenz zeigen. Schließlich ist es eine der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, einen Adenovirus bereitzustellen, der für die Zelllyse geeignet ist.

In einem ersten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, der ein erstes Protein, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die ein E1B-Protein und ein E4-Protein umfasst, vor einem zweiten Protein, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die ein E1A-Protein umfasst, exprimiert.

In einer Ausführungsform des ersten Aspektes ist vorgesehen, dass das erste Protein ein E1B-Protein, bevorzugterweise ein E1B55kD-Protein ist.

In einer weiteren Ausführungsform des ersten Aspektes ist vorgesehen, dass das erste Protein ein E4-Protein, bevorzugterweise ein E4orf6-Protein ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform des ersten Aspektes ist vorgesehen, dass das erste Protein eine Kombination aus E1B-Protein und E4-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein und E4orf6-Protein ist.

In einer bevorzugteren Ausführungsform des ersten Aspektes ist vorgesehen, dass das E1A-Protein ein E1A12S-Protein ist.

In einem zweiten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, wobei der Adenovirus mindestens eine Nukleinsäure umfasst, die für ein Protein codiert, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die E1B-Proteine, E4-Proteine und E1A-Proteine umfasst, wobei das mindestens ein Protein unter der Kontrolle eines Promotors steht, der verschieden ist von dem Promotor, der die Expression des Proteins in einem Wildtyp-Adenovirus steuert.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein Adenovirus nach dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das mindestens ein Protein ein E1B-Protein, bevorzugterweise ein E1B55kD-Protein ist.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das mindestens ein Protein ein E4-Protein, bevorzugterweise ein E4orf6-Protein ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das mindestens ein Protein ein E1A-Protein, bevorzugterweise ein E1A12S-Protein ist.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das mindestens ein Protein eine Kombination aus E1B-Protein und E4-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein und E4orf6-Protein ist.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das mindestens ein Protein eine Kombination aus E1B-Protein und E1A-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein und E1A12S-Protein ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das mindestens ein Protein eine Kombination aus E4-Protein und E1A-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E4orf6-Protein und E1A12S-Protein ist.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das mindestens ein Protein eine Kombination aus E1B-Protein, E4-Protein und E1A-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein, E4orf6-Protein und E1A12S-Protein ist.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Expression des E1B-Proteins von einem Promotor gesteuert wird, wobei der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der adenovirale Promotor verschieden ist von dem E1B-Promotor.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Expression des E4-Proteins von einem Promotor gesteuert wird, wobei der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der adenovirale Promotor verschieden ist von dem E4-Promotor.

In einer bevorzugten Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der adenovirale Promotor der E1A-Promotor ist.

In einer Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Expression des E1A-Proteins von einem Promotor gesteuert wird, wobei der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der adenovirale Promotor verschieden ist von dem E1A-Promotor.

In einer bevorzugten Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der die Expression des E1A-Proteins steuernde Promotor YB-1-gesteuert oder YB-1-regulierbar ist.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der die Expression des E1A-Proteins steuernde Promotor der adenovirale E2-late-Promotor ist.

In einer Ausführungsform des ersten und zweiten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das E4-Protein, bevorzugterweise das E4orf6-Protein, und das E1B-Protein, bevorzugterweise das

E1B55kD-Protein, unter der Kontrolle eines gleichen oder eines gemeinsamen Promotors stehen.

In einem dritten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, wobei der Adenovirus das Protein YB-1 durch mindestens ein adenovirales Protein im Zellkern bereitstellt oder die Bereitstellung von YB-1 im Zellkern durch mindestens ein adenovirales Protein vermittelt, wobei bevorzugterweise das adenovirale Protein verschieden ist von E1A.

In einer Ausführungsform des dritten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein Adenovirus gemäß dem ersten und/oder dem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist.

In einem vierten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, wobei der Adenovirus das Protein YB-1 durch mindestens ein adenovirales Protein für die adenovirale Replikation bereitstellt oder die Bereitstellung von YB-1 für die adenovirale Replikation durch mindestens ein adenovirales Protein vermittelt, wobei bevorzugterweise das adenovirale Protein verschieden ist von E1A

In einer Ausführungsform des vierten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein Adenovirus gemäß dem ersten und/oder zweiten und/oder dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist.

In einer Ausführungsform des dritten und vierten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass das adenovirale Protein ein Komplex aus E4orf6 und E1B55kD ist.

In einem fünften Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, wobei der Adenovirus eine Nukleinsäure umfasst und die Nukleinsäure des Adenovirus zumindest eine funktional inaktive adenovirale Region aufweist, wobei die Region ausgewählt ist aus der Gruppe, die die E1-Region, die E3-Region, die E4-Region und Kombinationen davon umfasst.

In einer Ausführungsform des fünften Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein Adenovirus gemäß dem ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist.

In einer Ausführungsform des fünften Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Region die E1-Region ist.

In einer Ausführungsform des fünften Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Region die E3-Region ist.

In einer Ausführungsform des fünften Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Region die E4-Region ist.

In einer Ausführungsform des fünften Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Region die E1-Region, die E3-Region und die E4-Region umfasst.

In einem sechsten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, wobei der Adenovirus mindestens eine Expressionskassette umfasst, wobei die Expressionskassette mindestens einen Promotor und eine für ein adenovirales Protein codierende Nukleinsäure umfasst, wobei das adenovirale Protein ein E1B-Protein, bevorzugterweise ein E1B55kD-Protein ist.

In einer Ausführungsform des sechsten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein Adenovirus gemäß dem ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung ist.

In einer Ausführungsform des sechsten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor verschieden ist von dem E1B-Promotor.

In einer Ausführungsform des sechsten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der Promotor verschieden ist vom E1B-Promotor.

In einem siebten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, wobei der Adenovirus mindestens eine Expressionskassette umfasst, wobei die Expressionskassette mindestens einen Promotor und eine für ein adenovirales Protein codierende Nukleinsäure umfasst, wobei das adenovirale Protein ein E4-Protein, bevorzugterweise ein E4orf6-Protein ist.

In einer Ausführungsform des siebten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein Adenovirus gemäß dem ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist.

In einer Ausführungsform des siebten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor verschieden ist von dem E4-Promotor.

In einer Ausführungsform des siebten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei die adenoviralen Promotoren verschieden sind von dem E4-Promotor.

In einer Ausführungsform des sechsten und siebten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor der E1A-Promotor ist.

In einem achten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Adenovirus, wobei der Adenovirus mindestens eine Expressionskassette umfasst, wobei die Expressionskassette mindestens einen Promotor und eine für ein adenovirales Protein codierende Nukleinsäure umfasst, wobei das adenovirale Protein ein E1A-Protein, bevorzugterweise ein E1A12S-Protein ist.

In einer Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein Adenovirus gemäß dem ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist.

In einer Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor verschieden ist von dem E1A-Promotor.

In einer Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus eine Nukleinsäure umfasst, wobei die Nukleinsäure für YB-1 codiert.

In einer bevorzugten Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die für YB-1 codierende Nukleinsäure unter der Kontrolle eines Promotors steht, wobei der Promotor bevorzugterweise der E2-late-Promotor ist.

In einer Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die für YB-1 codierende Nukleinsäure unter der Kontrolle eines Promotors steht, wobei der Promotor YB-1 abhängig ist bzw. YB-1-reguliert ist.

In einer Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die für YB-1 codierende Nukleinsäure ein Teil der Expressionskassette umfassend eine für ein E1A-Protein codierende Nukleinsäure ist, bevorzugterweise eine für ein E1A 12S-Protein codierende Nukleinsäure ist.

In einer Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die für das E1A-Protein codierende Nukleinsäure von der für das YB-1 codierende Nukleinsäure durch eine IRES-Sequenz voneinander getrennt sind.

In einer Ausführungsform des sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die für das E4-Protein, bevorzugterweise das E4orf6-Protein, codierende Nukleinsäure und die für das E1B-Protein, bevorzugterweise das E1B55kD-Protein, codie-

rende Nukleinsäure in einer Expressionskassette enthalten sind, wobei bevorzugterweise die beiden codierenden Sequenzen durch eine IRES-Sequenz voneinander getrennt sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform des achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Promotor der Expressionskassette ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei die adenoviralen Promotoren verschieden sind von dem E4-Promotor und verschieden sind von dem E1B-Promotor, bevorzugterweise verschieden sind von dem Wildtyp-E4-Promotor und verschieden sind von dem Wildtyp-E1B-Promotor.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus eine Expressionskassette umfassend einen Promotor und eine Nukleinsäuresequenz umfasst, wobei die Nukleinsäuresequenz ausgewählt ist aus der Gruppe, die Aptamere, Ribozyme, Aptazyme, Antisense-Moleküle und siRNA umfasst.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus eine Expressionskassette umfassend einen Promotor und eine Nukleinsäuresequenz umfasst, wobei die Nukleinsäuresequenz eine codierende Nukleinsäure ist, wobei die Nukleinsäure für ein Molekül codiert, das ausgewählt ist aus der Gruppe, die Peptide, Polypeptide, Protein, Antikaline, Antikörper und Antikörperfragmente umfasst.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus eine Expressionskassette umfassend einen Promotor und eine Nukleinsäuresequenz umfasst, wobei die Nukleinsäuresequenz ausgewählt ist aus der Gruppe, die Apoptoseinduzierende Gene, Prodrug-Gene, Protease-Inhibitoren, Tumorsuppressorgene, Zytokine und Angiogenese-Inhibitoren umfasst.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus ein rekombinanter Adenovirus ist.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus eine Adenovirusmutante ist.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus replikationsdefizient ist.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus replikationsfähig ist in Zellen, die dereguliertes YB-1 aufweisen oder die YB-1 im Zellkern aufweisen.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass die Zellen YB-1 Zellzyklus-unabhängig YB-1 im Kern aufweisen.

In einer Ausführungsform des ersten und/oder zweiten und/oder dritten und/oder vierten und/oder fünften und/oder sechsten und/oder siebten und/oder achten Aspektes ist dabei vorgesehen, dass der Adenovirus kein E1A13S-Protein umfasst und/oder der Adenovirus keine für ein E1A13S-Protein codierende Nukleinsäure umfasst.

In einem neunten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch eine Nukleinsäure codierend für einen Adenovirus nach einem der Aspekte eins bis acht.

In einem zehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch ein Replikationssystem umfassend eine Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt und eine Nukleinsäure eines Helfervirus, wobei die Nukleinsäure des Helfervirus eine oder mehrere der Expressionskassetten des Adenovirus nach einem der Aspekte eins bis acht umfasst.

In einer Ausführungsform des zehnten Aspektes ist vorgesehen, dass dem Adenovirus oder der diesen codierenden Nukleinsäure die vom Helfervirus umfasste Expressionkassette fehlt.

In einem elften Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Vektor umfassend eine Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt und/oder ein Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt.

In einer Ausführungsform des elften Aspektes ist vorgesehen, dass der Vektor ein Expressionsvektor ist

In einem zwölften Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch eine Zelle umfassend einen Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht und/oder eine Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt und/oder ein Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt und/oder einen Vektor gemäß dem elften Aspekt.

In einer Ausführungsform des zwölften Aspektes ist vorgesehen, dass die Zelle eine eukaryontische Zelle, bevorzugterweise eine tierische Zelle, bevorzugterweise eine Säugtierzelle ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform des zwölften Aspektes ist vorgesehen, dass die Säugtierzelle eine Zelle ist, die ausgewählt ist aus der Gruppe, die Zellen von Mäusen, Ratten, Meerschweinchen, Schweinen, Schafen, Ziegen, Rindern, Pferden, Hunden, Katzen und Menschen.

In einem dreizehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Organismus, bevorzugterweise ein Säugetierorganismus umfassend einen Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, eine Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, ein Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, einen Vektor gemäß dem achten Aspekt oder eine Zelle gemäß dem zwölften Aspekt, wobei bevorzugterweise der Organismus ausgewählt ist aus der Gruppe, die Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde, Hunden und Katzen umfasst.

In einem vierzehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch eine Verwendung eines Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, einer Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, ein Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, einen Vektor gemäß dem achten Aspekt oder eine Zelle gemäß dem zwölften Aspekt zur Replikation von Adenovirus, bevorzugterweise zur in vitro Replikation von Adenovirus.

In einem fünfzehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch eine Verwendung eines Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, einer Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, ein Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, einen Vektor gemäß dem achten Aspekt oder eine Zelle gemäß dem zwölften Aspekt zur Herstellung von Adenovirus, bevorzugterweise zur in vitro Herstellung von Adenovirus.

In einem sechzehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch eine Verwendung eines Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, einer Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, ein Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, einen Vektor gemäß dem achten Aspekt oder eine Zelle gemäß dem zwölften Aspekt zur Expression von Genen, bevorzugterweise von Genen, die die Zelllyse fördern, bevorzugterweise die Zelllyse bei adenoviraler Replikation und/oder adenoviral vermittelter Zelllyse fördern.

In einer bevorzugten Ausführungsform des sechzehnten Aspektes sind die exprimierten Gene Transgene, wie hierin offenbart.

In einem siebzehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch eine Verwendung eines Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, einer Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, ein Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, einen Vektor gemäß dem achten Aspekt oder eine Zelle gemäß dem zwölften Aspekt zur Herstellung eines Medikamentes.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem vierzehnten bis siebzehnten Aspekten der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Zelle, in der der Adenovirus repliziert oder replizieren soll, YB-1 im Kern aufweist, bevorzugterweise YB-1 Zellzyklus-unabhängig im Kern aufweist.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem vierzehnten bis siebzehnten Aspekten der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Zelle, in der der Adenovirus repliziert oder replizieren soll, dereguliertes YB-1 aufweist.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass das Medikament für die Behandlung von Tumorerkrankungen ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Tumorerkrankung ausgewählt ist aus der Gruppe, die maligne Erkrankungen, Krebs, Krebserkrankungen und Tumoren umfasst.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Tumoren ausgewählt sind aus der Gruppe, die solide, nichtsolide, maligne und benigne Tumoren umfasst.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen YB-1 im Kern aufweist, bevorzugterweise YB-1 Zellzyklus-unabhängig im Kern aufweist.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen dereguliertes YB-1 aufweist.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen Rb-positiv oder Rb-negativ ist.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen eine Resistenz, bevorzugterweise eine Mehrfachresistenz gegen pharmakologische Wirkstoffe aufweisen.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Resistenz eine Mehrfachresistenz ist.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Resistenz gegen Antitumormittel, bevorzugterweise gegen Zytostatika, gerichtet ist und/oder die Resistenz durch Bestrahlung bedingt wird.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass der Patient, für den das Medikament bestimmt ist, eine Mehrzahl von Zellen aufweist, wobei die Zellen solche Zellen sind, wie in den verschiedenen Ausführungsformen betreffend die Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung beschrieben.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass das Medikament mindestens ein weiteres pharmazeutisch aktives Mittel umfasst.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass das Medikament zusammen mit einem weiteren pharmazeutisch aktiven Mittel verabreicht wird oder werden soll.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass das weitere pharmazeutische Mittel ausgewählt ist aus der Gruppe, die Zytokine, Metalloproteinase-Inhibitoren, Angiogenese-Inhibitoren, Zytostatika, Tyrosinkinase-Inhibitoren und Zellzyklus-Inhibitoren umfasst.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass das Medikament vor, während oder nach einer Bestrahlung verabreicht wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Bestrahlung zum Zwecke der Behandlung eines Tumors verabreicht wird.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Zelle oder der zu behandelnde Organismus einer Maßnahme unterzogen wird, wobei die Maßnahme aus der Gruppe ausgewählt ist, die Bestrahlung, Gabe von Zytostatika und Hyperthermie umfasst.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Maßnahme lokal oder systemisch angewandt wird.

In einer Ausführungsform der Verwendung gemäß dem siebzehnten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Bestrahlung mit energiereicher Strahlung erfolgt, bevorzugterweise mit einer Strahlung, wie sie bei der Behandlung von Tumorerkrankungen verwendet wird.

In einem achtzehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch die Verwendung eines Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, einer Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, eines Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, eines Vektor gemäß dem elften Aspekt oder einer Zelle gemäß dem zwölften Aspekt, zur Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung einer Tumorerkrankungen, dadurch gekennzeichnet, dass die Tumorerkrankung ausgewählt ist aus der Gruppe, die Brusttumore, Knochentumore, Magentumore, Darmtumore, Gallenblasentumore, Bauspeicheldrüsentumore, Lebertumore, Nierentumore, Gehirntumore, Eierstocktumore, Haut- und Hautanhangsorgantumore, Kopf-/Nackentumore, Gebärmuttertumore, Synovialtumore, Kehlkopftumore, Speiseröhrentumore, Zungentumore und Prostata Tumore, bevorzugterweise eine der vorstehenden Tumorerkrankungen, die wie in einer der vorangehenden Ausführungsformen beschrieben ausgebildet ist.

In einem neunzehnten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch die Verwendung eines Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, einer Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, eines Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, eines Vektor gemäß dem elften Aspekt oder einer Zelle gemäß dem zwölften Aspekt, zur Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung einer Tumorerkrankungen, bevorzugterweise einer Tumorerkrankung wie im Zusammenhang mit dem achtzehnten Aspekt beschrieben, wobei der tu-

mor-spezifische Promotor ein solcher Promotor ist, der spezifisch ist für den Tumor, für den das Medikament verwendet wird.

In einem zwanzigsten Aspekt wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch die pharmazeutische Zusammensetzung umfassend einen Adenovirus gemäß einem der Aspekte eins bis acht, einer Nukleinsäure gemäß dem neunten Aspekt, eines Replikationssystem gemäß dem zehnten Aspekt, eines Vektor gemäß dem elften Aspekt oder einer Zelle gemäß dem zwölften Aspekt, und optional ein pharmazeutisch geeignetes Trägermittel.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe in einem einundzwanzigsten Aspekt gelöst durch die Verwendung eines Virus, bevorzugterweise eines Adenovirus, zur Herstellung eines Medikaments, wobei der Virus replikationsdefizient ist in normalen Zellen, die YB-1 nicht im Kern aufweisen, die YB-1 nicht zellzyklusunabhängig im Kern aufweisen bzw. die kein dereguliertes YB-1 aufweisen, und der Virus für ein Onkogen oder Onkogenprodukt, insbesondere ein Onkogenprotein, codiert, das zumindest ein virales Gen in YB-1 Kern-positiven Zellen, bevorzugterweise ein adenovirales Gen, transaktiviert, wobei das Gen ausgewählt ist aus der Gruppe, die E1B55kDa, E4orf6, E4orf3 und E3ADP umfasst. Bevorzugterweise exprimiert der Virus die viralen Proteine E1B55kD, hierin auch als E1B55kDa bezeichnet, und E4orf6.

In einem zweiundzwanzigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch die Verwendung eines Virus, bevorzugterweise eines Adenovirus, zur Replikation in Zellen, die YB-1 im Kern aufweisen, wobei der Virus replikationsdefizient ist in Zellen, die YB-1 nicht im Kern aufweisen, oder die YB-1 nicht zellzyklusunabhängig im Kern aufweisen oder die kein dereguliertes YB-1 aufweisen, und der Virus für ein Onkogen oder Onkogenprodukt, insbesondere ein Onkogenprotein, codiert, das zumindest ein virales Gen, bevorzugterweise ein adenovirales Gen, transaktiviert, wobei das Gen ausgewählt ist aus der Gruppe, die E1B55kDa, E4orf6, E4orf3 und E3ADP umfasst.

In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass der Virus, insbesondere der Adenovirus, in Zellen repliziert, die YB-1 im Kern aufweisen, oder die YB-1 nicht zellzyklusunabhängig im Kern aufweisen oder die kein dereguliertes YB-1 aufweisen.

In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprotein E1A ist und/oder das Onkogen das für E1A codierende Gen und/oder das Onkogenprotein E1A ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprotein E1A zur Bindung eines funktionellen Rb-Tumorsuppressor-Genprodukts fähig ist.

In einer alternativen Ausführungsform ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprotein E1A zur Bindung eines funktionellen Rb-Tumorsuppressor-Genprodukts nicht fähig ist.

In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass das virale Onkoprotein E1A nicht die nukleäre Lokalisation von YB-1 induziert.

In einer noch weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass das Medikament für Patienten bestimmt ist, deren Zellen Rb-positiv oder Rb-negativ sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass die Zellen diejenigen Zellen sind, die an der Ausbildung des Zustandes beteiligt sind, der mit dem Medikament beeinflusst werden soll.

In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass die Zellen Rb-negativ und im Zellkern YB-1 positiv, insbesondere unabhängig vom Zellzyklus im Zellkern YB-1 positiv sind.

In einer noch weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass das Medikament für die Behandlung von Tumoren ist.

In einer noch weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass die Zellen, insbesondere die den Tumor oder Teile davon ausbildenden Zellen eine Resistenz, insbesondere Mehrfachresistenz gegen pharmakologische Wirkstoffe, bevorzugter Weise Antitumormittel und bevorzugterweise Zytostatika, aufweisen.

In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass die Zellen eine Expression, bevorzugterweise eine Überexpression des membranständigen Transportproteins P-Glykoprotein und/oder von MRP zeigen.

In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass die Zellen p53-positiv oder p53-negativ sind.

In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass das Onkogenprotein gegenüber dem Wildtyp-Onkogenprotein E1A eine oder mehrere Mutationen oder Deletionen aufweist, wobei die Deletion bevorzugt eine solche ist, die ausgewählt ist aus der Gruppe, die Deletionen des Bereichs CR3 und Deletionen des N-Terminus und Deletionen des C-Terminus umfasst. Dabei ist vorgesehen, dass das E1A-Onkogenprotein an Rb binden kann.

In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass das Onkogenprotein gegenüber dem Wildtyp-Onkogenprotein eine oder mehrere Mutationen oder Deletionen aufweist, wobei die Deletion bevorzugt eine solche in der CR1-Region und/oder der CR2-Region ist. Dabei ist vorgesehen, dass das Onkogenprotein E1A nicht an Rb zu binden in der Lage ist.

In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprotein, insbesondere E1A, unter der Kontrolle eines Gewebes- und/oder Tumor-spezifischen Promotors steht.

In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass der Virus, insbesondere der Adenovirus, für YB-1 codiert.

In einer noch weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass YB-1 unter der Kontrolle eines Gewebe- und/oder Tumor-spezifischen Promotors steht.

In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass der Virus, insbesondere der Adenovirus, für mindestens ein Protein codiert, das ausgewählt ist aus der Gruppe, die E4orf6, E4orf3, E1B55K und adenovirales E3ADP-Protein umfasst.

In einer alternativen Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass die Zellen YB-1 im Kern aufweisen, insbesondere die den Tumor oder einen Teil davon ausbildenden Zellen YB-1 im Kern aufweisen.

In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass der Tumor YB-1 im Kern nach Induktion des Transports von YB-1 in den Kern enthält.

In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass der Transport von YB-1 in den Kern ausgelöst wird durch zumindest eine Maßnahme, die ausgewählt ist aus der Gruppe, die Bestrahlung, Gabe von Zytostatika und Hyperthermie umfasst.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass die Maßnahme an einer Zelle, einem Organ oder einem Organismus angewandt wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt ist vorgesehen, dass der Virus, insbe-

sondere der Adenovirus, ausgewählt ist aus der Gruppe, die Ad Δ 24, dl922-947, E1Ad/01/07, dl1119/1131, CB 016, dl520, und Viren, denen ein exprimiertes virales E1A-Onkogen fehlt, das zur Bindung eines funktionellen Rb-Tumorsuppressor-Genprodukts fähig ist, umfasst.

In einem dreiundzwanzigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch die Verwendung eines Virus, insbesondere des Adenovirus, zur Herstellung eines Medikaments, wobei der Virus, insbesondere der Adenovirus, so ausgebildet ist, dass die Replikation durch oder vermittelt YB-1 über die Aktivierung des E2-Late-Promotors gesteuert wird, bevorzugterweise überwiegend über die Aktivierung des E2-Late-Promotors gesteuert wird. In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das YB-1 entweder ein transgenes YB-1 ist oder ein zelluläres, insbesondere zelluläres dereguliertes oder dereguliertes YB-1 ist. Unter einem transgenen YB-1 wird dabei bevorzugterweise ein solches verstanden, das durch einen Vektor, insbesondere einen oder den Adenovirus in einer Zelle zur Expression gebracht wird. Bei dem E2-Late-Promotor handelt es sich bevorzugterweise um den adenoviralen E2-Late-Promotor, wie er im Wildtyp-Adenovirus vorhanden ist, oder um einen E2-Late-Promotor, wie er im Zusammenhang mit der Expression von Transgenen hierin beschrieben verwendet wird.

In einem vierundzwanzigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch die Verwendung eines Virus, insbesondere der Adenovirus, zur Replikation in Zellen, die YB-1 im Kern aufweisen, wobei der Virus, insbesondere der Adenovirus, so ausgebildet ist, dass die Replikation durch YB-1 über die Aktivierung des E2-Late-Promotors gesteuert wird, bevorzugterweise überwiegend über die Aktivierung des E2-Late-Promotors gesteuert wird. In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das YB-1 entweder ein transgenes YB-1 ist oder ein zelluläres, insbesondere zelluläres dereguliertes oder dereguliertes YB-1 ist. Unter einem transgenen YB-1 wird dabei bevorzugterweise ein solches verstanden, das durch einen Vektor, insbesondere einen oder den Adenovirus in einer Zelle zur Expression gebracht wird. Bei dem E2-Late-Promotor handelt es sich bevorzugterweise um den adenoviralen E2-Late-Promotor, wie er im Wildtyp-Adenovirus vorhanden ist, oder um einen E2-Late-Promotor, wie er im Zusammenhang mit der Expression von Transgenen hierin beschrieben verwendet wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform des dreiundzwanzigsten und/oder vierundzwanzigsten Aspekts der vorliegenden Erfindung ist der Adenovirus so ausgebildet wie hierin offenbart, insbesondere so, wie er ausgestaltet ist, um erfindungsgemäß verwendet zu werden.

In einem fünfundzwanzigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch ein virales Onkogenprotein, insbesondere ein isoliertes virales Onkogenprotein, wobei dieses die folgenden Eigenschaften aufweist:

- a) Transaktivierung mindestens eines viralen Gens in YB-1 Kern-positiven Zellen, das ausgewählt ist aus der Gruppe, die E1B-55K, E3ADP und E4orf6 und E4orf3 umfasst; und
- b) keine Induktion von YB-1 in einem Zellkern, insbesondere in dem Zellkern der Zelle, in der das virale Onkoprotein vorhanden ist.

In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass das virale Onkoprotein E1A ist.

In einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprotein gegenüber dem Wildtyp-Onkogenprotein eine oder mehrere Mutationen oder Deletionen aufweist, wobei die Deletion bevorzugt eine solche ist, die ausgewählt ist aus der Gruppe, die Deletion des Bereichs CR3, Deletion des N-Terminus und Deletion des C-Terminus umfasst.

In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Induktion von YB-1 durch das virale Onkogenprotein unterbleibt, wenn E4orf6 und/oder E1B 55 kD nicht in der den Zellkern aufweisenden Zelle vorhanden ist/sind.

Dabei ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprodukt an Rb zu binden in der Lage ist.

In einer alternativen Ausführungsform ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprotein eine oder mehrerer Mutationen oder Deletionen aufweist, wobei die Deletion bevorzugt eine solche in der CR1-Region und/oder der CR2-Region des E1A-Onkogenproteins ist. Dabei ist vorgesehen, dass das virale Onkogenprotein nicht in der Lage ist an Rb zu binden.

In einem sechszwanzigsten Aspekt betrifft die Erfindung die Verwendung eines viralen Replikationssystems, insbesondere eines adenoviralen Replikationssystems, umfassend eine Nukleinsäure, die für einen Virus, insbesondere einen Adenovirus, wie er erfindungsgemäß verwendet wird, codiert, und umfassend eine Nukleinsäure eines Helfervirus, wobei die Nukleinsäure des Helfervirus eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die für YB-1 codiert.

In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die virale Nukleinsäure, insbesondere die adenovirale Nukleinsäure, und/oder die Nukleinsäure des Helfervirus als replizierbarer Vektor vorliegt.

In einem siebenundzwanzigsten Aspekt betrifft die Erfindung die Verwendung einer Nukleinsäure codierend für einen Virus, insbesondere einen Adenovirus, wie er erfindungsgemäß verwendet wird, zur Herstellung eines Medikamentes, insbesondere zur Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung von Tumoren.

In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Zellen, insbesondere die den Tumor oder Teile davon ausbildenden Zellen, eine Resistenz, insbesondere eine Mehrfachresistenz gegen pharmakologische Wirkstoffe, bevorzugterweise Antitumormittel, und bevorzugterweise Zytostatika, aufweisen.

In einem achtundzwanzigsten Aspekt betrifft die Erfindung die Verwendung einer Nukleinsäure, die für einen Virus, insbesondere einen Adenovirus, wie er erfindungsgemäß verwendet wird, codiert, zur Replikation in Zellen, die YB-1 im Kern aufweisen, wobei der Virus replikationsdefizient ist in Zellen, die YB-1 nicht im Kern aufweisen, oder YB-1 nicht zellzyklusunabhängig im Kern aufweisen oder die kein dereguliertes YB-1 aufweisen, und der Virus für ein Onkogen oder Onkogenprodukt codiert, das zumindest ein virales Gen, bevorzugterweise ein adenovirales Gen transaktiviert in YB-1 Kern-positiven Zellen, wobei das Gen ausgewählt ist aus der Gruppe, die E1B55kDa, E4orf6, E4orf3 und E3ADP umfasst.

In einem neunundzwanzigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch die Verwendung einer Nukleinsäure, die für einen Virus, insbesondere einen Adenovirus, wie er erfindungsgemäß verwendet wird, codiert zur Herstellung eines Medikamentes, wobei der Virus so ausgebildet ist, dass die Replikation durch YB-1 über die Aktivierung des E2-Late-Promotors gesteuert

wird, bevorzugterweise überwiegend über die Aktivierung des E2-Late-Promotors. In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das YB-1 entweder ein transgenes YB-1 ist oder ein zelluläres, insbesondere zelluläres dereguliertes oder dereguliertes YB-1 ist. Unter einem transgenen YB-1 wird dabei bevorzugterweise ein solches verstanden, das durch einen Vektor, insbesondere einen oder den Adenovirus in einer Zelle zur Expression gebracht wird. Bei dem E2-Late-Promotor handelt es sich bevorzugterweise um den adenoviralen E2-Late-Promotor, wie er im Wildtyp-Adenovirus vorhanden ist, oder um einen E2-Late-Promotor, wie er im Zusammenhang mit der Expression von Transgenen hierin beschrieben verwendet wird.

In einem dreißigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch die Verwendung einer Nukleinsäure, die für einen Virus, insbesondere einen Adenovirus, wie er erfindungsgemäß verwendet wird, codiert, zur Replikation in Zellen, wobei der Virus so ausgebildet ist, dass die Replikation durch YB-1 über die Aktivierung des E2-Late-Promotors gesteuert wird, bevorzugterweise überwiegend über die Aktivierung des E2-Late-Promotors gesteuert wird. In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass das YB-1 entweder ein transgenes YB-1 ist oder ein zelluläres, insbesondere zelluläres dereguliertes YB-1 ist. Unter einem transgenen YB-1 wird dabei bevorzugterweise ein solches verstanden, das durch einen Vektor, insbesondere einen oder den Adenovirus in einer Zelle zur Expression gebracht wird. Bei dem E2-Late-Promotor handelt es sich bevorzugterweise um den adenoviralen E2-Late-Promotor, wie er im Wildtyp-Adenovirus vorhanden ist, oder um einen E2-Late-Promotor, wie er im Zusammenhang mit der Expression von Transgenen hierin beschrieben verwendet wird.

In einem einunddreißigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch die Verwendung eines Vektors umfassend eine der vorstehend beschriebenen Nukleinsäure, zur Verwendung gemäß dem einundzwanzigsten oder zweiundzwanzigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung.

In einem zweiunddreißigsten Aspekt betrifft die Erfindung die Verwendung eines mit YB-1 wechselwirkenden Mittels zur Charakterisierung von Zellen, Zellen eines Tumorgewebes oder Patienten, um zu bestimmen, ob diese(r) mit einem Virus, insbesondere einem Adenovirus, wie er erfindungsgemäß verwendet wird, kontaktiert und/oder behandelt werden sollen.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Mittel ausgewählt ist aus der Gruppe, die Antikörper, Antikaline, Aptamere, Aptazyme und Spiegelmere umfasst.

In einem dreiunddreißigsten Aspekt wird die Aufgabe gelöst durch die Verwendung des erfindungsgemäßen viralen Onkogenproteins oder einer dafür codierenden Nukleinsäure zur Herstellung eines Virus, insbesondere eines Adenovirus, wie er im Rahmen der Verwendungen gemäß dem einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung verwendet wird.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass der Virus eine für ein Transgen codierende Nukleinsäure umfasst.

In einer weiteren Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass der Virus das Translations- und/oder das Transkriptionsprodukt eines Transgens umfasst.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass die Nukleinsäure des adenoviralen Replikationssystems und/oder die Nukleinsäure des Helfervirus ein Transgen oder eine für ein Transgen codierende Nukleinsäure umfasst.

In einer noch weiteren Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass die Nukleinsäure ein Transgen oder eine für ein Transgen codierende Nukleinsäure umfasst.

In einer alternativen Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Transgen ausgewählt ist aus der Gruppe, die Prodruggene, Zytokine, Apoptose-induzierende Gene, Tumorsuppressorgene, Gene für Metalloproteinasen-Inhibitoren und Gene für Angiogenese-Inhibitoren und Tyrosinkinase-Inhibitoren umfasst.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Transgen ausgewählt ist aus der Gruppe, die Nukleinsäuren für siRNA, für Aptamere, für Antisense-Moleküle und für Ribozyme umfasst, wobei die siRNA, die Aptamere, die Antisense-Moleküle und/oder die Ribozyme gegen ein Zielmolekül gerichtet ist.

In einer weiteren Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Zielmolekül ausgewählt ist aus der Gruppe, die Resistenz-relevante Faktoren, Anti-Apoptose-Faktoren, Onkogene, Angiogenese-Faktoren, DNA-Synthese-Enzyme, DNA-Reparaturenzyme, Wachstumsfaktoren und deren Rezeptoren, Transkriptionsfaktoren, Metalloproteinasen, insbesondere Matrix-Metalloproteinasen, und Plasminogenaktivator vom Urokinase-Typ umfasst. In einer Ausführungsform sind die Resistenz-relevanten Faktoren bevorzugt aus der Gruppe ausgewählt, die P-Glykoprotein, MRP und GST umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die Anti-Apoptose-Faktoren ausgewählt aus der Gruppe, die BCL2 umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die Onkogene ausgewählt aus der Gruppe, die Ras, insbesondere mutiertes Ras, Rb und Myc umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die Angiogenese-Faktoren ausgewählt aus der Gruppe, die VEGF und HMG-Proteine umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die DNA-Synthese-Enzyme ausgewählt aus der Gruppe, die Telomerase umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die DNA-Reparaturenzyme ausgewählt aus der Gruppe, die Ku-80 umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die Wachstumsfaktoren ausgewählt aus der Gruppe, die PDGF, EGF und M-CSF umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Rezeptoren insbesondere solche der Wachstumsfaktoren sind, wobei bevorzugterweise die Wachstumsfaktoren aus der Gruppe ausgewählt sind, die PDGF, EGF und M-CSF umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die Transkriptionsfaktor ausgewählt aus der Gruppe, die YB-1 umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die Metalloproteinasen insbesondere Matrix-Metalloproteinasen. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Matrix-Metalloproteinasen ausgewählt aus der Gruppe, die MMP-1 und MMP-2 umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren. In einer Ausführungsform sind die Plasminogenaktivatoren vom Urokinase-Typ ausgewählt aus der Gruppe, die uPa-R umfasst, und umfassen auch die dafür codierenden Nukleinsäuren.

In einer noch weiteren Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Medikament weiterhin mindestens eine pharmazeutisch wirksame Verbindung enthält.

In einer bevorzugten Ausführungsform eines jeglichen Aspektes der vorliegenden Erfindung ist dabei vorgesehen, dass die pharmazeutisch wirksame Verbindung ausgewählt ist aus der Gruppe, die Zytokine, Metalloproteinase-Inhibitoren, Angiogenese-Inhibitoren, Cytostatika und Zellzyklus-Inhibitoren und Tyrosinkinase-Inhibitoren umfasst.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Medikament eine Kombination von mindestens zwei Mittel umfasst, wobei ein jedes Mittel einzeln und unabhängig aus der Gruppe ausgewählt ist, die Cytostatika umfasst.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens zwei der Mittel an unterschiedlichen Zielmolekülen angreifen.

In einer alternativen Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens zwei der Mittel über einen unterschiedlichen Wirkmechanismus aktiv sind.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens ein Mittel die Infizierbarkeit einer Zelle erhöht, in der das Virus repliziert.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens ein Mittel die Verfügbarkeit einer Komponente der Zelle beeinflusst, bevorzugterweise die Verfügbarkeit der Komponente erhöht, wobei die Komponente die Aufnahme des Virus vermittelt.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens ein Mittel den Transport von YB-1 in den Zellkern vermittelt, bevorzugterweise erhöht.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens ein Mittel ein Histon-Deacylase-Inhibitor ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, der Histon-Deacylase-Inhibitor aus der Gruppe ausgewählt ist, die Trichostatin A, FR 901228, MS-27-275, NVP-LAQ824 und PXD101 umfasst.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens ein Mittel aus der Gruppe ausgewählt ist, die Trichostatin A, FR 901228, MS-27-275, NVP-LAQ824 und PXD101 umfasst.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens ein Mittel ein Topoisomerase-Inhibitor ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, der Topoisomerase-Inhibitor aus der Gruppe ausgewählt ist, die Camptothecin, Irinotecan, Topotecan, DX-8951f, SN-38, 9-aminocamptothecin, 9-nitrocamptothecin umfasst.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Mittel Trichostatin A und Irinotecan umfasst.

In einer Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass der Virus, insbesondere der Virus gemäß einem der Aspekte der vorliegenden Erfindung, getrennt von den mindestens zwei Mittel ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass mindestens eine Einheitsdosis des Virus von mindestens einer Einheitsdosis von einem oder den mindestens zwei Mitteln getrennt ist.

In einem vierundreißigsten Aspekt betrifft die Erfindung einen Kit umfassend einen Virus, insbesondere einen Virus nach einem der Aspekte der vorliegenden Erfindung, und mindestens zwei Mittel, wobei ein jedes Mittel einzeln und unabhängig aus der Gruppe ausgewählt ist, die Cytostatika umfasst.

Die vorstehend offenbarten erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere jene, wie sie im Zusammenhang mit den Aspekten eins bis acht der vorliegenden Erfindung beschrieben werden, werden hierin auch als Adenoviren der Gruppe I bezeichnet, und die Adenoviren, die ein transaktivierendes Onkogenprotein aufweisen, wie beispielsweise E1A, und/oder die hierin und insbesondere vorstehend als erfindungsgemäß verwendet bezeichnet werden, werden hierin auch als Adenoviren der Gruppe II bezeichnet. Adenoviren der Gruppe I und der Grup-

pe II werden hierin auch insgesamt als Adenoviren oder als erfindungsgemäße Adenoviren oder erfindungsgemäße Viren bezeichnet.

Der vorliegenden Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass die Umkehrung der Reihenfolge der Expression von adenoviralen Genen zu einer effizienten Replikation und gegebenenfalls zu einer Lyse der von dem Adenovirus infizierten Zelle führt. Dabei ist hinsichtlich der zeitlich geänderten Expressierung der adenoviralen Gene besonders auf ein E1B-Protein und ein E4-Protein abzustellen, die hierin auch als erstes Protein einzeln bzw. zusammen bezeichnet werden, die vor einem zweiten Protein exprimiert werden. Das zweite Protein ist aus der Gruppe ausgewählt, die E1A-Proteine umfasst. Mit dieser Umkehrung der Expressionsreihenfolge gegenüber Wildtyp-Adenoviren, bei denen zuerst ein E1A-Protein exprimiert wird und erst dann das E1B-Protein und ein E4-Protein, wird gewährleistet, dass Transkriptionsfaktoren aktiviert werden, beispielsweise in den Zellkern der infizierten Zelle transportiert werden und dort das weitere replikative Geschehen von Adenoviren beeinflussen oder steuern. Die Kinetik der adenoviralen Transkripte in Adenoviren vom Wildtyp ist beispielsweise beschrieben in Glenn G. M. und Ricciardi R. P. Virus Research 1988, 9, 73-91, die berichten, dass die E1A-Transkripte, d. h. das E1A12S-Transkript und das E1A13S-Transkript im Wildtyp normalerweise vor den Transkripten bzw. Translationsprodukten E4orf6 und E1B55k detektierbar sind. Bei dem einen E1B-Protein handelt es sich im vorliegenden Falle und auch insgesamt hierin sofern nichts Gegenteiliges angegeben wird, bevorzugterweise um das E1B-55kD-Protein. Bei einem E4-Protein handelt es sich im vorliegenden Falle und auch insgesamt hierin sofern nichts Gegenteiliges angegeben wird, bevorzugterweise um das E4orf6-Protein. Bei dem E1A-Protein handelt es sich im vorliegenden Falle und auch insgesamt hierin sofern nichts Gegenteiliges angegeben wird, bevorzugterweise um ein E1A12DS-Protein oder um ein solches E1A-Protein, wie es hierin im Zusammenhang mit dem E1A-modifizierten Adenoviren offenbart ist.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass das E1A-Protein, insbesondere auch das E1A12S-Protein grundsätzlich substituierbar ist. Derartige substituierte E1A-Proteine bzw. E1A12S-Proteine werden hierin, sofern nicht anders angegeben, auch als E1A-Protein bzw. E1A12S-Protein bezeichnet bzw. sollen von diesem Begriff mit umfasst sein. Anstelle des E1A12S-Proteins kann auch ein E1A-Protein verwendet werden, welches eine Tumorsuppressorfunktion aufweist, wie beispielweise beschrieben bei Dickopp A, Esche H, Swart G, See-

ber S, Kirch HC, Opalka B. Cancer Gene Ther. 2000, Jul;7(7):1043-50. Weitere Derivate von E1A-Proteinen, insbesondere E1A12S-Protein, wie hierin verwendet und/oder als solche bezeichnet, sind auch allgemein solche Proteine, die in der Lage sind, den Faktor E2F aus dem Komplex Rb/E2F freizusetzen. Dazu gehören, unter anderem, Simian virus 40 tumor antigen (SV40 large T-Antigen), Papillomavirus E7 Protein (HPV E7), wie beschrieben von Chellappan S. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1992, 89, 4549-4533.

Es ist auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass Derivate von E4orf6 und E1B55k verwendet werden, wobei die Bezeichnung E4orf6 und E1B55k, wie hierin verwendet, diese Derivate umfasst. Die Derivate sind beispielsweise beschrieben in Shen Y et al., J. of Virology 2001, 75, 4297-4307; Querido E. et al., J. of Virology 2001, 75, 699-709.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass ein E1B-Protein vor dem E1A-Protein exprimiert wird, oder dass ein E4-Protein vor einem E1A-Protein exprimiert wird, oder sowohl ein E1B-Protein als auch ein E4-Protein vor dem E1A-Protein, jeweils wie vorstehend beschrieben, exprimiert wird.

Ein solchermaßen ausgestaltetes Adenovirus weist insbesondere bei Infektion einer Zelle, die YB-1 im Kern exprimiert, insbesondere zellzyklusunabhängig im Kern exprimiert, oder ein dereguliertes YB-1 aufweist, insbesondere im Zytoplasma aufweist, ein besonders hohes Maß an Replikationsfähigkeit auf. Ohne im Folgenden darauf festgelegt sein zu wollen, geht der vorliegende Erfinder davon aus, dass unter dem Einfluss des vor einem E1A-Protein exprimierten E1B-Protein und/oder E4-Protein, ein Komplex aus E1B-Protein und E4-Protein bzw. einzelne dieser beiden Proteine, in der Lage sind, dereguliertes YB-1 in den Zellkern zu transportieren und dort die Replikation von Adenovirus zu initiieren. Einmal im Zellkern bzw. dort in aktivierter Form vorliegend, kann YB-1, wie hierin beschrieben, insbesondere über den E2-late-Promotor die Replikation wirksam durchführen. Durch die zeitlich vorgezogene Expression eines E1B-Proteins und/oder eines E4-Proteins wird somit vermieden, dass die beim Wildtyp beobachtete Kaskade mit initialer Expression von E1A-Protein erfolgt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das E1A-Protein dabei ein solches, welches insbesondere auf das E1B-Protein und/oder das E4-Protein nicht mehr oder nur mehr schwach transaktivierend wirkt. Bevorzugterweise ist die Transaktivierung nicht ausreichend, um eine effiziente Replikation zu gewährleisten, auch keine Replikation in Zellen, die YB-1 nicht im Zellkern

aufweisen. Dabei ist bevorzugt, dass die Transaktivierung nicht erfolgt in Zellen, die Zellzyklus-unabhängig YB-1 im Zellkern nicht aufweisen bzw. kein dereguliertes YB-1 aufweisen.

Weiterhin liegt der vorliegenden Erfindung die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass ein Adenovirus zu einer besonders effizienten Replikation dann befähigt ist, wenn dieser mindestens eine Nukleinsäure umfasst, die für ein Protein codiert, wobei das Protein ausgewählt ist aus der Gruppe, die E1B-Proteine, E4-Proteine und E1A-Proteine umfasst, und dass mindestens ein Protein davon unter der Kontrolle eines Promotors steht, der verschieden ist von dem Promotor, der die Expression des jeweiligen Proteins in einem Adenovirus vom Wildtyp steuert. Eine derartige Replikation erfolgt besonders effizient und führt in der Regel zur Tumorkylyse bei solchen Zellen, die YB-1 im Kern aufweisen, insbesondere zellzyklusunabhängig YB-1 im Kern aufweisen, oder dereguliertes YB-1, insbesondere dereguliertes YB-1 im Zytoplasma aufweisen. Hinsichtlich der E1B-Proteine, E4-Proteine und E1A-Proteine gilt das vorstehend Gesagte betreffend deren Ausgestaltung. In Adenoviren vom Wildtyp steht das E1B-Protein unter der Kontrolle des E1B-Promotors, das E4-Protein unter der Kontrolle des E4-Promotors und das E1A-Protein unter der Kontrolle des E1A-Promotors steht. Durch Auswahl von Promotoren, die verschieden sind von denjenigen, die in Adenoviren vom Wildtyp die Expression der vorstehend genannten Proteine steuern, wird die Expression der vorgenannten Proteine und damit das regulatorische Zusammenspiel der einzelnen adenoviralen Nukleinsäuren und Proteine verändert. Durch Auswahl der Promotoren kann somit ein anderes zeitliches Expressionsmuster bedingt werden, welches, ohne im Folgenden darauf festgelegt sein zu wollen, zu der beobachteten Replikation in Zellen führt, wobei der Mechanismus derjenige sein kann, wie er vorstehend hinsichtlich der zeitlich unterschiedlichen Expression der adenoviralen Proteine E1B, E4 und E1A bereits beschrieben ist. Ein Beispiel für die konkrete Ausgestaltung der Kontrolle der besagten Proteine durch andere Promotoren als jene, die die Expression des jeweiligen Proteins in einem Wildtyp-Adenovirus steuern, ergeben sich unter anderem aus den Unteransprüchen und aus dem Beispielsteil, wobei hier insbesondere die darin als XVirPSJL1 und XVirPSJL2 bezeichneten Viren beispielhaft hierfür genannten sein sollen. Bevorzugterweise handelt es sich bei dem E1B-Protein um das E1B55kD-Protein, bei dem E4-Protein um das E4orf6-Protein und bei dem E1A-Protein um das E1A12S-Protein.

Die Promotoren, unter die bevorzugterweise das E1B-Protein ebenso wie das E4-Protein gestellt werden, sind ausgewählt aus der Gruppe, die tumorspezifische Promotoren, organspezi-

fische Promotoren, gewebespezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst unter der Voraussetzung, dass bei Verwendung adenoviraler Promotoren diese verschieden sind von dem E1B-Promotor im Falle der Expressionskontrolle des E1B-Proteins und verschieden sind von dem E4-Promotor im Falle der Expressionskontrolle des E4-Proteins. Besonders bevorzugt ist dabei die Verwendung des E1A-Promotors für die Expressionskontrolle des E1B-Proteins und/oder des E4-Proteins. Der E1A-Promotor wird beispielsweise beschrieben von Boulanger P. A. und Blair, G. E. Biochem. J. 1991, 275, 281-299. Darüber hinaus ist auch die Verwendung eines jeglichen anderen heterologen Promotors, d. h. eines Promotors möglich, der verschieden ist von demjenigen, der die Expression des jeweiligen Proteins in einem Adenovirus vom Wildtyp kontrolliert. Beispielhaft sei hier der CMV-Promotor angeführt, wobei den Fachleuten auf dem Gebiet weitere Promotoren offensichtlich sein werden.

Der Promotor, der zur Steuerung des E1A-Proteins verwendet wird, kann ebenfalls ausgewählt sein aus der Gruppe, die tumorspezifische Promotoren, organspezifische Promotoren, gewebespezifische Promotoren, heterologe und adenovirale Promotoren umfasst, unter der Voraussetzung, dass der adenovirale Promotor verschieden ist von dem E1A-Promotor. Es ist dabei im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass ein oder mehrere der vorstehend genannte Proteine, d. h. des E1B-Proteins, des E4-Proteins oder des E1A-Proteins unter der Kontrolle jeweils des gleichen Promotors sind, wobei jedoch bevorzugt ist, dass insbesondere das E1B-Protein und das E4-Protein unter der Kontrolle des gleichen Promotors steht. Besonders bevorzugt ist es, dass das E1A-Protein in seiner Expression durch einen YB-1-gesteuerten oder durch YB-1 regulierbaren Promotor gesteuert wird. Derartige Promotoren sind hierin im Zusammenhang mit anderen Aspekten der vorliegenden Erfindung offenbart. Besonders bevorzugt ist dabei die Verwendung des adenoviralen E2-late-Promotors für die Expressionssteuerung des E1A-Promotors, da dieser zum einen durch YB-1 regulierbar ist und zum anderen bei Abwesenheit von YB-1 nur eine geringe Transkription zeigt, die praktisch vernachlässigbar ist, so dass eine sehr gute Expressionskontrolle des unter der Kontrolle des E2-late-Promotors stehende Nukleinsäure gewährleistet wird. Dies erhöht, insbesondere bei Anwendung im medizinischen Bereich, die biologische Sicherheit ganz erheblich.

Weiterhin hat der vorliegende Erfinder erkannt, dass Adenoviren in Zellen besonders gut replizieren, die YB-1 im Zellkern aufweisen, insbesondere zellzyklusunabhängig YB-1 im Zell-

kern aufweisen und/oder dereguliertes YB-1, bevorzugterweise dereguliertes YB-1 im Cytoplasma, aufweisen, wenn YB-1 für die Replikation direkt oder indirekt bereitgestellt wird, insbesondere im Zellkern bereitgestellt wird oder die Bereitstellung von YB-1 durch ein adenovirales Protein direkt oder indirekt vermittelt wird, wobei dieses adenovirale Protein verschieden ist von E1A. Dieser Aspekt der vorliegenden Erfindung unterscheidet sich insoweit von dem ebenfalls hierin offenbarten Aspekt, dass durch Verwendung von transaktivierenden E1A-modifizierten Adenoviren, bevorzugterweise der Adenoviren der Gruppe II, eine Replikation dieser Viren in YB-1-Kern-positiven Tumorzellen, insbesondere YB-1-Zellzyklus-unabhängig-Kern-positiven Tumorzellen, und solche, die dereguliertes YB-1, insbesondere im Cytoplasma aufweisen, replikationsfähig sind, insoweit, als die transaktivierenden Eigenschaften des E1A-Proteins, insbesondere des E1A13S-Proteins hier, d.h. im Zusammenhang mit den Adenoviren der Gruppe I nicht genutzt werden und vielmehr in einer bevorzugten Ausführungsform das E1A13S-Protein funktional inaktiv ist und somit die Transaktivierung auch von E4orf6 und E1B55kD nicht mehr bewerkstelligen kann, die für den Transport von YB-1 bzw. die Bereitstellung von YB-1 im Zellkern direkt oder indirekt beteiligt ist, mit der Folge, dass eine effektive Replikation des Adenovirus, gemäß diesem Aspekt der vorliegenden Erfindung nicht mehr erfolgt. Insoweit erfolgt die Bereitstellung von YB-1 im Zellkern bzw. Bereitstellung von YB-1 für die adenovirale Replikation nun nicht mehr unter der Kontrolle oder direkten oder indirekten Beteiligung des E1A-Proteins, sondern durch ein E1A-unkontrolliertes Expressieren des E1B-Proteins, insbesondere E1B55kD-Proteins und/oder des E4-Proteins, insbesondere des E4orf6-Proteins.

Diese Ausgestaltung des Adenovirus kann dabei auch durch eine der vorstehend beschriebenen Maßnahmen bereitgestellt werden, beispielsweise dadurch, dass die zeitliche Reihenfolge der Expression des E1B-Proteins und/oder des E4-Proteins gegenüber der Expression des E1A-Proteins vorgezogen wird, oder indem eines oder mehrere der E1B-Proteine, E4-Proteine und E1A-Proteine unter die Kontrolle eines Promotors gestellt wird, der verschieden ist von dem Promotor, der die Expression des jeweils infragestehenden Proteins in einem Wildtyp-Adenovirus steuert.

Schließlich geht der vorliegende Erfinder weiterhin von der überraschenden Erkenntnis aus, dass eine effektive wirksame adenovirale Replikation auch dann erfolgen kann, insbesondere in Zellen, die YB-1 im Zellkern aufweisen, insbesondere Zellzyklus-unabhängig YB-1 im

Zellkern aufweisen, oder dereguliertes YB-1, insbesondere im Cytoplasma, aufweisen, wenn zumindest eines der E1B-Proteine, E4-Proteine und E1A-Proteine, insbesondere deren bevorzugte Formen davon, in einer Expressionskassette unter der Kontrolle eines Promotors exprimiert werden. Dabei ist es im Rahmen einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, dass grundsätzlich drei Expressionskassetten mit jeweils einem einzelnen der besagten Proteine bereitgestellt werden. In einer dazu alternativen Ausführungsform kann eine Expressionskassette auch zwei oder mehrere der Proteine E1B, E4 und E1A bzw. deren Derivate oder möglichen Substitute, besonders im Falle des E1A12S umfassen. Es ist dabei hinsichtlich der Ausprägung der verschiedenen Proteine und der jeweils verwendeten Promotoren grundsätzlich das gleiche anwendbar, wie vorstehend ausgeführt unter dem Aspekt, dass die Adenoviren Nukleinsäuren betreffend die Proteine E1B, E4 und E1A aufweisen. Bei Verwendung derartiger Expressionskassetten ist dabei bevorzugt, wenn die im Genom des Wildtyp-Adenovirus vorkommenden, zu den jeweiligen Proteinen der Expressionskassetten korrespondierenden Proteine bzw. die dafür codierende Nukleinsäure entsprechend vollständig oder teilweise deletiert sind, um zu gewährleisten, dass der Virus stabil ist und Rekombinationen, zumindest in größerem Umfang, vermieden werden.

Die Expressionskassetten können dabei grundsätzlich in jeden Bereich bzw. an jeder Stelle des Adenovirus einkloniert werden, wobei bevorzugterweise eine oder mehrere der Kassetten einzeln oder in Kombination miteinander in die E1-Region, die E3-Region und/oder die E4-Region des Virus eingefügt werden. Dabei können die Nukleinsäuren der E1-, E3- und E4-Region vollständig deletiert werden, teilweise deletiert werden, oder auch gar nicht deletiert werden, wobei jedoch hinsichtlich der erfindungsgemäßen Adenoviren bevorzugt ist, dass die Nukleinsäure, die für das E1A13S-Gen codiert, inaktiviert oder deletiert ist, so dass kein transaktivierendes E1A-Protein durch den Adenovirus bereitgestellt wird. Der Umfang der Deletion in einer oder mehreren der Regionen E1, E3 und E4 wird bestimmt durch die verwendeten Expressionskassetten und gegebenenfalls weitere eingefügte Fremdgene oder Transgene bzw. der diese umfassenden weiteren Expressionskassetten, d. h. Gene, die verschieden sind von adenoviralen Genen, zumindest verschieden sind in dem Sinne, dass sie in dem regulatorischen Kontext der adenoviralen Nukleinsäuren im Wildtyp-Adenovirus oder der Abfolge der adenoviralen Nukleinsäuren im Wildtyp-Adenovirus an dieser Stelle nicht vorgesehen sind. Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die in einer oder mehreren der Expressionskassetten enthaltenen, für ein E1B-Protein, ein E4-Protein und/oder ein E1A-Protein

codierenden Nukleinsäure(n) im adenoviralen Genom teilweise oder vollständig deletiert ist/sind. In einer Ausführungsform, beispielsweise dem erfindungsgemäßen Adenovirus XvirPSJL 1 oder 2, ist die adenovirale, für E4orf6 codierende Nukleinsäure teilweise deletiert, die vollständige dafür codierende Nukleinsäure jedoch in der Expressionskassette enthalten. Gleiches wird bevorzugterweise für das E1B55k- (auch als E1 55Kd)-Protein unbd/oder das E1A 12S-Protein realisiert sein. Das Ausmaß der Deletion ist dabei in bevorzugten Ausführungsformen so zu wählen, dass maximal eine Packungsgröße von etwa 103 % der maximalen Packungsgröße des Adenovirus vom Wildtyp erreicht wird, obwohl diese Grenze lediglich eine bevorzugte Grenze ist. Die vorzunehmenden möglichen Deletionen im adenoviralen Genom sind dabei lediglich einer Beschränkung in bevorzugten Ausführungsformen insoweit unterworfen, als dass gewährleistet sein muss, dass noch infektiöse und verpackte Partikel hergestellt werden können. Das genaue Ausmaß der Deletionen kann dabei durch die Fachleute auf dem Gebiet auf der Grundlage der hierin gegebenen Offenbarung im Rahmen von Standardversuchen bestimmt werden.

Als Ausgangspunkt für die Konstruktion der hierin beschriebenen Adenoviren kann dabei ein jegliches Adenovirus vom Wildtyp, aber auch andere Adenoviren, verwendet werden, sofern sie gemäß der technischen Lehre der vorliegenden Erfindung ausgebildet werden. Besonders bevorzugt wird dabei zurückgegriffen auf die Adenoviren der Subgruppe C und innerhalb dieser Gruppe wiederum auf Adenovirus 2 und Adenovirus 5.

Die Begriffe E1B-Protein und E1B-Proteins, E4-Protein und E4-Proteine sowie E1A-Protein und E1-Proteine werden hierin synonym verwendet, sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist.

Wie hierin verwendet bezeichnet der Begriff „dereguliertes“ YB-1 ein YB-1 Molekül oder YB-1-Protein wie hierin beschrieben, das in einer Form vorliegt, das quantitativ und/oder qualitative verschieden ist von YB-1, wie es normalerweise in Zellen, bevorzugterweise in Nicht-Tumorzellen vorliegt. Ein dereguliertes YB-1 kann dadurch charakterisiert werden und als solches identifiziert werden, dass bestimmte Viren bei Vorhandensein von deregulierten YB-1 in der Lage sind, vor einem dieses deregulierte YB-1 aufweisenden zellulären Hintergrund zu replizieren. Die bestimmten Viren sind dabei solche, bei denen das E1A-Protein mutiert ist und eine transaktivierende Funktion erfüllt. Beispiele für diese bestimmten Viren

sind AD delta 24, dl 922-947, E1 Ad/01/07 und CB 016 und/oder beschrieben von Howe, J. A et al., Molecular Therapy 2, 485-495, 2000; Fueyo J. et al., Oncogene 19, 2-12, 2000; Heise C. et al., Nature Medicine 6, 1134 – 1139, 2001; Balague, C et al., J. Virol. 75, 7602-7611, 2001; Bautista, D.S: et al., Virology 1991, 182, 578-596; Jelsma T.N. et al., Virology 1988, 163, 494-502 ; Wong, H.K. und Ziff E.B., J. of Virology 1994, 68, 4910-4920.] Eine derartige Zelle bzw. eine Zelle mit einem derartigen Hintergrund, kann für die Replikation mit Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II verwendet werden. Darüber hinaus können Tumoren, die derartige Zellen umfassen, mit den erfindungsgemäßen Adenoviren lysiert werden.

Der vorliegenden weiterhin Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass die DNA-Replikation von E1A-modifizierten Adenoviren in YB-1 Kern-positiven Tumorzellen auf die Aktivierung des E2-late Promotors zurückzuführen ist. Unter E1A-modifizierten Adenoviren sind dabei solche Adenoviren zu verstehen, die (a) keine Replikation oder eine verglichen mit dem jeweiligen Wildtyp verringerte, bevorzugterweise stark verringerte Replikation, in YB-1-Kern-negativen Zellen zeigen, (b) transaktivierend auf mindestens ein virales Gen wirken, wobei das Gen insbesondere ausgewählt ist aus der Gruppe, die E1B-55kDa, E4orf6, E4orf3 und E3ADP umfasst, und/oder (c) zelluläres YB-1 durch den Adenovirus nicht in den Kern transloziert. Optional weisen die erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren die weitere Eigenschaft auf, dass nämlich die Bindung des von dem Adenovirus kodierten E1A-Proteins die Bindung von E2F an RB stört bzw. den entsprechenden Komplex aus E2F und Rb aufzulösen in der Lage ist. Adenoviren, die eines oder mehrere der vorstehend genannten Merkmale a) bis c), bevorzugterweise alle Merkmale a) bis c) aufweisen, sind replikationsdefizient in Zellen, die YB-1 nicht im Kern aufweisen.

In einer Ausführungsform wird unter einer stark verringerten Replikation hierin insbesondere eine solche Replikation verstanden, die gegenüber dem Wildtyp um den Faktor 2, bevorzugterweise um den Faktor 5, bevorzugterweise um den Faktor 10 und am bevorzugtesten um den Faktor 100 verringert ist. In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Vergleich der Replikation bei Verwendung gleicher oder ähnlicher Zelllinien, gleicher oder ähnlicher Virustiter für die Infektion (engl. multiplicity of infection, MOI, oder engl. plaque forming unit, pfu) und/oder gleicher oder ähnlicher allgemeiner Versuchsbedingungen durchgeführt wird. Dabei wird unter Replikation insbesondere die Partikelbildung verstanden. In weiteren Ausführungsformen kann jedoch als Mass für die Replikation der Umfang der Syn-

these viraler Nukleinsäure verstanden sein. Verfahren zur Bestimmung des Umfanges der Synthese viraler Nukleinsäuren sind ebenso wie Verfahren zur Bestimmung der Partikelbildung den Fachleuten auf dem Gebiet bekannt.

Die hierin beschriebenen Erkenntnisse bzw. die Verfahren, Verwendungen oder Nukleinsäuren, Proteine, Replikationssysteme und dergleichen sind nicht notwendigerweise auf Adenoviren beschränkt. Grundsätzlich gibt es auch bei anderen Viren derartige Systeme, die hiermit ebenfalls umfasst sind.

Bei Verwendung der erfindungsgemäßen Viren oder bei der erfindungsgemäßen Verwendung der hierin beschriebenen Viren kann eine dem Wildtyp vergleichbare Replikation bereits bei einer Infektionsrate von 1 bis 10 pfu/Zelle erreicht werden gegenüber 10 bis 100 pfu/Zelle gemäß dem Stand der Technik.

Unter zellulärem YB-1 soll hierin ein jedes YB-1 verstanden werden, welches von einer Zelle codiert und bevorzugterweise auch exprimiert wird, wobei dieses YB-1 in der Zelle insbesondere vor der Infektion der betreffenden Zelle mit einem Adenovirus, bevorzugterweise einem Adenovirus, und/oder einem Helfervirus, wie hierin beschrieben, vorhanden ist. Es ist jedoch auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass zelluläres YB-1 auch ein solches ist, welches erst durch exogene Maßnahmen, wie beispielsweise durch Infektion mit einem Virus, insbesondere mit einem Adenovirus, in die Zelle eingeführt bzw. von dieser produziert wird.

Ohne im folgenden darauf festgelegt sein zu wollen, geht der vorliegende Erfinder davon aus, dass der E2-early Promotor, d. h. der frühe E2-Promotor, im Rahmen der Replikation der hierin erfindungsgemäß verwendeten Viren und der erfindungsgemäßen Verwendung der erfindungsgemäßen Adenoviren nicht über den humanen zellulären E2F-Transkriptionsfaktor eingeschaltet wird. Das Einschalten der Replikation ist dabei unabhängig vom Rb-Status der Zellen, d.h. dass die Tumorzellen, die unter Anwendung der hierin offenbarten Viren infiziert und in der Folge bevorzugt lysiert werden, sowohl funktionelle wie auch inaktive Rb-Proteine besitzen können. Zudem benötigt die adenovirale Replikation unter Verwendung der hierin offenbarten Adenoviren bzw. den hierin offenbarten Bedingungen kein funktionelles p53 Protein, wird jedoch auch durch dessen Vorhandensein nicht nachteilig beeinflusst. Insoweit wendet sich die technische Lehre von dem mit der Anwendung der onkolytischen oder tumor-

lytischen Adenoviren vom Typ AdΔ24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB016 oder jener Adenoviren, wie sie beispielsweise im europäischen Patent EP 0 931 830 beschrieben sind, verfolgten Prinzip ab, bei denen eine und/oder mehrere Deletion(en) im E1A-Protein vorgenommen worden war(en) unter der Annahme, dass intakte funktionelle Rb-Proteine einer effizienten Replikation in vivo entgegenwirken und somit eine adenovirale Replikation in vivo nur in Rb-negativen bzw. Rb-mutierten Zellen sicher zu stellen. Diese adenoviralen Systeme nach dem Stand der Technik gehen auf E1A zurück, um mittels des frühen E2-Promotors (E2-early Promotor) und „freiem E2F“ die in vivo Replikation von Adenoviren zu steuern. Gleichwohl können diese im Stand der Technik bekannten Viren erfindungsgemäß verwendet werden, d. h. zur Replikation in Zellen, die YB-1 unabhängig vom Zellzyklus im Kern enthalten oder in Zellen, die dereguliertes YB-1 aufweisen.

Die in dem besagten europäischen Patent EP 0 931 830 beschriebenen Viren und insbesondere Adenoviren können dabei erfindungsgemäß verwendet werden. Konkret handelt es sich bei den in besagtem Patent beschriebenen Viren um solche, die eine Replikationsdefizienz aufweisen und denen ein exprimiertes virales Onkoprotein fehlt, das zur Bindung eines funktionellen Rb-Tumorsuppressor-Genprodukts fähig ist. Der Adenovirus kann dabei insbesondere ein solcher sein, dem exprimiertes virales E1A-Onkoprotein fehlt, das zur Bindung eines funktionellen Tumorsuppressor-Genprodukts, insbesondere Rb, fähig ist. Das virale E1A-Onkoprotein kann dabei eine inaktivierende Mutation aufweisen, beispielsweise in der CR1-Domäne an den Aminosäuren 30 bis 85 in Adenovirus Ad5, hierin auch als Ad5 bezeichnet, Ad 5, den Nukleotidpositionen 697-790, und/oder der CR2-Domäne an den Aminosäuren 120 bis 139 in Ad 5, den Nukleotidpositionen 920 bis 967, welche an der Bindung von p105 Rb Protein, p130 und p107 Protein beteiligt sind. Dabei kann auch vorgesehen sein, dass der Adenovirus vom Typ 2 dl 312 oder Adenovirus vom Typ 5 NT dl 1010 ist.

Bei der erfindungsgemäßen Verwendung von Adenoviren zur Herstellung eines Medikamentes, insbesondere zur Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung von Tumorerkrankungen und die sonstigen hierin offenbarten Erkrankungen, und bei der erfindungsgemäßen Verwendung von Adenoviren sowie der erfindungsgemäßen Adenoviren zur Replikation in Zellen, die YB-1 im Kern aufweisen, bevorzugterweise Zellzyklus-unabhängig YB-1 im Kern aufweisen oder dereguliertes YB-1 aufweisen, bevorzugterweise im Cytoplasma, erfolgt die

Replikation letzten Endes in solchen Zellen, die YB-1 im Kern, bevorzugterweise unabhängig vom Zellzyklus, aufweisen, mithin YB-1-Kern-positiv sind, oder in Zellen, die dereguliertes YB-1 aufweisen. Dabei ist besonders beachtlich, dass die Adenoviren als solche in Zellen, die YB-1 nicht im Kern, sondern im Wesentlichen nur im Cytoplasma enthalten, oder die kein dereguliertes YB-1 aufweisen, nicht oder stark verringert replizieren. Insoweit ist es erforderlich, dass für eine erfolgreiche Replikation dieser Viren YB-1 im Kern bevorzugterweise Zellzyklus-unabhängig, oder dereguliertes YB-1 vorhanden ist. Dies kann beispielsweise, wie auch im Folgenden noch ausgeführt werden wird, durch Anlegen solcher Bedingungen an die Zellen realisiert werden, dass es zur Expression oder dem Vorhandensein von YB-1 bevorzugterweise Zellzyklus-unabhängig, oder dereguliertes YB-1 im Kern oder der Expression von dereguliertem YB-1 kommt. Eine entsprechende Maßnahmen kann z. B. die Codierung bzw. Exprimierung von YB-1 durch die erfindungsgemäß verwendeten und die erfindungsgemäßen Adenoviren sein, die in Ergänzung zu den adenoviralen Genen auch eine genetische Information in sich tragen, die für YB-1 und insbesondere dessen Expression codiert. Andere Maßnahmen, die zum Transport, zur Induktion oder Expression von YB-1 im Kern der Zelle führen, sind das Anlegen von Stressbedingungen wie beispielsweise die Applikation von Zytostatika, Bestrahlung, Hyperthermie und dergleichen an die Zelle bzw. den eine – solche – Zelle enthaltenden Organismus. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Bestrahlung eine Bestrahlung, wie sie beispielsweise bei der Behandlung von Tumorerkrankungen verwendet wird.

Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung, insbesondere zur Tumorlyse, verwendeten Adenoviren sowie der erfindungsgemäßen Adenoviren zeichnen sich in bevorzugten Ausführungsformen weiterhin dadurch aus, dass sie in solchen Zellen, die YB-1 im Kern nicht Zellzyklus-unabhängig aufweisen, mithin YB-1-Kern-negativ sind oder die kein dereguliertes YB-1 aufweisen, nicht replizieren.

Ein weiteres Merkmal eines Teils der erfindungsgemäß zu verwendenden Adenoviren, die verschieden sind von den erfindungsgemäßen Adenoviren, besteht darin, dass sie für ein virales Onkoprotein, das hierin auch also Onkogenprotein bezeichnet wird, codieren, wobei es sich bei dem Onkogenprotein bevorzugter Weise um E1A handelt, wobei das Onkogenprotein in der Lage ist, zumindest ein virales Gen zu aktivieren, welches einen Einfluss auf die Replikation des Virus und/oder die Zellyse der von dem Virus infizierten Zelle haben kann. Dabei

ist bevorzugt, dass der Einfluss auf die Replikation dergestalt ist, dass der Virus bei Vorhandensein des Onkogenproteins besser repliziert als bei Fehlen des Onkogenproteins des jeweiligen Virus. Dieser Vorgang wird hierin auch als transaktivierend bezeichnet und insbesondere als E1A-transaktivierend bezeichnet, wenn die Transaktivierung von E1A vermittelt wird. Die Bezeichnung „transaktivieren“ oder „Transaktivierung“ beschreibt dabei bevorzugt den Vorgang, dass das in Frage stehende virale Onkoprotein auf die Expression und/oder auf die Transkription eines anderen oder mehrerer anderer Gene als das für das virale Onkoprotein selbst codierende Gen Einfluss nimmt, d. h. bevorzugterweise dessen Expression und/oder Translation steuert, und diese(s) insbesondere aktiviert. Derartige virale Gene sind bevorzugter Weise E1B55kDa, E4orf6, E4orf3 und E3ADP sowie beliebige Kombinationen der vorstehend genannten Gene bzw. Genprodukte.

Ein weiteres, wenngleich bevorzugterweise optionales, Merkmal der erfindungsgemäß zu verwendenden Adenoviren ebenso wie der erfindungsgemäßen Adenoviren ist deren Bindungsverhalten bzw. von bestimmten der von ihnen codierten Proteine zu bzw. mit dem Tumor-Suppressor Rb. Es ist grundsätzlich im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren an Rb binden oder nicht binden können. Die Verwendung der beiden alternativen Ausgestaltungsformen der Adenoviren ist dabei unabhängig vom Rb-Status der behandelten oder zu behandelnden Zelle möglich.

Um E1A die Fähigkeit zu verleihen, nicht an Rb binden zu können, sind beispielsweise folgende Deletionen am E1A-Onkoprotein möglich: Deletion in der CR1-Region (Aminosäurepositionen 30-85 in Ad5) und Deletion der CR2-Region (Aminosäurepositionen 120-139 in Ad5). Dabei bleibt die CR3-Region erhalten und kann ihre transaktivierende Funktion auf die anderen frühen viralen Gene ausüben.

Um E1A die Fähigkeit zu verleihen, an Rb binden zu können, sind dagegen folgende Deletionen am E1A-Onkoprotein grundsätzlich möglich: Deletion der CR3-Region (Aminosäurepositionen 140-185); Deletion des N-Terminus (Aminosäurepositionen 1-29); Deletion der Aminosäurepositionen 85-119; und Deletion des C-Terminus (Aminosäurepositionen 186-289). Die hier aufgeführten Bereiche interferieren nicht mit der Bindung von E2F an Rb. Die transaktivierende Funktion bleibt erhalten, ist jedoch gegenüber vom Wildtyp-Ad5 verringert.

Es ist auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, insbesondere betreffend die erfindungsgemäßen Adenoviren, dass das E1A-Protein, insbesondere das E1A12S-Protein so ausgebildet ist, dass es in einer Ausführungsform an Rb zu binden in der Lage ist und in einer anderen Ausführungsform nicht in der Lage ist an Rb zu binden, wobei ein derartiges E1A12 S-Protein ein E1A-Protein und insbesondere ein E1A12S-Protein im Sinne der vorliegenden Erfindung ist, das gleichwohl im Stand der Technik gelegentlich auch als modifiziertes E1A12S bezeichnet wird. Die entsprechende Ausprägung des E1A12S-Proteins ist dabei im Rahmen des Könnens der Fachleute auf dem Gebiet, insbesondere mit Blick auf die vorstehend aufgezeigten Deletionen des E1A-Proteins, hierin auch einfach als E1A bezeichnet.

Derartige im Stand der Technik grundsätzlich bereits bekannte Viren, die keine Transaktivierung zeigen, gelten allgemein als replikationsdefizient. Es ist jedoch das Verdienst des vorliegenden Erfindes, erkannt zu haben, dass sie dennoch zur Replikation in einem geeigneten Hintergrund, insbesondere einem zellulären Hintergrund geeignet sind. Ein derartiger geeigneter zellulärer Hintergrund wird durch das Vorhandensein von YB-1 im Kern, bevorzugterweise eine Zellzyklus-unabhängige Anwesenheit von YB-1 im Kern, oder durch dereguliertes YB-1 bedingt oder bereitgestellt. Der Begriff der Zellen oder zellulären Systeme, wie hierin im Zusammenhang mit einem jeglichen Aspekt der vorliegenden Erfindung verwendet, umfasst dabei Fragmente oder Fraktionen von Zellaufschlüssen ebenso wie Zellen, die in vitro, in vivo oder in situ vorliegen. Insoweit umfasst der Begriff zelluläre Systeme oder Zellen auch solche Zellen, die in einer Zellkultur, Gewebekultur, Organkultur oder in einem Gewebe oder Organ in vivo bzw. in situ, isoliert, in Gruppen oder als Teil von Geweben, Organen oder Organismen oder aber auch als solches in einem bevorzugterweise lebenden Organismus vorliegen. Bei dem Organismus handelt es sich bevorzugter Weise um einen Wirbeltier-Organismus und bevorzugterer Weise um ein Säugetier. Besonders bevorzugterweise ist der Organismus dabei ein menschlicher Organismus. Weitere bevorzugte Organismen sind dabei jene, die im Zusammenhang mit den verschiedenen Aspekten der vorliegenden Erfindung hierin offenbart sind.

Darüber hinaus ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass auf der Grundlage der hierin gegebenen technischen Lehre neue Viren erzeugt werden, die das Replikationsverhalten der hierin beschriebenen und im Stand der Technik bekannten Adenoviren in solchen Zellen zeigen, die YB-1-Kern-positiv, bevorzugt Zellzyklus-unabhängig YB-1-Kern-positiv sind

oder dereguliertes YB-1 aufweisen. Mit anderen Worten, insbesondere bevorzugterweise ausgehend von den bereits bekannten Adenoviren können weitere Viren konzipiert werden, die die hierin definierten, für die erfindungsgemäße Verwendung erforderlichen Merkmale aufweisen.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung ist das modifizierte E1A-Onkoprotein der verschiedenen, erfindungsgemäß zu verwendenden Adenoviren im Gegensatz zu den hierin beschriebenen erfindungsgemäßen Viren in der Lage transaktivierend auf die frühen virale Gene, wie beispielsweise E1B55K, E4orf3, E4orf6, E3ADP, in YB-1 kernpositiven Zellen oder Zellen, die dereguliertes YB-1 aufweisen, zu wirken. Dabei liegt sonst bevorzugterweise keine Veränderung im viralen Genom vor und der entsprechende Adenovirus kann insoweit ansonsten einen Adenoviren vom Wildtyp oder Abwandlung davon entsprechen.

Zu den hierin offenbarten Viren, die für ein transaktivierendes Onkogenprotein im Sinne der vorliegenden Erfindung codieren oder ein solches umfassen, gehören beispielsweise die Adenoviren AdΔ24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB106 und/oder die im europäischen Patent EP 0931 830 beschriebenen Adenoviren, die jeweils in der Lage sind, transaktivierend auf die frühen Gene z.B. E1B, E2, E3 und/oder E4 zu wirken, und ist vergleichbar mit Adenovirus vom Wildtyp, insbesondere vom Wildtyp Ad5 aufweisen. Verantwortlich für die Transaktivierung ist in diesen Fällen ein bestimmter Bereich des E1A-Proteins. Innerhalb von verschiedenen Adenovirus-Serotypen kommen 3 hoch konservierte Bereiche im E1A Protein vor. Der Bereich CR1 von 41-80 AS, CR2 von 120-139 und CR3 von 140-188 AS. Die transaktivierende Funktion beruht hauptsächlich auf das Vorhandensein der CR3-Region im E1A Protein. Die AS-Sequenz von CR3 liegt in den oben genannten Adenoviren unverändert vor. Dies führt dazu, dass die Transaktivierung der frühen Gene E1B, E2, E3 und E4 unabhängig davon erfolgt, ob YB-1 im Kern oder im Zytoplasma vorhanden ist.

Im rekombinanten Adenovirus dl520 ist dahingegen der CR3-Bereich deletiert worden. Damit exprimiert dl520 ein sogenanntes E1A12S Protein, welches nicht die AS-Sequenz der CR3-Region aufweist. Dies führt dazu, dass dl520 nur eine ganz schwache transaktivierende Funktion ausüben kann, insbesondere auf die E2-Region, und somit in YB-1 Kern-negativen Zellen nicht repliziert. In YB-1 Kern-positiven Zellen übernimmt YB-1 die Transaktivierung der

E2-Region, und ermöglicht somit eine effiziente Replikation dl520. Darauf beruht die Verwendung von Systemen wie dl520 bzw. auf der Grundlage von dl520 zu den hierin offenbarten Zwecken. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen beiden vorstehend beschriebenen Gruppen von Adenoviren, d. h. beispielsweise delta 24 (hierin auch als Ad Δ 24 bezeichnet) und beispielsweise dl520 besteht darin, dass bei dl520 die frühen Gene E1B, E3 und E4 stärker in Zellzyklus-unabhängigen YB-1 Kern-positiven Zellen oder Zellen, die dereguliertes YB-1 aufweisen, als in YB-1 Kern-negativen Zellen oder Zellen, die kein dereguliertes YB-1 aufweisen, transaktiviert werden. Bei delta 24 bestehen hingegen keine bzw. nur geringfügige Unterschiede. Die Transaktivierung von dl520 bzw. genauer des E1A12S Proteins ist allerdings erheblich schwächer im Vergleich zum Wildtyp-Adenovirus. Diese Transaktivierung reicht allerdings aus, um eine effiziente Replikation in YB-1 kernpositiven Zellen durchzuführen, wie dies auch in Beispiel 10 gezeigt ist. Die hierin und speziell in diesem Zusammenhang beschriebene Ausgestaltung des E1A-Proteins bzw. der dafür codierenden Nukleinsäure in der Form, dass das E1A-Protein gegenüber dem Wildtyp-Onkogenprotein E1A eine oder mehrere Deletionen und/oder Mutationen aufweist, wobei die Deletion bevorzugt eine solche ist, die ausgewählt ist aus der Gruppe, die Deletionen des Bereiches CR3 und Deletionen des N-Terminus und Deletionen des C-Terminus umfasst, einschließlich und besonders bevorzugt jener Ausgestaltungen des E1A-Proteins wie im Zusammenhang mit dl520 oder Ad Δ 24, dl922 bis 947, E1Ad/01/07, CB106 und/oder die im europäischen Patent EP 0 931 830 beschriebenen Adenoviren, stellen Ausführungsformen von Viren, insbesondere von Adenoviren dar, deren Replikation durch YB-1 über die Aktivierung des E2-late-Promotors gesteuert wird, bevorzugterweise überwiegend über die Aktivierung des E2-late-Promotors. Weitere Ausgestaltungen des E1A-Proteins, die diese Form der Replikation von Adenoviren erlauben, können auf der Grundlage der hierin gemachten Offenbarung von den Fachleuten auf dem Gebiet hergestellt werden. Die vorstehend beschriebene Ausgestaltung des E1A-Proteins ist eine solche, wie sie auch im Zusammenhang mit den erfindungsgemäßen Adenoviren, die hierin auch als erfindungsgemäße Adenoviren oder Adenoviren der Gruppe I bezeichnet werden, verwendet werden kann.

Bei erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere den Adenoviren der Gruppe I, die hierin auch als Abwandlungen bezeichnet werden und die erfindungsgemäß verwendet werden können, liegt typischerweise eine E1-Deletion, eine E1/E3-Deletion und/oder eine E4-Deletion

vor, d. h. die entsprechenden Adenoviren sind nicht in der Lage, funktional aktive E1- und/oder E3- und/oder E4-Expressionsprodukte bzw. entsprechende Produkte zu erzeugen, oder mit anderen Worten, diese Adenoviren sind lediglich in der Lage, funktional inaktive E1-, E3- und/oder E4-Expressionsprodukt zu erzeugen, wobei ein funktional inaktives E1-, E3- und/oder E4-Expressionsprodukt ein solches ist, welches entweder gar nicht als Expressionsprodukt, sei es auf der Ebene der Transkription und/oder der Translation, oder in einer Form vorliegt, bei der es zumindest eine der ihm im Adenovirus vom Wildtyp zukommende Funktion nicht aufweist. Diese dem Expressionsprodukt im Adenovirus vom Wildtyp zukommenden Funktion(en) ist/sind den Fachleuten auf dem Gebiet bekannt und beispielsweise beschrieben in Russell, W. C., Journal of Virology, 81, 2573-2604, 2000. Russell (a.a.O.) beschreibt im übrigen auch Prinzipien der Konstruktion von Adenoviren und adenoviralen Vektoren, die hierin durch Bezugnahme aufgenommen werden. Es ist auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass das modifizierte E1A-Onkoprotein, d. h. das nicht mehr transaktivierende E1A-Protein wie beispielsweise E1A12S, E1B-55K, E4orf6 und/oder E3ADP (adenoviral death protein (ADP)) (Tollefson, A. et al., J. Virology, 70, 2296-2306, 1996.) in einem solchen Vektor einzeln oder in beliebiger Kombination zur Expression gebracht wird/werden. Dabei können die einzelnen genannten Gene ebenso wie die hierin offenbarten Transgene unabhängig von einander entweder in der E1 und /oder E3 und/oder E4-Region inkloniert und mit Hilfe eines geeigneten Promotors oder unter Kontrolle eines geeigneten Promotors zur Expression gebracht werden. Grundsätzlich sind die Regionen E1, E3 und E4 als Klonierungsstellen innerhalb der adenoviralen Nukleinsäure gleichermaßen geeignet. Geeignete Promotoren sind in Ausführungsformen a-a jene, wie sie hierin im Zusammenhang mit der Steuerung bzw. Expression von E1A, insbesondere des modifizierten E1A, offenbart sind.

Schließlich ist in einer Ausführungsform vorgesehen, dass die erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren der Gruppe II hinsichtlich E1B defizient, insbesondere hinsichtlich E1B 19 kDa-defizient sind. Dabei wird hierin allgemein unter dem Begriff defizient ein Zustand verstanden, bei dem E1B die im Wildtyp inhärente Gesamtheit der Eigenschaften nicht aufweist und mindestens eine dieser Eigenschaften fehlen.

Die Adenoviren der Gruppe II, wie sie gemäß der hierin offenbarten Erfindung verwendet werden, sind grundsätzlich im Stand der Technik zumindest in einigen Ausführungsformen

bekannt. Bei diesen erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren handelt es sich bevorzugter Weise um rekombinante Adenoviren, insbesondere auch dann, wenn eine Veränderung gegenüber dem Wildtyp vorgenommen wurde im Sinne der hierin gegebenen technischen Lehre. Es ist im Rahmen der Kenntnisse der Fachleute auf diesem Gebiet, für die Erfindung unwesentliche adenoviralen Nukleinsäuresequenzen zu deletieren bzw. zu mutieren. Derartige Deletionen können z. B. die für einen Teil der E3 und E4 codierende Nukleinsäure betreffen wie hierin auch beschrieben. Bei einer Deletion von E4 ist dabei besonders bevorzugt, wenn sich diese nicht auf das Protein E4orf6 erstreckt, mithin der erfindungsgemäß zu verwendende Adenovirus E4orf6 codiert. In bevorzugten Ausführungsformen können diese adenoviralen Nukleinsäuren noch in das virale Kapsid verpackt werden und damit infektiöse Partikel ausbilden. Gleiches gilt für die erfindungsgemäße Verwendung der Nukleinsäuren. Generell gilt es auch noch festzuhalten, dass die adenoviralen Systeme hinsichtlich einzelner oder mehrerer Expressionsprodukte defizient sein können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dies sowohl im Zusammenhang mit den Adenoviren der Gruppe I als auch den Adenoviren der Gruppe II zum einen darauf beruhen kann, dass die für das Expressionsprodukt codierende Nukleinsäure vollständig oder in dem Maße mutiert oder deletiert ist, dass im wesentlichen kein Expressionsprodukt mehr gebildet wird, oder darauf, dass regulative bzw. die Expression steuernde Elemente wie Promotoren oder Transkriptionsfaktoren fehlen oder anders als im Wildtyp aktiv sind, sei es auf der Ebene der Nukleinsäure (Fehlen eines Promotors; cis-wirkende Element) oder auf der Ebene des Translations- bzw. Transkriptionssystems (trans-wirkende Elemente). Gerade der letztere Aspekt kann dabei vom jeweiligen zellulären Hintergrund abhängen.

Neben der Verwendung von an und für sich bereits bekannten Adenoviren gemäß der vorliegenden Erfindung können auch neue Adenoviren wie die Adenoviren der Gruppe II in dem Umfang verwendet werden, wie dies für die anderen hierin beschriebenen Adenoviren bereits offenbart ist. Die erfindungsgemäßen neuen Adenoviren ergeben sich aus der hierin offenbarten technischen Lehre. Besonders bevorzugte Vertreter sind dabei beispielsweise die hierin in Fig. 16 und Fig. 17 dargestellten Viren Xvir03 und Xvir03/01, deren Konstruktionsprinzip auch in den Beispielen 11 und 12 weiter veranschaulicht ist.

Im Falle des Vektors Xvir03 wurde in der E1-Region ein CMV-Promotor kloniert, der die durch eine IRES-Sequenz getrennten Nukleinsäuren für E1B 55k und E4ORF6 codiert. Infol-

ge Einklonierung dieser beiden Gene bzw. der daraus hergestellten Genprodukte kommt es zu einer Replikationseffizienz, die praktisch derjenigen von Wildtyp-Viren entspricht, wobei die Selektivität der Replikation in Zellen, insbesondere Tumorzellen, insoweit beibehalten wird, als dass eine Replikation, insbesondere in YB-1-Kern-positiven Zellen und insbesondere in solchen Zellen erfolgt, bei denen YB-1 dereguliert im Sinne der vorliegenden Offenbarung vorliegt. Zellen, in denen YB-1 dereguliert vorliegt, sind dabei in einer Ausführungsform solche, die eine erhöhte Expression von YB-1, bevorzugt Kompartiment-unabhängig, aufweisen verglichen mit normalen oder Nicht-Tumorzellen.

Eine Weiterentwicklung des Virus Xvir03 stellt der Virus Xvir03/01 dar, bei dem unter der Kontrolle eines spezifischen Promotors, insbesondere eines Tumor- oder Gewebespezifischen Promotors, therapeutische Gene oder Transgene in einer bevorzugten Ausführungsform einkloniert sind. Weiterhin ist es im Rahmen eines derartigen Virus, dass auch die Region E4 funktional inaktiv ist, bevorzugterweise deletiert ist. Die hierin beschriebenen Transgene können dabei auch in die E4-Region kloniert werden, wobei dies alternativ oder ergänzend zum Klonieren der Transgene in die E3-Region erfolgen kann.

Die hierin und insbesondere im Folgenden beschriebenen Transgene können im übrigen auch im Zusammenhang mit den oder durch die erfindungsgemäßen Adenoviren, d. h. den Adenoviren der Gruppe I, bzw. deren Nukleinsäuren, oder Replikationssystemen zur Expression gebracht werden und sind damit im Zusammenhang mit einer Expressionskassette umfassend einen Promotor und eine Nukleinsäuresequenz, eine derartige Nukleinsäuresequenz, wobei diese für ein oder mehrere der besagten Transgene codiert umfasst. Als Klonierungsort im adenoviralen Genom eignet sich besonders die E1-, E3- und/oder die E4-Region, ist aber nicht darauf beschränkt.

Derartige therapeutische Gene können dabei Prodrug-Gene, Gene für Zytokine, Apoptose-induzierende Gene, Tumorsuppressorgene, Gene für Metalloproteinasen-Inhibitoren und/oder Angiogenese-Inhibitoren, Tyrosinkinase-Inhibitoren sein. Ferner können siRNA, Aptameren, Antisense und Ribozyme exprimiert werden, die bevorzugterweise gegen Krebs-relevante Zielmoleküle gerichtet sind. Bevorzugterweise ist das einzelne oder die mehreren Zielmoleküle aus der Gruppe ausgewählt, die Resistenz-relevante Faktoren, Anti-Apoptose-Faktoren, Onkogene, Angiogenese-Faktoren, DNA-Synthese-Enzyme, DNA-Reperaturenzyme, Wachs-

tumsfaktoren und deren Rezeptoren, Transkriptionsfaktoren, Metalloproteinasen, insbesondere Matrix-Metalloproteinasen, und Plasminogenaktivator vom Urokinase-Typ umfasst. Bevorzugte Ausführungsformen davon sind solche, die hierin im Zusammenhang mit anderen Aspekten der Erfindung bereits offenbart sind.

Mögliche Prodrug-Gene, wie sie in bevorzugten Ausführungsformen verwendet werden können, sind beispielsweise *Cytosine deaminase*, *Thymidin kinase*, *Carboxypeptidase*, *Uracil phosphoribosyltransferase*; oder *Purin Nukleosid Phosphorylase (PNP)*; [Kim et al, Trends in Molecular Medicine, Volume 8, No.4 (Suppl), 2002; Wybranietz W.A. et al., Gene Therapy, 8, 1654-1664, 2001; Niculescu-Duvaz et al., Curr. Opin. Mol. Therapy, 1, 480-486, 1999; Koyama et al., Cancer Gene Therapy, 7, 1015-1022, 2000; Rogers et al., Human Gene Therapy, 7, 2235-2245, 1996; Lockett et al., Clinical Cancer Res., 3, 2075-2080, 1997; Vijayakrishna et al., J. Pharmacol. And Exp. Therapeutics, 304, 1280-1284, 2003].

Mögliche Zytokine, wie sie in bevorzugten Ausführungsformen verwendet werden können, sind beispielsweise *GM-CSF*, *TNF-alpha*, *Il-12*, *Il-2*, *Il-6*, *CSF*, oder *Interferon-Gamma*; [Gene Therapy, Advances in Pharmacology, Volume 40, Editor: J. Thomas August, Academic Press; Zhang und Degroot, Endocrinology, 144, 1393-1398, 2003; Descamps et al., J. Mol. Med., 74, 183-189, 1996; Majumdar et al., Cancer Gene Therapy, 7, 1086-1099, 2000].

Mögliche Apoptose-induzierende Gene, wie sie in bevorzugten Ausführungsformen verwendet werden können, sind beispielsweise Decorin [Tralhao et al., FASEB J, 17, 464-466, 2003]; Retinoblastoma 94 [Zhang et al., Cancer Res., 63, 760-765, 2003]; Bax und Bad [Zhang et al, Hum. Gene Ther., 20, 2051-2064, 2002]; Apoptin [Noteborn und Pietersen, Adv. Exp. Med. Biol., 465, 153-161, 2000]; ADP [Toth et al., Cancer Gene Therapy, 10, 193-200, 2003]; bcl-xs [Sumantran et al., Cancer Res, 55, 2507-2512, 1995]; E4orf4 [Braithwaite und Russell, Apoptosis, 6, 359-370, 2001]; FasL, Apo-1 und Trail [Boehringer Mannheim, Guide to Apoptotic Pathways, Arai et al., PNAC, 94, 13862-13867, 1997]; Bims [Yamaguchi et al., Gene Therapy, 10, 375-385, 2003; GNR163: Oncology News, 17 Juni, 2000].

Mögliche Tumorsuppressor-Gene, wie sie in bevorzugten Ausführungsformen verwendet werden können, sind beispielsweise *E1A*, *p53*, *p16*, *p21*, *p27* oder *MDA-7* [Opalka et al., Cell

Tissues Organs, 172, 126-132, 2002 , Ji et al., Cancer Res., 59, 3333-3339, 1999, Su et al., Oncogene, 22, 1164-1180, 2003].

Mögliche Angiogenese-Inhibitoren, wie sie in bevorzugten Ausführungsformen verwendet werden können, sind beispielsweise *Endostatin* oder *angiostatin* [Hajitou et al., FASEB J., 16, 1802-1804, 2002], und Antikörper gegen VEGF [Ferrara, N., Semin Oncol 2002 Dec; 29 (6 Suppl 16): 10-4].

Mögliche Metalloproteinase-Inhibitoren, wie sie in bevorzugten Ausführungsformen verwendet werden können, sind beispielsweise *Timp-3* [Ahonen et al., Mol Therapy, 5, 705-715, 2002]; *PAI-1* [Soff et al., J. Clin. Invest., 96, 2593-2600, 1995]; *Timp-1* [Brandt K. Curr. Gene Therapy, 2, 255-271, 2002].

Weitere Transgene im Sinne der vorliegenden Erfindung, die sowohl von den Adenoviren der Gruppe I als auch der Gruppe II exprimiert werden können, sind auch Tyrosinkinase-Inhibitoren. Beispielhafte Tyrosinkinasen sind dabei der EGFR (epidermal growth factor receptor) [Onkologie, Entstehung und Progression maligner Tumoren; Verfasser: Christoph Wagner, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1999]. Ein bevorzugter Tyrosinkinase-Inhibitor ist Herceptin [Zhang H et al., Cancer Biol Ther. 2003, Jul-Aug; 2 (4 Suppl 1): S122-6].

siRNA (short interfering RNA) besteht aus zwei, bevorzugt zwei getrennten RNA-Strängen, die infolge Basenkomplementarität miteinander hybridisieren, d.h. im wesentlichen basenpaart vorliegen, und weist bevorzugterweise eine Länge von bis zu 50 Nukleotiden auf, bevorzugterweise zwischen 18 und 30 Nukleotiden, bevorzugterweise weniger als 25 Nukleotide und am bevorzugtesten 21, 22 oder 23 Nukleotide, wobei sich diese Zahlenwerte auf einen Einzelstrang der siRNA, insbesondere auf die Länge des Bereiches eines Einzelstranges, der mit einem, genauer dem zweiten Einzelstrang hybridisiert bzw. basenpaart, beziehen. siRNA induziert oder vermittelt spezifisch den Abbau von mRNA. Die dazu erforderliche Spezifität wird durch die Sequenz der siRNA und damit ihren Bindungsort vermittelt. Die abzubauen Zielsequenz ist dabei im wesentlichen komplementär zu dem ersten oder zu dem zweiten die siRNA aufbauenden Strang. Obwohl die genauen Wirkmechanismen noch unklar sind, wird vermutet, dass siRNA für Zellen eine biologische Strategie darstellt, während der Entwicklung bestimmte Allele zu hemmen und sich vor Viren zu schützen. Die durch siRNA vermit-

telte RNA-Interferenz wird als Verfahren zur spezifischen Unterdrückung oder gar völligen Ausschaltung der Expression eines Proteins durch Einbringen einer genspezifischen doppelsträngigen RNA benutzt. Für höhere Organismen ist eine 19 bis 23 Nukleotid lange siRNA deshalb besonders geeignet, weil sie nicht zur Aktivierung der unspezifischen Abwehrreaktion, zur sogenannten Interleukin-Antwort führt. Die direkte Transfektion von doppelsträngiger RNA aus 21 Nukleotiden mit symmetrischen 2-nt 3' Überhängen konnte eine RNA-Interferenz in Säugetierzellen vermitteln und zeigte im Vergleich zu anderen Technologien wie Ribozymen und Antisense-Molekülen eine hohe Effizienz (Elbashir, S. Harborth J. Lendeckel W. Yalcin, A. Weber K. Tuschl T: Duplexes of 21-nucleotide RNAs mediate RNA interference in cultured mammalian cells. Nature 2001, 411: 494-498). Nur wenige siRNA-Moleküle genügen, um die Expression des Zielgens zu unterdrücken. Um die Limitierungen exogen zugeführter siRNA, die insbesondere in der transienten Natur des Interferenz-Phänomens und der spezifischen Abgabe (engl. delivery) der siRNA-Moleküle liegen, zu umgehen, werden im Stand der Technik auch Vektoren eingesetzt, die eine endogene siRNA-Expression erlauben. Hierfür werden beispielsweise Oligonukleotide mit einer Länge von 64 Nukleotiden, die die 19 Nukleotide lange Zielsequenz einschließen, sowohl in sense- als auch in antisense- Orientierung, getrennt durch eine beispielsweise 9 Nukleotide lange Spacer-Sequenz, in den Vektor eingebaut. Das resultierende Transkript faltet sich zu einer Haarnadelstruktur mit einer Stammstruktur (engl.: stem) von beispielsweise 19 Basenpaaren. In der Zelle wird die Schleife rasch abgespaltet, so daß eine funktionelle siRNA entsteht (Brummelkamp et al., Science, 296, 550-553, 2002)

Die für YB-1 codierende Nukleinsäure, die in einer Ausführungsform der erfindungsgemäß zu verwendenden Adenoviren, insbesondere der Gruppe II, aber auch der erfindungsgemäßen Adenoviren, d. h. der Adenoviren der Gruppe I, Bestandteil der Adenoviren sein kann, kann dabei eine einen Kerntransport von YB-1 vermittelnde Nukleinsäuresequenz umfassen. Als Adenoviren bzw. adenovirale Systeme und damit die entsprechenden Nukleinsäuren können im Zusammenhang damit und in Kombination mit diesen erfindungsgemäßen Nukleinsäuren die erfindungsgemäßen Nukleinsäuren, Adenoviren und adenoviralen Systeme sowie die im Stand der Technik bekannten Adenoviren wie beispielsweise Onyx-015, AdΔ24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB016, dl 520 und die im Patent EP 0931 830 beschriebenen Adenoviren verwendet werden. Geeignete, den Kerntransport vermittelnde Nukleinsäuresequenzen sind den

Fachleuten auf dem Gebiet bekannt und beispielsweise beschrieben in (Whittaker, G.R. et al., *Virology*, 246, 1-23, 1998; Friedberg, E.C., *TIBS* 17, 347, 1992; Jans, D.A. et al., *Bioessays* 2000 Jun; 22(6): 532-44; Yoneda, Y., *J. Biochem. (Tokyo)* 1997 May; 121(5): 811-7; Bouliskas, T., *Crit. Rev. Eukaryot. Gene Expr.* 1993; 3(3): 193-227; Lyons RH, *Mol. Cell Biol.*, 7, 2451-2456, 1987). Bei den Kerntransport vermittelnden Nukleinsäuresequenzen können verschiedene Prinzipien verwendet werden. Ein derartiges Prinzip besteht beispielsweise darin, dass das YB-1 als Fusionsprotein mit einem Signalpeptid ausgebildet oder versehen wird und infolge des Signalpeptids YB-1 in den Zellkern geschleust wird und damit die erfindungsgemäße Replikation der Adenoviren erfolgt.

Ein weiteres Prinzip, welches bei der Ausgestaltung der erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren, insbesondere der Gruppe II, aber auch der erfindungsgemäßen Adenoviren, d. h. der Adenoviren der Gruppe I, zur Anwendung gelangen kann, besteht darin, dass YB-1 mit einer Transportsequenz versehen wird, die dazu führt, dass YB-1, bevorzugter Weise ausgehend von einer Synthese im Cytoplasma, in den Zellkern geschleust oder transloziert wird und dort die virale Replikation befördert. Ein Beispiel für eine besonders wirksame, den Kerntransport vermittelnde Nukleinsäuresequenz stellt die TAT-Sequenz von HIV dar, die neben weiteren geeigneten derartigen Nukleinsäuresequenzen beispielsweise beschrieben ist in Efthymiadis, A., Briggs, LJ, Jans, DA., *JBC* 273, 1623-1628, 1998. Dabei ist es Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren, insbesondere der Gruppe II, aber auch der erfindungsgemäßen Adenoviren, d. h. der Adenoviren der Gruppe I, die Nukleinsäuresequenzen umfassen, die für die den Kerntransport codierenden Peptide codieren.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass YB-1 in vollständiger Länge vorliegt, insbesondere in einer Form, die dem Wildtyp von YB-1 entspricht. Es ist weiterhin im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass YB-1 als Derivat, zum Beispiel, in verkürzter oder trunkierter Form verwendet wird oder vorliegt. Ein YB-1-Derivat, wie es im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann oder vorliegt, ist dabei ein solches, das bevorzugterweise an den E2 late-Promotor zu binden in der Lage ist und dadurch die Genexpression von der adenoviralen E2-Region aktiviert. Derartige Derivate umfassen insbesondere die hierin offenbarten YB-1-Derivate. Weitere Derivate können durch Deletion einzelner oder mehrerer Aminosäuren am N-Terminus, am C-Terminus oder innerhalb der Aminosäuresequenz erzeugt werden. Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass auch YB-1-

Fragmente als YB-1-Proteine im Sinne der vorliegenden Erfindung verwendet werden. In der Publikation von Jürchott K et al. [JBC 2003, 278, 27988-27996] werden verschiedene YB-1-Fragmente offenbart, die sich durch Deletionen am C- und am N-Terminus auszeichnen. Die Verteilung der verschiedenen YB-1-Fragmente hat ergeben, dass sowohl die cold-shock-Domäne (CSD) wie auch der C-Terminus für den Zellzyklus-regulierten Transport von YB-1 in den Zellkern von Bedeutung ist. Es ist daher im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass ein verkürztes YB-1 (hierin auch als YB-1-Protein bezeichnet) in Verbindung mit der erfindungsgemäßen Expression von E1B55k und E4orf6 besser in den Kern wandert und somit eine stärkere CPE induziert, ohne zwangsläufig besser an den E2-late-Promotor zu binden im Vergleich zum nativen YB-1, wobei nicht ausgeschlossen werden soll, dass auch ein verkürztes YB-1 besser in den Kern wandert und beides macht, d.h. CPE induziert und an den E2-late-Promotor bindet. Schließlich können derartige verkürzten YB-1-Fragmente auch besser in den Kern wandern und dort effektiver an den E2-late-Promotor binden, ohne dass eine besserer CPE induziert wird. Es ist auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass verkürzte YB-1-Proteine oder -Fragmente weitere Sequenzen umfassen, wie hierin im Zusammenhang mit dem Vollängen-YB-1 beschrieben, insbesondere Zelllokalisierungssignalsequenzen (NLS) und dergleichen.

Hinsichtlich der vorstehend genannten verschiedenen weiteren, von den Adenoviren codierten bzw. exprimierten Genen und Genprodukten ist es grundsätzlich auch möglich, dass diese in beliebiger Kombination codiert bzw. exprimiert werden.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sollen hierin die Begriffe Adenovirus und adenovirale Systeme als im wesentlichen die gleiche Bedeutung aufweisend verstanden werden. Unter Adenovirus soll dabei insbesondere das vollständige Viruspartikel verstanden werden umfassend das Kapsid und die Nukleinsäure. Der Begriff adenovirales System stellt insbesondere darauf ab, dass die Nukleinsäure gegenüber dem Wildtyp verändert ist. Bevorzugt umfassen derartige Änderungen solche im Aufbau des Genoms des Adenovirus wie sie durch Deletieren und/oder Hinzufügen und/oder Mutieren von Promotoren, regulativen Sequenzen und/oder codierenden Sequenzen wie beispielsweise Leserahmen entstehen. Der Begriff adenovirale Systeme wird darüber hinaus bevorzugt in dem Zusammenhang verwendet, dass es sich dabei um einen Vektor handelt, der beispielsweise in der Gentherapie verwendet werden kann.

Die vorstehend gemachten Ausführungen, einschließlich jeglicher Verwendungen sowie die Ausbildungen der Adenoviren bzw. adenoviralen Systeme gelten im gleichen Maße für die dafür codierenden Nukleinsäuren und umgekehrt.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung ist es möglich, dass die erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren, insbesondere die Adenoviren der Gruppe II, aber auch jene der Gruppe I bzw. die für sie codierenden Nukleinsäuren eine jede entsprechende adenovirale Nukleinsäure ist, die zu einem Replikationsereignis für sich oder in Verbindung mit weiteren Nukleinsäuresequenzen führt. Dabei ist es möglich, wie hierin ausgeführt, dass mittels Helferviren die für die Replikation erforderlichen Sequenzen und/oder Genprodukte bereitgestellt werden. Sofern hierin auf codierende Nukleinsäuresequenzen Bezug genommen wird und es sich dabei um solche Nukleinsäuresequenzen handelt, die bekannt sind, ist es im Rahmen der Erfindung, dass nicht nur die identische Sequenz verwendet wird, sondern auch hiervon abgeleitete Sequenzen. Unter abgeleiteten Sequenzen sollen hierin insbesondere solche Sequenzen verstanden sein, die noch zu einem Genprodukt, sei es eine Nukleinsäure oder ein Polypeptid, führen, das eine Funktion aufweist, die einer oder der Funktion der nicht abgeleiteten Sequenz entspricht. Dies kann durch einfache, dem Fachmann geläufige Routinetests festgestellt werden. Ein Beispiel für derartige abgeleitete Nukleinsäuresequenzen sind jene Nukleinsäuresequenzen, die für das gleiche Genprodukt, insbesondere für die gleiche Aminosäuresequenz kodieren, jedoch infolge der Degeneriertheit des genetischen Codes eine andere Basenabfolge aufweisen.

Hinsichtlich des erfindungsgemäßen Adenovirus der Gruppe II und/oder des entsprechenden erfindungsgemäßen adenoviralen Replikationssystems, bzw. deren erfindungsgemäße Verwendung ist dabei in einer Ausführungsform vorgesehen, dass, sofern nicht anders angegeben, die adenovirale Nukleinsäure für die Expression des Onkogenproteins, insbesondere des E1A-Proteins defizient ist, d.h. entweder für das 12S E1A-Protein (hierin auch als E1A12S-Protein bezeichnet) nicht codiert oder für das 13S E1A-Protein (hierin auch als E1A13S-Protein bezeichnet) nicht codiert oder für sowohl das 12S E1A-Protein als auch das 13S E1A-Protein nicht codiert, oder modifiziert ist, wie hierin definiert, und das adenovirale Replikationssystem weiter eine Nukleinsäure eines Helfervirus umfasst, wobei die Nukleinsäure des Helfervirus eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die für das Onkogenprotein, insbesondere das E1A-Protein codiert, welches die folgenden Eigenschaften aufweist bzw. dem Adenovirus die

folgenden Eigenschaften verleiht, nämlich dass dieser bevorzugterweise nicht replizierend in YB-Kern-negativen Zellen aber sehr wohl in vom Zellzyklus unabhängig YB-1-Kern-positiven Zellen oder Zellen, die dereguliertes YB-1 aufweisen, replizierend ist, transaktivierend auf mindestens ein virales Gen, insbesondere E1B55kDa, E4orf6, E4orf3 und/oder E3ADP, in YB-1 kernpositiven Zellen wirkt, und/oder zelluläres YB-1 nicht in den Kern transloziert. Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die hierin beschriebenen Transgene einzeln oder gemeinsam von dem Helfervirus codiert und/oder exprimiert werden. Dies gilt sowohl für die Helferviren für die Adenoviren der Gruppe I wie auch der Gruppe II.

Weiterhin ist bei einem derartigen erfindungsgemäßen adenoviralen Replikationssystem in einer Ausführungsform vorgesehen, dass die adenovirale Nukleinsäure und/oder die Nukleinsäure des Helfervirus als replizierbarer Vektor vorliegt.

Dabei ist es weiter im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die für die Adenoviren der Gruppe I und/oder Gruppe II codierende Nukleinsäure(n) in einem Vektor, bevorzugterweise in einem Expressionsvektor vorliegt/vorliegen und dieser Expressionsvektor erfindungsgemäß verwendet wird.

In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung auch eine Vektorgruppe umfassend mindestens zwei Vektoren, wobei die Vektorgruppe insgesamt ein adenovirales Replikationssystem für die Adenoviren der Gruppe I und/oder Gruppe II umfasst, wie hierin beschrieben, und die Vektorgruppe erfindungsgemäß verwendet wird. Dabei kann vorgesehen sein, dass eine jede Komponente des adenoviralen Replikationssystems auf einem eigenen Vektor, bevorzugter Weise einem Expressionsvektor angeordnet ist.

Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung in einem weiteren Aspekt auch die Verwendung einer Zelle, die eine oder mehrere der Nukleinsäuren, wie sie für die erfindungsgemäße Verwendung der hierin beschriebenen Adenoviren der Gruppe I und/oder Gruppe II, die bevorzugterweise erfindungsgemäß verwendet werden sollen, codiert, und/oder ein entsprechendes adenovirales Replikationssystem und/oder einen entsprechenden Vektor und/oder eine erfindungsgemäße Vektorgruppe umfasst, zu denselben Zwecken, wie hierin für die verschiedenen Adenoviren beschrieben

Die vorstehend beschriebenen Konstrukte von Adenoviren und insbesondere deren Nukleinsäuren bzw. die dafür codierenden Nukleinsäuren können auch in eine Zelle, insbesondere eine Tumorzelle, in Teilen eingebracht werden, wobei dann infolge der Anwesenheit der verschiedenen Einzelkomponenten diese so zusammenwirken, als stammten die Einzelkomponenten von einer einzelnen Nukleinsäure bzw. einem einzelnen oder mehreren Adenoviren.

Die erfindungsgemäß verwendeten, für Adenoviren der Gruppe I und/oder Gruppe II, entsprechende adenovirale Systeme oder Teile davon codierenden Nukleinsäuren können als Vektoren vorliegen. Bevorzugter Weise handelt es sich um virale Vektoren. Im Falle der adenoviralen Nukleinsäuren umfassenden Nukleinsäuren ist das Viruspartikel dabei bevorzugterweise der Vektor. Es ist jedoch auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die besagten Nukleinsäuren in einem Plasmidvektor vorliegen. In einem jeden Fall weist der Vektor Elemente auf, die für die Vermehrung der inserierten Nukleinsäure, d. h. Replikation und ggf. Expression der inserierten Nukleinsäure sorgen bzw. diese steuern. Geeignete Vektoren, insbesondere auch Expressionsvektoren, und entsprechende Elemente sind den Fachleuten auf dem Gebiet bekannt und beispielsweise beschrieben in Grunhaus, A., Horwitz, M.S., 1994, Adenoviruses as cloning vectors. In Rice, C., Hrsg., Seminars in Virology, London: Saunders Scientific Publications.

Der oben beschriebenen Ausführungsform, dass die verschiedenen Elemente der besagten Nukleinsäure nicht notwendigerweise auf nur einem Vektor enthalten sein müssen, trägt der Aspekt der Erfindung Rechnung, der die Vektorgruppe betrifft. Eine Vektorgruppe umfasst entsprechend mindestens zwei Vektoren. Ansonsten gilt betreffend die Vektoren bzw. die Vektorengruppe das hierin allgemein zu Vektoren Ausgeführte.

Die Adenoviren der Gruppe I und/oder Gruppe II sind durch die verschiedenen hierin offenbarten Nukleinsäuren bzw. Genprodukte charakterisiert und können ansonsten all jene den Fachleuten auf dem Gebiet bekannten Elemente umfassen, wie dies auch bei Adenoviren vom Wildtyp der Fall ist (Shenk, T.: Adenoviridae: The virus and their replication. Fields Virology, 3. Auflage, Hrsg. Fields, B.N., Knipe, D.M., Howley, P.M. et al., Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996, Kapitel 67).

Zur Verdeutlichung, aber nicht der Beschränkung der vorliegenden Erfindung soll im Folgenden kurz allgemein auf die Replikation von Adenoviren eingegangen werden.

Die Replikation von Adenoviren ist ein ausgesprochen komplexer Vorgang und greift im Regelfalle auf den humanen Transkriptionsfaktor E2F zurück. Während einer viralen Infektion werden zunächst die „frühen Gene“ E1, E2, E3 und E4 exprimiert. Die Gruppe der „späten Gene“ ist für die Synthese der viralen Strukturproteine verantwortlich. Für die Aktivierung sowohl der frühen wie auch der späten Gene spielt die E1-Region bestehend aus zwei Transkriptionseinheiten E1A und E1B, welche für verschiedene E1A- und E1B-Proteine codieren, eine entscheidende Rolle, da sie die Transkription der E2, E3, E4-Gene induzieren (Nevins, J. R., Cell 26, 213-220, 1981). Zudem können die E1A-Proteine in ruhenden Zellen die DNA-Synthese induzieren und so deren Eintritt in die S-Phase einleiten (siehe Boulanger and Blair, 1991). Darüber hinaus interagieren sie mit den Tumorsuppressoren der Rb-Klasse (Whyte, P. et al., Nature 334, 124-127, 1988). Dabei wird der zelluläre Transkriptionsfaktor E2F freigesetzt. Die E2F-Faktoren können dann an die entsprechenden Promotorbereiche sowohl zellulärer wie auch viraler Gene binden (insbesondere an den adenoviralen E2 early Promotor) und die Transkription und somit die Replikation einleiten (Nevins, J. R., Science 258, 424-429, 1992). Die Aktivität von pRb bzw. E2F wird durch Phosphorylierung reguliert. Die hypophosphorylierte Form von pRb tritt hauptsächlich in der G1- und M-Phase auf. Dagegen tritt die hyperphosphorylierte Form von pRb in der S- und G2-Phase auf. Durch die Phosphorylierung von pRb wird E2F aus dem Komplex aus E2F und hypophosphoryliertem pRb freigesetzt. Die Freisetzung von E2F aus dem Komplex aus E2F und hypophosphoryliertem pRb führt zur Transkription von E2F-abhängigen Genen. Das E1A-Protein bindet nur an die hypophosphorylierte Form des pRb, wobei die Bindung von E1A an pRb hauptsächlich über die CR2-Region des E1A-Proteins erfolgt. Zudem bindet es auch an die CR1-Region, allerdings mit einer schwächeren Affinität (Ben-Israel and Kleiberger, Frontiers in Bioscience, 7, 1369-1395, 2002; Helt und Galloway, Carcinogenesis, 24, 159-169, 2003).

Für das Einleiten bzw. die Durchführung der Replikation werden insbesondere die Genprodukte der E2-Region benötigt, da sie für drei essentielle Proteine kodieren. Die Transkription der E2-Proteine wird durch zwei Promotoren gesteuert, den „E2-Early E2F-abhängigen“, hierin auch als E2-early Promotor oder früher E2-Promotor bezeichnet, und den „E2-late“ Promoter (Swaminathan und Thimmapaya, The Molecular Repertoire of Adenoviruses III: Current

Topics in Microbiology and Immunology, Vol 199, 177-194, Springer Verlag 1995). Zudem spielen die Produkte der E4-Region zusammen mit dem E1A- und E1B-55kDa-Protein eine wichtige Rolle für die Aktivität von E2F bzw. die Stabilität von p53. Zum Beispiel wird durch eine direkte Interaktion des von der E4-Region codierten E4orf6/7-Proteins mit dem Heterodimer bestehend aus E2F und DP1 der E2-Promoter noch stärker transaktiviert (Swaminathan und Thimmapaya, JBC 258, 736-746; 1996). Weiterhin wird p53 durch den Komplex bestehend aus E1B-55kDa und E4orf6 inaktiviert (Steegenga, W. T. et al., Oncogene 16, 349-357, 1998), um einen erfolgreichen lytischen Infektionszyklus durchlaufen zu können. Ferner besitzt das E1B-55kDa Protein eine weitere wichtige Funktion insoweit, als dass es in Wechselwirkung mit dem E4orf6 Protein den Export der viralen RNA aus dem Zellkern fördert, wohingegen die zelleigenen RNAs im Kern zurückgehalten werden (Bridge und Ketner, Virology 174, 345-353, 1990). Eine weitere wichtige Beobachtung ist die, dass der Proteinkomplex bestehend aus E1B-55kDa/E4orf6 in den sogenannten „viral inclusion bodies“ lokalisiert ist. Es wird angenommen, dass diese Strukturen Orte der Replikation und Transkription darstellen (Ornelles und Shenk, J. Virology 65, 424-429, 1991).

Eine weitere für die Replikation und insbesondere für die Freisetzung von Adenoviren besonders wichtige Region ist die E3-Region. Die E3-Region enthält genauer die genetische Information für eine Vielzahl von relativ kleinen Proteinen, die für den adenoviralen Infektionszyklus *in vitro*, d.h. in der Zellkultur nicht essentiell sind. Sie spielen jedoch für das Überleben des Virus während einer akuten und/oder latenten Infektion *in vivo* eine bedeutende Rolle, da sie unter anderem immunregulatorische und apoptotische Funktion(en) besitzen (Marshall S. Horwitz, Virologie, 279, 1-8, 2001; Russell, a.a.O.). Es konnte gezeigt werden, dass ein Protein mit einer Größe von ca. 11,6 kDa den Zelltod induziert. Das Protein wurde infolge seiner Funktion als ADP - für den englischen Begriff adenovirus death protein - bezeichnet (Tollefson, J. Virology, 70, 2296-2306, 1996). Das Protein wird vornehmlich in der späten Phase des Infektionszyklus gebildet. Ferner führt die Überexpression des Proteins zu einer besseren Lyse der infizierten Zellen (Doronin et al., J. Virology, 74, 6147-6155, 2000).

Weiterhin ist dem vorliegenden Erfinder bekannt, dass E1A-deletierte Viren, d.h. insbesondere solche Viren, die kein 12S E1A-Protein und auch kein 13S E1A-Protein exprimieren, bei höheren MOI's sehr effizient replizieren können (Nevins J. R., Cell 26, 213-220, 1981), die jedoch in der klinischen Anwendung nicht zu realisieren sind. Dieses Phänomen wird in der

Literatur als „E1A-like activity“ bezeichnet. Ferner war bekannt, dass von den von E1A insgesamt 5 codierten Proteinen zwei Proteine, nämlich das 12S- und das 13S-Protein, die Expression der anderen adenoviralen Gene steuern bzw. induzieren (Nevins, J. R., *Cell* 26, 213-220, 1981; Boulanger, P. und Blair, E.; *Biochem. J.* 275, 281-299, 1991). Dabei hat sich gezeigt, dass hauptsächlich die CR3-Region des 13S-Proteins die transaktivierende Funktion ausübt (Wong HK und Ziff EB., *J Virol.*, 68, 4910-20, 1994). Adenoviren, die bestimmte Deletionen in der CR1- und/oder CR2-Region und/oder CR3-Region des 13S-Proteins aufweisen, sind weitestgehend replikationsdefekt, wirken aber noch bei einzelnen Zelllinien transaktivierend auf die viralen Gene bzw. Promotoren, insbesondere auf die E2 Region (Wong HK, Ziff EB., *J Virol.* 68, 4910-20, 1994; Mymryk, J. S. und Bayley, S. T., *Virus Research* 33, 89-97, 1994).

Nach Infektion einer Zelle, typischerweise einer Tumorzelle, mit einem Wildtyp-Adenovirus wird YB-1 vermittelt durch E1A, E1B-55K und E4orf6 in den Kern induziert und colokalisiert mit E1B-55K im Kern in den viral inclusion bodies, was eine effektive Replikation des Virus im Zellkern sowohl in vitro als auch in vivo erlaubt. Dabei war bereits früher festgestellt worden, dass auch E4orf6 an E1B-55 K bindet (Weigel, S. und Dobbelstein, M. J. *Virology*, 74, 764-772, 2000; Keith N. Leppard, *Seminars in Virology*, 8, 301-307, 1998.) und somit den Transport bzw. die Verteilung von E1B-55K in den Kern vermittelt, was eine optimale Virusproduktion bzw. adenovirale Replikation gewährleistet. Durch das Zusammenwirken von E1A, E1B-55K und YB-1 bzw. durch den Komplex aus E1B-55K/E4orf6 mit YB-1 und der Kolokalisation von YB-1 und E1B-55K im Kern in den sogenannten viral inclusion bodies ist eine erfindungsgemäße effiziente Replikation des Virus, und damit die Verwendung der hierin beschriebenen Viren zur Replikation in Zellen, die YB-1-Kern-positiv sind, bevorzugterweise solche Zellen, die Zellzyklus-unabhängig YB-1 im Zellkern enthalten und/oder Zellen, die dereguliertes YB-1 enthalten oder aufweisen, bzw. zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung von Erkrankungen, bei denen YB-1-Kern-positive Zellen, bevorzugterweise solche Zellen, die Zellzyklus-unabhängig YB-1 im Zellkern enthalten und/oder Zellen, die dereguliertes YB-1 enthalten oder aufweisen, beteiligt sind, möglich. Die dadurch vor diesem zellulären Hintergrund mögliche Replikation führt zu einer Lyse der Zelle, Freisetzung des Virus und Infektion und Lyse benachbarter Zellen, so dass im Falle der Infektion einer Tumorzelle bzw. eines Tumors letztlich eine Lyse des Tumors, d.h. eine Onkolyse, eintritt.

YB-1 gehört zu einer Gruppe hoch konservierter Faktoren, die an der invertierten CAAT-Sequenz, der sogenannten Y-Box, binden. Sie können sowohl auf der Ebene der Transkription als auch der Translation regulatorisch wirken (Wolffe, A. P. *Trends in Cell Biology* 8, 318-323, 1998). Es werden immer mehr Y-Box-abhängige Regulationswege bei der Aktivierung aber auch bei der Hemmung Wachstums- und Apoptose-assoziiierter Gene aufgefunden (Swamynathan, S. K. et al., *FASEB J.* 12, 515-522, 1998). So interagiert YB-1 direkt mit p53 (Okamoto, T. et al., *Oncogene* 19, 6194-6202, 2000), spielt eine wichtige Rolle bei der Fas-Genexpression (Lasham, A. et al., *Gene* 252, 1-13, 2000), MDR und MRP-Genexpression (Stein, U. et al., *JBC* 276, 28562-69, 2001; Bargou, R. C. et al., *Nature Medicine* 3, 447-450, 1997) und bei der Aktivierung von Topoisomerasen und Metalloproteinasen (Mertens. P. R. et al., *JBC* 272, 22905-22912, 1997; Shibao, K. et al., *Int. J. Cancer* 83, 732-737, 1999). Zudem ist YB-1 an der Regulation der mRNA-Stabilität (Chen, C-Y. et al., *Genes & Development* 14, 1236-1248, 2000) und an Reparaturvorgängen beteiligt (Ohga, T. et al., *Cancer Res.* 56, 4224-4228, 1996; Izumi H. et al., *Nucleic Acid research* 2001, 29, 1200 – 1207; Ise T. et al., *Cancer Res.* 1999, 59, 342 - 346).

Die nukleäre Lokalisation von YB-1 in Tumorzellen, sei es dass YB-1 Zellzyklus-unabhängig im Zellkern vorliegt, sei es dass im Cytoplasma vorhandenes dereguliertes YB-1 durch die Adenoviren der Gruppe I und/oder II in den Zellkern transloziert wird, führt zu einer E1A-unabhängigen viralen Replikation, bei der insbesondere weder ein 12S E1A-Protein noch ein 13S E1A-Protein exprimiert vorliegt bzw. verwendet wird, (Holm, P. S. et al. *JBC* 277, 10427-10434, 2002) und im Falle der Überexpression des Proteins YB-1 zu einer multidrug resistance (Vielfachresistenz). Zudem ist bekannt, dass die adenoviralen Proteine wie z. B. E4orf6 und E1B-55K einen positiven Effekt auf die virale Replikation ausüben (Goodrum, F. D. und Ornelles, D. A, *J. Virology* 73, 7474-7488, 1999), wobei ein funktionelles E1A Protein für das Einschalten der anderen viralen Genprodukte (z. B. E4orf6, E3ADP und E1B-55K) verantwortlich ist (Nevins J. R., *Cell* 26, 213-220, 1981). Dies unterbleibt jedoch bei den im Stand der Technik bekannten E1A-minus Adenoviren, bei denen das 13S E1A-Protein nicht vorhanden ist. Die Kernlokalisation von YB-1 in multidrug resistenten Zellen, die YB-1 im Kern aufweisen, erlaubt die Replikation bzw. Partikelbildung derartiger E1A-minus Viren. Hierbei ist jedoch die Effizienz der viralen Replikation bzw. Partikelbildung im Vergleich zum Wildtyp Ad5 um ein Vielfaches geringer. Eine Kombination von YB-1, welches entwe-

der bereits im Zellkern der Tumorzelle, sei es dass YB-1 Zellzyklus-unabhängig im Zellkern vorliegt, sei es dass im Cytoplasma vorhandenes dereguliertes YB-1 durch die Adenoviren der Gruppe I und/oder II in den Zellkern transloziert wird, enthalten ist, oder durch äußere Faktoren (z.B. Applikation von Zytostatika oder Bestrahlung oder Hyperthermie) in den Zellkern induziert, d.h. veranlasst wird, im Zellkern vorhanden zu sein, insbesondere unabhängig vom Zellzyklus vorhanden zu sein, oder als Transgen durch einen Vektor eingeführt wird, mit einem System, bevorzugterweise mit einem adenoviralen System, welches die adenoviralen Gene einschaltet, aber nicht zur viralen Replikation fähig ist, stellt demgegenüber überraschenderweise ein System dar, welches eine sehr effektive virale Replikation bzw. Partikelbildung durch YB-1 vermittelt und damit eine Onkolyse erlaubt. Gleiches gilt auch für die erfindungsgemäßen Adenoviren, d.h. die Adenoviren der Gruppe I, die durch ihre spezielle Ausgestaltung und Ausnutzung des Effektes, dass ein E1B-Protein, bevorzugterweise das E1B55K-Protein, und/oder ein E4-Protein, bevorzugterweise das E4orf6-Protein, für eine effektive Bereitstellung von YB-1, bevorzugterweise im Kern für eine wirksame Replikation geeignet sind. Geeignete Zytostatika, die zusammen mit den hierin offenbarten Adenoviren im Rahmen der verschiedenen Aspekte der vorliegenden Erfindungen verwendet werden können, sind beispielsweise solche, die zu den folgenden Gruppen gehören: Anthracycline, wie beispielsweise Daunomycin und Adriamycin; Alkylanzien, wie beispielsweise Cyclophosphamid; Alkaloide, wie beispielsweise Etoposid; Vin-Alkaloide, wie beispielsweise Vincristin und Vinblastin; Antimetabolite wie beispielsweise 5-Fluorouracil und Methotrexat; Platin-Derivate, wie beispielsweise cis-Platin; Topoisomerase-Inhibitoren, wie beispielsweise Camptothecin, CPT-11; Taxane, wie beispielsweise Taxol, Paclitaxel, Histone-Deacetylasenhibitoren wie beispielsweise FR901228, MS-27-275, Trichostatin A, MDR-Modulatoren, wie beispielsweise MS-209, VX-710 und Geldanamycin-Derivate wie beispielsweise 17-AAG. Die hierin offenbarten Adenoviren, insbesondere rekombinanten Adenoviren, welche nur in YB-1-Kern-positiven Zellen zur Replikation befähigt sind bzw. solchen Zellen, die dereguliertes YB-1, bevorzugterweise im Cytoplasma aufweisen, sind in ihrer Fähigkeit, transaktivierend auf die viralen Gene E1B-55K, E4orf6, E4orf3 und E3ADP zu wirken, beschränkt, verglichen mit den diesbezüglichen transaktivierenden Fähigkeiten von Adenoviren vom Wildtyp, insbesondere vom Wildtyp Ad5. Der vorliegende Erfinder hat nun überraschenderweise festgestellt, dass diese beschränkte transaktivierende Fähigkeit dadurch aufgehoben werden kann, dass die entsprechenden Gene und insbesondere E1B-55K und E4orf6 in Verbindung mit der Kernlokalisation von YB-1 zur Expression gebracht werden.

Wie in den Beispielen hierin gezeigt wird, erhöht sich die virale Replikation bzw. Partikelbildung unter diesen Umständen auf ein Niveau, welches vergleichbar ist mit dem Replikationsverhalten bzw. Partikelbildungsverhalten von Adenoviren vom Wildtyp.

Bei dem Medikament, im Rahmen dessen oder bei dessen Herstellung die hierin beschriebenen Adenoviren erfindungsgemäß verwendet werden, ist vorgesehen, dass dieses in der Regel systemisch appliziert wird, gleichwohl es auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist, wenn dieses lokal appliziert oder abgegeben wird. Die Applikation erfolgt mit der Absicht, dass insbesondere jene Zellen mit dem Adenovirus infiziert werden und insbesondere darin eine Replikation der Adenoviren erfolgt, bei denen eine Beteiligung, bevorzugter Weise kausal, an der Ausbildung eines Zustandes, typischerweise einer Erkrankung, vorliegt, zu deren Diagnose und/oder Prävention und/oder Behandlung das erfindungsgemäße Medikament verwendet wird.

Ein derartiges Medikament ist bevorzugter Weise für die Behandlung von malignen Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Krebserkrankungen, Krebs und Tumoren, wobei diese Begriffe hierin im wesentlichen synonym verwendet werden, sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, vorgesehen. Dabei sind jene Tumorerkrankungen besonders bevorzugt, bei denen entweder YB-1 bereits im Zellkern, bevorzugterweise unabhängig vom Zellzyklus infolge des der Tumorerkrankung zugrundeliegenden Mechanismus, insbesondere des zugrundeliegenden pathologischen Mechanismus, vorliegt, oder aber durch äußere Maßnahmen die Anwesenheit von YB-1 im Zellkern bedingt wird, wobei die Maßnahmen geeignet sind, YB-1 in den Zellkern zu transferieren, dort zu induzieren oder dort zu exprimieren. Der Begriff Tumor oder Tumorerkrankung soll hierbei sowohl maligne wie benigne Tumoren, jeweils auch solide oder diffuse Tumoren umfassen, und entsprechende Erkrankungen bezeichnen. Dabei kann vorgesehen sein, dass das Medikament mindestens eine weitere pharmazeutisch wirksame Verbindung enthält. Die Art und der Umfang dieser weiteren pharmazeutisch aktiven Verbindungen wird dabei von der Art der Indikation abhängen, für die das Medikament eingesetzt wird. Im Falle der Verwendung des Medikamentes für die Behandlung und/oder die Prophylaxe von Tumorerkrankungen werden typischerweise Zytostatika, wie beispielsweise cis-Platin und Taxol, Daunoblastin, Daunorubicin, Adriamycin und/oder Mitoxantron oder andere der hierin beschriebenen Zytostatika oder Gruppen von Zytostatika verwendet, insbesondere jene, wie

sie im Zusammenhang mit der durch Zytostatika verursachten Kernlokalisation von YB-1 beschrieben sind..

Das erfindungsgemäße Medikament kann dabei in verschiedenen Formulierungen vorliegen, bevorzugter Weise in einer flüssigen Form. Weiterhin wird das Medikament Hilfsstoffe wie Stabilisatoren, Puffer, Konservierungsstoffe und dergleichen enthalten, die dem Fachmann auf dem Gebiet der Galenik bekannt sind.

Der vorliegende Erfinder hat weiterhin überraschend gefunden, dass die Wirksamkeit der hierin beschriebenen und insbesondere der erfindungsgemäß verwendeten Viren dadurch erhöht werden kann, dass er in Kombination mit mindestens zwei Mitteln verwendet wird, wobei ein jedes der mindestens zwei Mittel einzeln und unabhängig aus der Gruppe ausgewählt ist, die Cytostatika umfasst.

Wie hierin in einer bevorzugten Ausführungsform verwendet sind Cytostatika insbesondere chemische oder biologische Verbindungen, die während oder nach der Verabreichung an eine Zelle oder einen Organismus, der eine oder diese Zelle enthält, dazu führen, dass die Zelle nicht mehr wächst und/oder sich nicht mehr teilt bzw. die Zellteilung und/oder das Zellwachstum verlangsamen. Cytostatika sind dabei auch solche Verbindungen, die erst in der Zelle oder in dem diese enthaltenden Organismus zu einem Cytostatikum im vorstehend beschriebenen Sinne werden. Insoweit umfasst der Begriff der Cytostatika auch Prä-Cytostatika.

Cytostatika werden bevorzugt nach ihrem Wirkmechanismus eingeteilt. Dabei werden die folgenden Gruppen verschieden, die grundsätzlich alle im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet werden können:

- Alkylanzien, d.h. chemische Verbindungen, die ihre zytotoxische Wirkung durch Alkylierung von Phosphat-, Amino-, Sulfhydryl-, Carboxyl- und Hydroxylgruppen der Nukleinsäure sowie Protein bedingen. Derartige Verbindungen wirken selbst oft kanzerogen. Typische Beispiele dieser Gruppe von Cytostatika sind Cisplatin bzw. Platin-Derivate, Cyclophosphamid, Dacarbazin, Mitomycin, Procarbazin.

- Antimetabolite, d.h. Verbindungen, die aufgrund struktureller Ähnlichkeit oder Fähigkeit zur Bindung einen Stoffwechselprozess blockieren oder beeinträchtigen. Innerhalb der Gruppe der Antimetabolite unterscheidet man wiederum zwischen strukturähnlichen Antimetaboliten, strukturverändernden Antimetaboliten und den indirekt wirkenden Antimetaboliten. Bei den strukturähnlichen Antimetaboliten konkurrieren diese aufgrund chemischer Ähnlichkeit mit dem Metaboliten, ohne Übernahme dessen Funktion. Strukturverändernde Antimetaboliten binden den Metaboliten, was dessen Funktion oder Resorption verhindert oder den Metaboliten chemisch modifiziert. Indirekt wirkende Antimetaboliten beeinträchtigen die Funktion des Metaboliten, beispielsweise über Bindung von Ionen. Typische Beispiele dieser Gruppe sind Folsäureantagonisten wie z.B. Methotrexat, Pyrimidinanaloga wie z.B. Fluoruracil, Purinanaloga wie z.B. Azathioprin und Mercaptopurin.

- Mitosehemmstoffe, d.h. die Zellteilung hemmen. Innerhalb der Gruppe der Mitosehemmstoffe erfolgt eine Unterscheidung in Zellteilungsgifte, Spindelgifte und Chromosomengifte. Typische Beispiele dieser Gruppe sind Taxane und Vinca-Alkaloide. Die Taxane können dabei wiederum in die beiden Hauptgruppen Taxole und Taxotere eingeteilt werden, wobei ein besonders bevorzugtes Taxol Paclitaxel ist und ein besonders bevorzugtes Taxoter Docetaxel ist.

- Antibiotika mit hemmender Wirkung auf die DNA-abhängige RNA-Polymerase. Typische Beispiele dafür sind die Anthrazykline, so zum Beispiel Bleomycin, Daunorubicin, Doxorubicin und Mitomycin.

- Topoisomerase-Hemmer, insbesondere Topoisomerase-I-Hemmer. Topoisomerase-Hemmer sind chemische Verbindungen, die die Tertiärstruktur der DNA bestimmen, indem sie in einem dreistufigen Prozess die Veränderung der DNA-Verwindungszahl katalysieren. Dabei werden im wesentlichen zwei Formen von Topoisomerasen unterschieden. Topoisomerasen vom Typ I spalten nur einen DNA-Strang und sind ATP-unabhängig, wohingegen Topoisomerasen vom Typ II beide Stränge einer DNA spalten, wobei diese ATP-abhängig sind. Typische Beispiele hierfür sind Irinotecan und Topotecan für Topoisomerase-I- -Inhibitoren und Etoposid für Topoisomerase II-Inhibitoren.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden mindestens zwei Mittel aus der vorstehenden Gruppe ausgewählt, Es ist jedoch auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass insbesondere auch drei, vier oder fünf verschiedene Mittel ausgewählt werden. Die folgenden Ausführungen werden für die Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gemacht, bei der lediglich zwei Mittel zusammen mit dem Virus verwendet werden. Die Ausführungen gelten sinngemäß auch für die Ausführungsform, bei der mehr als zwei Mittel verwendet werden.

Bevorzugterweise unterscheiden sich die Mittel darin, dass sie an unterschiedlichen Zielmolekülen angreifen, oder in der Literatur an verschiedene Moleküle angreifend beschrieben werden. Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass das Mittel auch zwei oder mehr verschiedene Verbindungen umfasst, die an das gleiche Zielmolekül binden. Es ist jedoch auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass das eine Mittel an einem ersten Ort des Zielmoleküls bindet, während das zweite Mittel an einem zweiten Ort des Zielmoleküls bindet.

Es ist ebenfalls im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass mindestens zwei der Mittel über einen unterschiedlichen Wirkmechanismus aktiv sind. Aktiv bedeutend in einer bevorzugten Ausführungsform, dass die das Zellwachstum und/oder Zellteilung inhibierende oder verzögernde Wirkung der chemischen Verbindung jeweils über einen unterschiedlichen Wirkmechanismus aktiv ist. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform bedeutet der Begriff aktiv, dass dadurch die Effizienz der Replikation eines Virus, insbesondere des erfindungsgemäßen Virus, der hierin beschriebenen Viren und/oder der hierin erfindungsgemäß zu verwendenden Viren, erhöht wird verglichen mit einer Situation, bei der eines und/oder beide der Mittel nicht verwendet werden. Als Maß für die Effizienz der Replikation des Virus wird bevorzugterweise die Anzahl der für die Zelllyse erforderliche Anzahl von Viren, bevorzugterweise ausgedrückt als pfu/Zelle.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist eines der mindestens zwei Mittel ein solches, das die Infizierbarkeit der Zelle, in der die Replikation des Virus erfolgen soll, bevorzugt selektiv erfolgen soll, mit dem Virus, bevorzugterweise dem hierin beschriebenen Virus und/oder dem hierin erfindungsgemäß zu verwendenden Virus, erhöht. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Aufnahme des Virus durch die Zelle erhöht wird. Die Aufnahme des Virus, insbesondere von Adenovirus, wird beispielsweise durch den Coxsackievirus-Adenovirus Rezeptor vermittelt (CAR) (Mizuguchi und Hayakawa, GENE 285, 69-

77, 2002) vermittelt. Eine erhöhte Expression von CAR wird beispielsweise durch Trichostatin A bedingt (Vigushin et al., *Clinical Cancer Research*, 7, 971-976, 2001).

In einer weiteren Ausführungsform ist eines der mindestens zwei Mittel ein solches, welches die Verfügbarkeit einer Komponente innerhalb der Zelle erhöht, wobei die Komponente eines solche ist, die die Replikation des Virus, bevorzugterweise dem hierin beschriebenen Virus und/oder dem hierin erfindungsgemäß zu verwendenden Virus, erhöht.

In einer weiteren Ausführungsform ist eines der mindestens zwei Mittel ein solches, welches den Transport von YB-1 in den Zellkern vermittelt. Ein derartiges Mittel kann aus der Gruppe ausgewählt sein, die Topoisomerase-Hemmer, Alkylanzien, Antimetabolite und Mitose-Hemmstoffe umfasst. Bevorzugte Topoisomerase-Hemmer sind Camptothecin, Irinotecan, Etoposide und deren jeweilige Analoga. Bevorzugte Mitose-Hemmstoffe sind Daunorubicin, Doxorubicin Paclitaxel und Docetaxel. Bevorzugte Alkylanzien sind Cisplatin und deren Analoga- Bevorzugte Antimetabolite sind Fluoruracil und Methotrexat.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das eine der mindestens zwei Mittel ein solches, das die Infizierbarkeit der Zelle erhöht, insbesondere die Expression von CAR erhöht, und das zweite der mindestens zwei Mittel ein solches, das den Transport von YB-1 in den Zellkern erhöht, wobei bevorzugterweise als chemische Verbindung eine solche verwendet wird, die die entsprechende erforderliche Eigenschaft aufweist, wie bevorzugt vorstehend erwähnt.

In einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass das eine der mindestens zwei Mittel ein Histon-Deacylase-Inhibitor ist. Ein bevorzugter Histon-Deacylase-Inhibitor ist ein solcher, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die Trichostatin A, FR901228, MS-27-275, NVP-LAQ824 und PXD101 umfasst. Trichostatin A ist beispielsweise beschrieben in Vigushin et al., *Clinical Cancer Research*, 7, 971-976, 2001; FR901228 ist beispielsweise beschrieben in Kitazono et al., *Cancer Res.*, 61, 6328-6330, 2001; MS-27-275 beschrieben in Jaboin et al., *Cancer Res.*, 62, 6108-6115, 2002; PXD101 beschrieben in Plumb et al., *Mol. Cancer Ther.*, 8, 721-728, 2003; NVP-LAQ824 beschrieben in Atadja et al., *Cancer Res.*, 64, 689-695, 2004.

In einer noch weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass das eine der mindestens zwei Mittel ein Topoisomerase-Inhibitor, bevorzugterweise in Topoisomerase I-Inhibitor ist. Ein bevorzugter Topoisomerase-Inhibitor ist ein solcher, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die Camptothecine, Irinotecan, Topotecan, SN-38, 9-aminocamptothecin, 9-nitrocamptothecin und DX-8951f umfasst. Irinotecan und SN-38 ist beispielsweise beschrieben in Gilbert et al., *Clinical Cancer Res.*, 9, 2940-2949, 2003; DX-8951f beschrieben in van Hattum et al., *British Journal of Cancer*, 87, 665-672, 2002; Camptothecin beschrieben in Avemann et al., *Mol. Cell. Biol.*, 8, 3026-3034, 1988; 9-aminocamptothecin, 9-nitrocamptothecin beschrieben in Rajendra et al., *Cancer Res.*, 63, 3228-3233, 2003.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das eine der mindestens zwei Mittel ein Histon-Deacetylase-Inhibitor und das andere der mindestens zwei Mittel ein Topoisomerase-Inhibitor.

In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass das erfindungsmäße Mittel und/oder das erfindungsgemäß hergestellte Mittel den Virus getrennt von einem oder mehreren der mindestens zwei Mittel, die mit dem Virus erfindungsgemäß kombiniert sind, enthält. Dabei ist bevorzugt, dass der Virus von einem jeglichen Mittel, das mit dem Virus kombiniert wird, getrennt. Bevorzugterweise ist die Trennung eine räumliche Trennung. Die räumliche Trennung kann dabei so erfolgen, dass der Virus in einer anderen Verpackung vorliegt als die Mittel. Bevorzugterweise handelt es sich bei der Verpackung um eine Einzeldose, d.h. der Virus und die Mittel sind in Einzeldosen verpackt. Die Einzeldosen können wiederum zu einer Packung zusammengefasst sein. Es ist jedoch auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die Einzeldosen des Virus mit einer oder mehreren Einzeldosen eines oder mehrerer der Mittel kombiniert oder verpackt ist.

Die Art der Verpackung hängt dabei in der den Fachleuten auf dem Gebiet bekannten Art von der Art der Verabreichung ab. Bevorzugterweise wird der Virus als Lyophilisat oder in einer geeigneten flüssigen Phase vorliegen. Bevorzugterweise werden die Mittel in fester Form vorliegen, z.B. als Tabletten oder Kapseln, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Alternativ können die Mittel auch in flüssiger Form vorliegen.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass der Virus systemisch oder lokal verabreicht wird. Es ist auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die mit dem Virus kombinierten Mittel einzeln unabhängig voneinander oder gemeinsam systemisch oder lokal verabreicht werden. Den Fachleuten auf dem Gebiet sind weitere Verabreichungsformen bekannt.

Es ist weiterhin im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass der Virus und die mit ihm kombinierten Mittel zeitlich getrennt oder gleichzeitig verabreicht werden. Bei zeitlich getrennter Verabreichung ist es bevorzugt, dass die Mittel vor der Verabreichung des Virus verabreicht werden. Die Zeitspanne, wie lange vorher die Mittel vorher verabreicht werden, hängt von der Art der verwendeten Mittel ab und ergibt sich für den Fachmann aus der Wirkungsweise der verwendeten Mittel. Dabei kann auch die Verabreichung der mindestens zwei Mittel wiederum gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Bei zeitlich unterschiedlicher Verabreichung ergeben sich die Zeitpunkte wiederum aus den den Mitteln zugrundeliegenden Wirkmechanismen und können von den Fachleuten auf der Grundlage davon festgelegt werden.

Die vorstehenden Ausführungen, die im Zusammenhang mit den Medikamenten gemäß der vorliegenden Erfindung, die hierin auch als pharmazeutische Zusammensetzungen offenbart und/oder bezeichnet werden, gemacht wurden, gelten sinngemäß auch für eine jegliche Zusammensetzung, so auch für Zusammensetzungen, wie sie erfindungsgemäß für die Replikation von Viren verwendet werden, bevorzugterweise für die *in vitro* Replikation von Viren. Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für den erfindungsgemäßen Kit bzw. den erfindungsgemäß verwendeten Kit, der neben der hierin beschriebenen Viren bzw. den erfindungsgemäß verwendeten Viren, auch ein oder eine Kombination von Mitteln, wie hierin beschrieben, umfassen kann. Derartige Kits umfassen den Virus und/oder das oder die Mittel in einer für die Anwendung fertigen Form und bevorzugterweise noch eine Gebrauchsanweisung. Weiterhin gelten die vorstehenden Ausführungsformen auch für die hierin offenbarten Nukleinsäuren und die erfindungsgemäß verwendeten Nukleinsäuren, und die erfindungsgemäßen Replikationssysteme und die dafür codierenden Nukleinsäuren bzw. die erfindungsgemäß verwendeten Replikationssysteme und die erfindungsgemäß verwendeten dafür codierenden Nukleinsäuren.

Der vorliegende Erfinder hat desweiteren überraschenderweise festgestellt, dass die erfindungsgemäße Verwendung der hierin beschriebenen Viren, bevorzugterweise der Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II mit besonders großer Erfolgsrate bei solchen Tumoren bzw. für die Herstellung von Medikamenten für die Behandlung solcher Tumoren verwendet werden kann, bei denen YB-1 unabhängig vom Zellzyklus im Zellkern vorkommt. Normalerweise ist YB-1 im Cytoplasma, insbesondere auch im perinukleären Plasma, vorhanden. In der G1/S-Phase des Zellzyklus findet sich YB-1 im Zellkern von sowohl normalen wie auch Tumorzellen, wobei jedoch ein Teil des YB-1 im Cytoplasma verbleibt [Jürchott K et al., JBC 2003, 278, 27988-27996.]. Dies ist jedoch nicht ausreichend, um eine virale Onkolyse unter Verwendung derartiger modifizierten Adenoviren zu bewerkstelligen. Die im Stand der Technik beschriebene vergleichsweise geringe Wirksamkeit von derartigen attenuierten Adenoviren beruht letztlich auf deren fehlerhaften Anwendung. Mit anderen Worten, es können derartige adenovirale Systeme, insbesondere auch mit einer größeren Wirksamkeit dort eingesetzt werden, wo die molekularbiologischen Voraussetzungen für eine virale Onkolyse unter Verwendung dieser, hierin beschriebenen attenuierten oder modifizierten Adenoviren, bevorzugterweise der Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II, gegeben sind. Im Falle der hierin erfindungsgemäß zu verwendend beschriebenen Adenoviren, wie beispielsweise Ad Δ 24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB016, dl520 und die im europäischen Patent EP 0 931 830 beschriebenen rekombinanten Adenoviren, liegen diese Voraussetzungen bei solchen Tumorerkrankungen vor, deren Zellen eine vom Zellzyklus unabhängige Kernlokalisation von YB-1 aufweisen. Diese Form der Kernlokalisation kann dabei durch die Art des Tumors selbst bedingt sein, oder aber durch die hierin beschriebenen erfindungsgemäßen Agenzien oder Maßnahmen bewirkt werden. Die vorliegende Erfindung definiert somit eine neue Gruppe von Tumoren bzw. Tumorerkrankungen und damit auch von Patienten, die mit den erfindungsgemäßen Viren, bevorzugterweise der Gruppe I und/oder der Gruppe II, aber auch mit den im Stand der Technik bereits beschriebenen attenuierten oder modifizierten Adenoviren noch wirksam behandelt werden können.

Eine weitere Gruppe von Patienten, die erfindungsgemäß unter Verwendung der Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II, und auch der hierin als erfindungsgemäß zu verwenden beschriebenen, im Stand der Technik als solches wenigstens zum Teil bekannten Adenoviren, oder unter Verwendung der hierin erstmalig beschriebenen Adenoviren behandelt werden

können, insbesondere unter Verwendung solcher Adenoviren, die Mutationen bzw. Deletionen im E1A-Protein aufweisen, welche die Bindungen von Rb/E2f nicht stören oder aber in YB-1-Kern-negativen Zellen nicht replizieren oder eine stark verringerte Replikation, wie hierin definiert und/oder ein deletiertes Onkoprotein, insbesondere E1A, aufweisen bzw. zeigen, wie beispielsweise im Falle der Viren AdΔ24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB106 und der im europäischen Patent EP 0931 830 beschriebenen Adenoviren, sind jene Patienten, bei denen durch Anlegen oder Realisieren bestimmter Bedingungen gewährleistet wird, dass YB-1 in den Kern wandert oder dort induziert oder dorthin transportiert wird oder YB-1 dereguliert vorliegt. Die Verwendung Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II bei dieser Patientengruppe beruht insoweit auf der Erkenntnis, dass die Induktion der viralen Replikation auf der Kernlokalisierung von YB-1 mit anschließender Bindung von YB-1 an den E2-late-Promotor beruht. Infolge der hierin offenbarten Erkenntnisse können Adenoviren wie beispielsweise AdΔ24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB106 und/oder die im europäischen Patent EP 0931 830 beschriebenen, auch in solchen Zellen replizieren, die YB-1 Kern-positiv sind und/oder in Zellen, in den YB-1 dereguliert im Sinne der vorliegenden Erfindung vorliegt. Insoweit können diese Adenoviren erfindungsgemäß für die Behandlung von Erkrankungen bzw. Patientengruppen verwendet werden, die Zellen mit diesen Eigenschaften aufweisen, insbesondere dann, wenn diese Zellen an der Ausbildung der jeweiligen zu behandelnden Erkrankung beteiligt sind. Dies begründet den Erfolg von AdΔ24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB016 und der im Patent EP 0931 830 beschriebenen Adenoviren bzw. der Adenoviren der Gruppe I und/oder II bei der erfindungsgemäßen Behandlung solcher Tumoren, die YB-1 Zellzyklus-unabhängig im Kern oder YB-1 dereguliert im Sinne der vorliegenden Offenbarung aufweisen. Eine weitere Gruppe von Patienten, die erfindungsgemäß unter Verwendung der hierin als erfindungsgemäß zu verwenden beschriebenen Viren bzw. unter Verwendung der hierin erstmalig beschriebenen Viren, insbesondere Adenoviren, bzw. der Adenoviren der Gruppe I und/oder Gruppe II behandelbar sind, sind somit solche, die YB-1 Kern-positiv sind und/oder YB-1 Kern-positiv sind als Ergebnis der nachfolgend beschriebenen Behandlungen und/oder solche Patienten, die eine der nachfolgenden Maßnahmen, bevorzugt im Sinne einer Behandlung, vor der Verabreichung der Adenoviren erfahren haben, gleichzeitig mit der Gabe der entsprechenden Viren erfahren oder nach der Verabreichung der Adenoviren erfahren werden. Dabei ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass YB-1 Kern-positive Patienten solche Patienten sind, die insbesondere in einer Anzahl der einen Tumor ausbildenden

Zellen YB-1 unabhängig vom Zellzyklus im Kern aufweisen und/oder dereguliertes YB-1 aufweisen. Zu diesen Maßnahmen gehört die Verabreichung von Zytostatika, wie sie hierin insgesamt beschrieben sind und/oder im Rahmen einer Tumorthherapie verwendet werden. Weiterhin gehört zu dieser Gruppe von Maßnahmen Bestrahlung, insbesondere eine Bestrahlung, wie sie im Rahmen einer Tumorthherapie angewandt wird. Bestrahlung bedeutet dabei insbesondere die Bestrahlung mit energiereicher Strahlung, bevorzugterweise mit radioaktiver Strahlung, bevorzugterweise wie sie im Rahmen einer Tumorthherapie verwendet wird. Eine weitere Maßnahme stellt Hyperthermie bzw. das Anlegen von Hyperthermie dar, bevorzugterweise Hyperthermie, wie sie im Rahmen einer Tumorthherapie verwendet wird. In einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass die Hyperthermie lokal angewandt wird. Schließlich ist eine weitere Maßnahme die Hormonbehandlung, insbesondere die Hormonbehandlung, wie sie bei der Tumorbehandlung zur Anwendung gelangt. Im Rahmen einer derartigen Hormonbehandlung werden Anti-Östrogene und/oder Anti-Androgene verwendet. Dabei werden Anti-Östrogene, wie beispielsweise Tamoxifen, insbesondere bei der Therapie von Brustkrebs verwendet und Anti-Androgene, wie beispielsweise Flutamid oder Cyproteronacetat, bei der Therapie von Prostatakrebs verwendet.

Die hierin offenbarten Adenoviren können auch für die Behandlung von Tumoren, verwendet werden, wobei die Tumoren ausgewählt sind aus der Gruppe, die Primärtumoren, Sekundärtumoren, Tertiärtumoren und metastasierende Tumoren umfassen. Dabei ist bevorzugt, wenn die Tumoren zumindest eines der folgenden Merkmale aufweisen, nämlich dass sie YB-1 im Kern Zellzyklus-unabhängig aufweisen, unabhängig von der Ursache dafür, und/oder, dass sie dereguliertes YB-1 aufweisen.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die Zellen, in denen die erfindungsgemäßen Adenoviren replizieren oder replizierbar sind bzw. die Tumoren, die derartige Zellen umfassen solche sind, die mit einem oder mehreren der hierin beschriebenen Merkmale ausgestaltet, insbesondere dem Merkmal, dass sie YB-1 im Kern Zellzyklus-unabhängig aufweisen, unabhängig von der Ursache dafür, und/oder dem Merkmal, dass sie dereguliertes YB-1 aufweisen, und diese Zellen bzw. Tumoren mit einem erfindungsgemäßen Adenovirus der Gruppe I und/oder Gruppe II behandelt werden können, bzw. die Adenoviren für die Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung derselben verwendet werden können, wobei die Adenoviren eine für YB-1 codierende Nukleinsäure exprimieren. Es existieren somit bevorzugt drei

Kategorien von Zellen und damit auch Tumoren, in denen die erfindungsgemäßen Adenoviren der Gruppe I und II replizieren können bzw. die unter Verwendung dieser Adenoviren behandelt, bevorzugterweise lysiert werden können:

- Gruppe A: Zellen, die Zellzyklus-unabhängig YB-1 im Kern aufweisen;
- Gruppe B: Zellen, die YB-1 nicht im Kern aufweisen, insbesondere nicht Zellzyklus-unabhängig im Zellkern aufweisen, aber dereguliertes YB-1 aufweisen; und
- Gruppe C: Zellen, Zellen, die YB-1 nicht im Kern aufweisen, insbesondere nicht Zellzyklus-unabhängig im Zellkern aufweisen, und kein dereguliertes YB-1 aufweisen.

Für die Zellen der Gruppe A können die erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere die Adenoviren der Gruppe I, zur Replikation oder Lyse verwendet werden, die kein zusätzliches YB-1 exprimieren. Es ist jedoch auch möglich, dass solche erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere die Adenoviren der Gruppe I, zur Replikation oder Lyse verwendet werden, die zusätzliches YB-1 exprimieren. Gleiches gilt für die Gruppe B. Der Grund scheint, ohne im folgenden darauf festgelegt sein zu wollen, darin zu liegen, dass infolge der Wirkung des E1B-Proteins, insbesondere des E1B55K-Proteins, und/oder des E4-Proteins, insbesondere des E4orf6-Proteins, eine wirksame Replikation durch Lokalisation von YB-1 im Kern bzw. Transfer desselben in den Kern gewährleistet wird. Das YB-1, das von den Adenoviren zusätzlich exprimiert wird, unterstützt diesen Prozess.

Im Falle der Gruppe C werden bevorzugterweise die erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere die Adenoviren der Gruppe I, zur Replikation oder Lyse verwendet werden, die zusätzliches YB-1 exprimieren. Der Grund hierfür scheint, ohne wiederum darauf festgelegt sein zu wollen, darin zu bestehen, dass die obigen Prozesse der viralen Replikation vor dem konkreten zellulären Hintergrund nicht in dem Umfang ablaufen, dass eine wirksame Replikation ablaufen könnte. Erst mit der Zurverfügungstellung des von YB-1 codierten bzw. exprimierten YB-1 kommt es zu einer wirksamen Replikation, wobei der zugrundeliegende Mechanismus darin zu bestehen scheint, dass Überexpression von YB-1 zur Kernlokalisation von YB-1 führt, wie auch von Bargou [Bargout R.C. et al., Nature Medicine 1997, 3, 447-450] und Jürchott [Jürchott K. et al., JBC 2003, 278, 27988-27996] beschrieben.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, wenn einige der den Tumor aufbauenden Zellen YB-1 entweder inhärent oder nach Induktion bzw. aktivem Einführen in den Kern dort aufweisen oder aber hinsichtlich YB-1 dereguliert im Sinne der vorliegenden Offenbarung vorliegt. Bevorzugterweise sind etwa 5 % oder ein jeglicher Prozentsatz darüber, d. h. 6 %, 7 %, 8 % etc. der den Tumor aufbauenden Zellen derartige YB-1 Kern-positive Zellen oder Zellen, in denen YB-1 dereguliert vorliegt. Für eine Reihe von Tumoren, wie beispielsweise Brusttumor, Osteosarcom, Ovar, Synovialkarzinom oder Lungenkarzinom kann der Anteil der Zellen des Tumors, die YB-1 dereguliert aufweisen oder eine vom Zellzyklus unabhängige Kernlokalisation von YB-1 aufweisen, etwa 30 bis 50 % betragen [Kohno K. et al., BioEssays 2003, 25, 691-698]. Derartige Tumoren können in besonders bevorzugterweise mit den erfindungsgemäßen Adenoviren behandelt werden. Die Kernlokalisation von YB-1 kann durch Stress von außen bzw. lokal appliziertem Stress induziert werden. Diese Induzierung kann beispielsweise durch Bestrahlung, insbesondere UV-Bestrahlung, Anwendung von Zytostatika, wie sie unter anderem hierin ebenfalls offenbart sind, und Hyperthermie erfolgen. Im Zusammenhang mit Hyperthermie ist beachtlich, dass diese zwischenzeitlich sehr spezifisch, insbesondere örtlich spezifisch, realisiert werden kann und somit ebenfalls spezifisch einen Kerntransport von YB-1 in den Zellkern bedingen kann und infolgedessen die Voraussetzungen für eine Replikation des Adenovirus und damit einer Zell- und Tumolyse, die bevorzugt lokal beschränkt erfolgt, gegeben sind (Stein U, Jurchott K, Walther W, Bergmann S, Schlag PM, Royer HD. J Biol Chem. 2001,276(30):28562-9; Hu Z, Jin S, Scotto KW. J Biol Chem. 2000 Jan 28; 275(4):2979-85; Ohga T, Uchiumi T, Makino Y, Koike K, Wada M, Kuwano M, Kohno K. J Biol Chem. 1998, 273(11):5997-6000).

Das erfindungsgemäße Medikament würde somit auch an solche Patienten und Patientengruppen verabreicht werden bzw. wäre für solche bestimmt, bei denen durch geeignete Vor- oder Nachbehandlungen oder gleichzeitige Behandlung ein Transport von YB-1, insbesondere in die entsprechenden Tumorzellen, bedingt werden würde bzw. eine dereguliertes YB-1 in der Zelle generiert werden würde.

Auf der Grundlage der hierin gegebenen technischen Lehre ist es für den Fachmann im Rahmen seiner Fähigkeiten, geeignete Modifikationen insbesondere von E1A vorzunehmen, die beispielsweise Deletionen oder Punktmutationen umfassen können, um so verschiedene

Ausführungsformen der im Rahmen der erfindungsgemäßen Verwendung einsetzbaren Adenoviren zu erzeugen.

Wie bereits vorstehend ausgeführt, sind die Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II in der Lage, in solchen Zellen bzw. zellulären Systemen zu replizieren, die YB-1 im Kern aufweisen. Für die Frage, inwieweit diese auch erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren zur Replikation und damit zur Tumorlyse in der Lage sind, ist der Status der Zellen hinsichtlich des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Rb, d. h. des Retinoblastom-Tumorsuppressor-Produktes, unabhängig. Weiterhin ist es im Rahmen der erfindungsgemäßen Verwendung der besagten Adenoviren nicht erforderlich, auf den p53-Status der infizierten, zu infizierenden oder zu behandelnden Zellen abzustellen, da bei Verwendung der hierin offenbarten adenoviralen Systeme im Zusammenhang mit YB-1-Kern-positiven Zellen, d.h. Zellen, die unabhängig vom Zellzyklus YB-1 im Kern aufweisen, dieser ebenso wie der Rb-Status auf das Replikationsgeschehen des Adenovirus keinen Einfluss für die Ausführung der hierin offenbarten technischen Lehre hat.

Das transaktivierende Onkogen bzw. Onkogenprotein, insbesondere E1A, bevorzugterweise der Adenoviren der Gruppe II kann dabei entweder unter der Kontrolle der eigenen natürlichen adenoviralen Promotoren stehen und/oder aber über einen Tumor- oder Gewebespezifischen Promotor gesteuert werden. Geeignete nicht-adenovirale Promotoren können ausgewählt sein aus der Gruppe, die Cytomegalovirus-Promotor, RSV-(Rous sarcoma Virus)-Promotor, Adenovirus-basierender Promotor Va I und den nicht-viralen YB-1-Promotor (Makino Y. et al., Nucleic Acids Res. 1996, 15, 1873-1878) umfasst. Weitere Promotoren, die im Zusammenhang mit einem jeden Aspekt der hierin offenbarten Erfindung verwendet werden können, stellen der Telomerase-Promotor, der Alpha-Fetoprotein (AFP)-Promotor, der Caecinoembryonic Antigen Promotor (CEA) (Cao, G., Kuriyama, S., Gao, J., Mitoro, A., Cui, L., Nakatani, T., Zhang, X., Kikukawa, M., Pan, X., Fukui, H., Qi, Z. Int. J. Cancer, 78, 242-247, 1998), der L-Plastin-Promotor (Chung, I., Schwartz, PE., Crystal, RC., Pizzorno, G, Leavitt, J., Deisseroth, AB. Cancer Gene Therapy, 6, 99-106, 1999), Arginin-Vasopressin-Promotor (Coulson, JM, Staley, J., Woll, PJ. British J. Cancer, 80, 1935-1944, 1999), E2f-Promotor (Tsukada et al. Cancer Res., 62, 3428 – 3477, 2002), Uroplakin II Promotor (Zhang et al., Cancer Res., 62, 3743-3750, 2002) und der PSA-Promotor (Hallenbeck PL, Chang, YN, Hay, C, Golightly, D., Stewart, D., Lin, J., Phipps, S., Chiang, YL. Human Gene Therapy, 10,

1721-1733, 1999), Tyrosinase-Promotor (Nettelbeck, DM. *Anti-Cancer-Drugs*, 14, 577-584, 2003), Cyclooxygenase-2 Promotor (Nettelbeck, DM., Rivera, AA, Davydova, J., Dieckmann, D., Yamamoto, M., Curiel, DT. *Melanoma Res.*, 13, 287-292, 2003) und induzierende Systeme wie beispielssweise Tetracyclin (Xu, XL., Mizuguchi, H., Mayumi, T., Hayakawa, T. *Gene*, 309, 145-151, 2003) dar. Ferner stellt der in der deutschen Patentanmeldung DE 101 50 984.7 beschriebenen YB-1 abhängigen E2-late-Promotor von Adenoviren einen Promotor dar, wie er im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann.

Hinsichtlich des Telomerase-Promotors ist bekannt, dass dieser in humanen Zellen von zentraler Bedeutung ist. So wird die Telomeraseaktivität durch die transkriptionelle Kontrolle des Telomerase reverse Transkriptase-Gens (hTERT), welches die katalytische Untereinheit des Enzyms darstellt, reguliert. Die Expression der Telomerase ist in 85% der humanen Tumorzellen aktiv. Im Unterschied dazu ist sie in den meisten normalen Zellen inaktiv. Ausgenommen davon sind Keimzellen und embryonales Gewebe (Braunstein, I. et al., *Cancer Research*, 61, 5529-5536, 2001; Majumdar, A. S. et al., *Gene Therapy* 8, 568-578, 2001). Genaue Untersuchungen am hTERT-Promotor haben gezeigt, dass Fragmente des Promotors von 283 bp bzw. 82 bp vom Initiationscodon entfernt für eine spezifische Expression in Tumorzellen ausreichend sind (Braunstein I. et al.; Majumdar AS et al., aaO). Daher eignet sich dieser Promotor bzw. die spezifischen Fragmente, um eine spezifische Expression eines Gens und insbesondere eines Transgens, bevorzugterweise eines hierin offenbarten Transgens, nur in Tumorzellen zu erzielen. Der Promotor soll die Expression des modifizierten Onkogens, bevorzugt des E1A-Onkogenproteins, nur in Tumorzellen ermöglichen. Auch ist die Expression eines Transgens, insbesondere eines solchen, das ausgewählt ist aus der Gruppe, die E4orf6, E1B55kD, ADP und YB-1 umfasst, in einem adenoviralen Vektor unter einem dieser Promotoren in einer Ausführungsform vorgesehen. Es ist auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass der Leserahmen des transaktivierenden Onkogenproteins, insbesondere des E1A-Proteins im Leserahmen (engl. „in frame“) mit einem oder mehreren der Genprodukte des adenoviralen Systems ist. Der Leserahmen des transaktivierenden E1A-Proteins kann jedoch auch unabhängig davon sein.

Die verschiedenen Transgene, so auch E1B55kD, E4orf6, ADP und dergleichen, insbesondere wenn es sich dabei um virale Gene handelt, können grundsätzlich aus einem jeden entsprechenden Virus, insbesondere Adenovirus, cloniert werden. Im Stand der Technik sind darüber

hinaus eine Vielzahl von Plasmiden beschrieben, die die entsprechenden Gene enthalten, und aus denen diese sodann entnommen und in die erfindungsgemäßen Adenoviren eingefügt werden können. Ein Beispiel für ein Plasmid, das E1B55kD exprimiert, ist beispielsweise beschrieben von Dobbstein, M. et al., EMBO Journal, 16, 4276-4284, 1997. Die codierende Region des E1B55K-Gens kann zusammen mit der 3'-nicht-codierenden Region beispielsweise aus diesem Gen mittels Bam HI aus dem Plasmid pDCRE1B herausgeschnitten werden. Das entsprechende Fragment umfassend das E1B55kD-Gen sowie die 3'-nicht-codierende Region entspricht den Nukleotiden 2019 bis 4107 des Adenovirus Typ 5. Es ist jedoch auch beispielsweise im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass das E1B55kD-Gen mittels der Restriktionsenzyme Bam HI und BfrI aus diesem Plasmid geschnitten wird und anschließend in den Adenovirus eincloniert wird.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass, sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, für den Fall, dass von den erfindungsgemäßen Viren gesprochen wird, dies sowohl die dafür codierende Nukleinsäuren, wie auch die adenoviralen Partikel, bevorzugterweise einschließlich der entsprechenden Nukleinsäure bezeichnet. Die entsprechende Nukleinsäure kann im Übrigen auch in einem anderen Vektor integriert vorliegen.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass die verschiedenen vorstehend beschriebenen Promotoren auch im Zusammenhang mit den verschiedenen Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Adenoviren, bevorzugterweise der Adenoviren der Gruppe I, verwendet werden, insbesondere dann, wenn ein anderer Promotor als derjenige verwendet werden soll, der die Expression des jeweiligen Proteins oder Expressionsproduktes im Wildtyp-Adenovirus steuert. Die vorstehend aufgeführten Promotoren sind somit geeignete heterologe Promotoren im Sinne der vorliegenden Erfindung. In bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere den Adenoviren der Gruppe I, ist vorgesehen, dass bei Anwendung der Adenoviren bei Zellen der Gruppen A und B, wie vorstehend definiert, so erfolgt, dass die Promotoren für die Expression des E1B-Proteins und/oder des E4-Proteins von einem derartigen heterologen Promotor erfolgt, wohingegen bevorzugt, aber nicht ausschließlich, die Expression des E1A-Proteins von YB-1 gesteuert wird. Die Expression des E1A-Proteins steht in diesen und anderen Ausführungsformen bevorzugt unter der Kontrolle eines von YB-1 steuerbaren Promotors wie beispielsweise dem adenoviralen E2-

late-Promotor. Dies gilt auch für den Fall, dass das E1B-Protein und/oder das E4-Protein in einer Expressionskassette exprimiert wird/werden.

In bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere den Adenoviren der Gruppe I, ist vorgesehen, dass bei Anwendung der Adenoviren bei Zellen der Gruppe C jeweils unabhängig voneinander ein Tumor- Organ- oder Gewebe-spezifischer Promotor ist. Dabei ist es ausreichend, wenn zumindest einer der Promotoren, die die Expression des E1B-Proteins, des E4-Proteins und/oder des E1A-Proteins steuern ein derartiger spezifischer Promotor ist. Durch diese Tumor-, Organ- oder Gewebespezifität wird gewährleistet, dass eine Replikation der erfindungsgemäßen Adenoviren nur in den Zellen des jeweiligen Tumors, Organs oder Gewebes erfolgt und darüber hinaus kein weiteres Gewebe durch Replikation der Adenoviren geschädigt, beispielsweise lysiert wird. Bevorzugterweise wird noch ein zweites und bevorzugterweise werden alle drei Proteine von einem derartigen Tumor- Organ- oder Gewebe-spezifischen Promotor gesteuert. Mit derartigen Adenoviren ist es möglich, auch jene Zellen zu lysieren, die keinen Tumor bilden oder zu einem solchen werden könnten, sondern aus anderen Gründen, bevorzugterweise medizinischen Gründen aus einem Organismus, bevorzugterweise einem Säugetierorganismus und bevorzugterweise einem menschlichen Organismus, entfernt oder zerstört werden sollen, beispielsweise weil sie einen unerwünschten Faktor produzieren oder ein im zu großen Maße produzieren.

Hinsichtlich der Eigenschaft der Zellen, zu deren Lyse die hierin beschriebenen erfindungsgemäßen Adenoviren erfindungsgemäß verwendet werden, ist vorgesehen, dass diese in einer Ausführungsform eine Resistenz, bevorzugterweise eine Mehrfach- oder Vielfach-Resistenz zeigen.

Resistenzen, wie sie hierin bezeichnet werden und für die zu behandelnden Tumoren bzw. Patienten charakteristisch sind, sind solche die durch die folgenden Gene vermittelt werden, aber nicht auf diese beschränkt: MDR, MRP, Topoisomerase, BCL2, Glutathion-S-Transferase (GST), Proteinkinase C (PKC). Da die Wirkung von Zytostatika unter anderem auf der Induktion der Apoptose beruht, spielt die Expression von Apoptose-relevanten Genen bei der Ausbildung der Resistenz eine bedeutende Rolle, so dass auch die folgenden Faktoren diesbezüglich relevant sind, nämlich Fas, die BCL2-Familie, HSP 70 und EGFR [Kim et al., Cancer Chemther. Pharmacol. 2002, 50, 343-352].

Dass YB-1 bei resistenten Tumorzellen im Vergleich zu nicht-resistenten Tumorzellen in seiner Expression stark erhöht ist, wird von Levenson et al. [Levenson, V.V. et al., Cancer Res. , 2000, 60, 5027-5030] beschrieben.

Resistenz, wie hierin verwendet, bezeichnet dabei bevorzugterweise eine Resistenz gegen die hierin beschriebenen Zytostatika. Diese Mehrfach-Resistenz geht bevorzugterweise mit der Expression, bevorzugter Weise einer Überexpression, des membranständigen Transportproteins P-Glycoprotein einher, welches als Marker für die Bestimmung entsprechender Zellen und damit auch von diesem aufweisenden Tumoren bzw. entsprechende Patientengruppen herangezogen werden kann. Der Begriff Resistenz, wie er hierin verwendet wird, umfasst dabei sowohl die auch als klassische Resistenz bezeichnete, durch das P-Glycoprotein vermittelte Resistenz, wie auch die auch als atypische Resistenz bezeichnete Resistenz, die durch MRP vermittelte oder andere, nicht-P-Glycoprotein vermittelte Resistenzen umfasst. Ein weiterer Marker, der mit der Expression von YB-1 korreliert, ist die Topoisomerase II alpha. Insoweit kann in einem Screenen-Verfahren, um zu bestimmen, ob ein Patient mit den Adenoviren erfindungsgemäß mit Aussicht auf Erfolg behandelt werden kann, an Stelle von der bzw. in Ergänzung zur Bestimmung von YB-1 im Kern die Expression von Topoisomerase II alpha herangezogen werden. Ein Marker, der grundsätzlich ähnlich wie das P-Glycoprotein verwendet werden kann, ist MRP. Ein weiterer Marker, zumindest in dem Umfang, als dass colorectrale Karzinomzellen oder Patienten mit einem Colorectalcarcinom betroffen sind, ist PCNA (engl. proliferating cell nuclear antigen (Hasan S. et al., Nature, 15, 387-391, 2001.)), wie beispielsweise beschrieben von Shibao K. et al. (Shibao K et al., Int. Cancer, 83, 732-737, 1999). Schließlich ist, zumindest für den Bereich der Brustkrebs- und Osteosarcoma-Zellen die Expression von MDR (engl. multiple drug resistance) ein Marker im vorstehend beschriebenen Sinne (Oda Y et al., Clin. Cancer Res., 4, 2273-2277, 1998). Ein weiterer möglicher Marker, der erfindungsgemäß verwendet werden kann, ist p73 (Kamiya, M., Nakazatp, Y., J Neurooncology 59, 143-149 (2002); Stiewe et al., J. Biol. Chem., 278, 14230-14236, 2003).

Schließlich sei noch auf YB-1 selbst als prognostischen Marker bei Brustkrebs hingewiesen, der im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann. Nur bei Patientinnen mit erhöhter Expression von YB-1 im Primärtumor tritt ein Rezidiv nach Operation und Chemotherapie auf [Janz M. et al. Int. J. Cancer 2002, 97, 278-282].

Es ist somit ein besonderer Vorteil der vorliegenden Erfindung, dass auch jene Patienten unter Anwendung der erfindungsgemäßen Verwendung der Adenoviren, wie hierin beschrieben, therapiert werden können, die ansonsten im medizinisch-klinischen Sinne als „austherapiert“ gelten und somit eine weitgehende Behandlung der Tumorerkrankung nach den Methoden des Standes der Technik mit Aussicht auf Erfolg nicht mehr möglich ist, insbesondere die Verwendung von Zytostatika oder Bestrahlung sinnvoller Weise nicht mehr möglich ist bzw. nicht mehr erfolgreich durchgeführt werden kann im Sinne einer Beeinflussung bzw. Verringerung des Tumors. Der Begriff des Tumors bezeichnet hierin allgemein auch eine jegliche Tumor- oder Krebserkrankung, die entweder inhärent YB-1 im Zellkern enthält oder aber durch Realisieren exogener Maßnahmen, wie hierin offenbart, YB-1 im Zellkern, bevorzugterweise unabhängig vom Zellzyklus, und/oder dereguliertes YB-1 aufweist.

Weiterhin können die hierin beschriebenen Viren zur Behandlung grundsätzlich von Tumoren verwendet werden.

Die Tumoren, die durch die hierin beschriebenen Viren insbesondere behandelt werden können, sind bevorzugterweise jene Tumoren, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die Tumore des Nervensystems, okulare Tumoren, Tumore der Haut, Tumore der Weichteile, gastrointestinale Tumore, Tumore des respiratorischen Systems, Tumore des Skeletts, Tumore des endokrinen Systems, Tumore des weiblichen Geschlechtssystems, Tumore der Mammdrüse, Tumore des männlichen Geschlechtssystems, Tumore des harnableitenden Systems, Tumore des haematopoetischen Systems sowie vermischte und embryonale Tumore umfasst. Dabei ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass es sich bei diesen Tumoren insbesondere um resistente Tumoren handelt, wie insbesondere hierin definiert.

Die Gruppe der Tumore des Nervensystems umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Schädelhöhle sowie des Gehirns (Intracranium), bevorzugterweise Astrozytom, Oligodendrogliom, Menigiom, Neuroblastom, Ganglioneurom, Ependymom, Schwannom, Neurofibrom, Hemangioblastom, Lipom, Craniopharyngiom, Teratom und Chordom;

2. Tumore des Rückenmarkes und des Wirbelkanals, bevorzugterweise Glioblastom, Meningiom, Neuroblastom, Neurofibrom, Osteosarkom, Chondrosarkom, Hemangiosarkom, Fibrosarkom und Multiple Myelome; und

3. Tumore der peripheren Nerven, bevorzugterweise Schwannom, Neurofibrom, Neurofibrosarkom und Perineurale Fibroblastome.

Die Gruppe der okularen Tumore umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Augenlider und der Liddrüsen, bevorzugterweise Adenom, Adenokarzinom, Papillom, Histiozytom, Mastzelltumor, Basalzelltumor, Melanom, Plattenepithelkarzinom, Fibrom und Fibrosarkom;

2. Tumore der Konjunktiven und der Nickhaut, bevorzugterweise Plattenepithelkarzinom, Hemangiom, Hemangiosarkom, Adenom, Adenokarzinom, Fibrosarkom, Melanom und Papillom; und

3. Tumore der Orbita, des Nervus opticus und des Augapfels, bevorzugterweise Retinoblastom, Osteosarkom, Mastzelltumor, Meningiom, Retikulozelltumor, Gliom, Schwannom, Chondrom, Adenokarzinom, Plattenepithelkarzinom, Plasmazelltumor, Lymphom, Rhabdomyosarkom und Melanom.

Die Gruppe der Tumore der Haut umfasst dabei bevorzugterweise:

Tumore des Histiocytom, Lipom, Fibrosarkom, Fibrom, Mastzell Tumor, Malignes Melanom, Papillom, Basalzelltumor, Keratoakanthom, Hemangioperizytom, Tumore der Haarfollikel, Tumore der Schweißdrüsen, Tumore der Talgdrüsen, Haemangiom, Haemangiosarkom, Lipom, Liposarkom, Malignes fibröses Histiocytom, Plasmazytom und Lymphangiom.

Die Gruppe der Tumore der Weichteile umfasst dabei bevorzugterweise:

Tumore des alveoläres Weichteilsarkom, epitheloidzelliges Sarkom, Chondrosarkom der Weichteile, Osteosarkom der Weichteile, Ewing-Sarkom der Weichteile, primitive neuroektodermale Tumore (PNET), Fibrosarkom, Fibrom, Leiomyosarkom, Leiomyom, Liposarkom, malignes fibröses Histiozytom, malignes Hemangioperizytom, Hemangiom, Hemangiosarkom, malignes Mesenchymom, maligner peripherer Nervenscheidentumor (MPNST, malignes Schannom), malignes melanozytisches Schwannom, Rhabdomyosarkom, Synovialsarkom, Lymphangiom und Lymphangiosarkom.

Die Gruppe des Gastrointestinale Tumors umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Mundhöhle und Zunge, bevorzugterweise Plattenepithelkarzinom, Fibrosarkom, Merkelzelltumor, Induktives Fibroameloblastom, Fibrom, Fibrosarkom, Virale Papillomatose, Idiopathische Papillomatose, Nasopharyngeale Polypen, Leiomyosarkom, Myoblastom und Mastzelltumor;
2. Tumore der Speicheldrüsen, bevorzugterweise Adenokarzinom;
3. Tumore des Oesophagus, bevorzugterweise Plattenepithelkarzinom, Leiomyosarkom, Fibrosarkom, Osteosarkom, Barrettkarzinom und paraoesophageale Tumore;
4. Tumore der exocrines Pankreas, bevorzugterweise Adenokarzinom; und
5. Tumore des Magens, bevorzugterweise Adenokarzinom, Leiomyom, Leiomyosarkom und Fibrosarkom.

Die Gruppe der Tumore des respiratorischen Systems umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Nase und Nasenhöhle, des Kehlkopfes und der Trachea, bevorzugterweise Plattenepithelkarzinom, Fibrosarkom, Fibrom, Lymphosarkom, Lymphom, Hemangiom, Hemangiosarkom, Melanom, Mastzelltumor, Osteosarkom, Chondrosarkom, Onkozytom (Rhabdomyom), Adenokarzinome und Myoblastom; und

2. Tumore der Lunge, bevorzugterweise Plattenepithelkarzinom, Fibrosarkom, Fibrom, Lymphosarkom, Lymphom, Hemangiom, Hemangiosarkom, Melanom, Mastzelltumor, Osteosarkom, Chondrosarkom, Onkozytom (Rhabdomyom), Adenokarzinome, Myoblastom, kleinzelliges Karzinom, nicht-kleinzelliges Karzinom, bronchiales Adenokarzinom, bronchoalveoläres Adenokarzinom und alveoläres Adenokarzinom.

Die Gruppe der Tumore des Skeletts umfasst dabei bevorzugterweise:

Osteosarkom, Chondrosarkom, Parosteales Osteosarkom, Hemangiosarkom, Synovialzellsarkom, Hemangiosarkom, Fibrosarkom, Malignes Mesenchymom, Riesenzelltumor, Osteom und multilobulares Osteom.

Die Gruppe der Tumore des endokrinen Systems umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Schilddrüse/Nebenschilddrüse, bevorzugterweise Adenome und Adenokarzinome;

2. Tumore der Nebenniere, bevorzugterweise Adenom, Adenokarzinom und Pheochromozytom (Nebennierenmarktumor);

3. Tumore der Hypothalamus/Hypophyse, bevorzugterweise Adenom und Adenokarzinom;

4. Tumore des endokrinen Pankreas, bevorzugterweise Insulinom (Betazelltumor, APUDom) und Zollinger-Ellison Syndrom (Gastrin sezernierender Tumor der Deltazellen des Pankreas); und

5. sowie multiple endokrine Neoplasien (MEN) und Chemodectom.

Die Gruppe der Tumore des weiblichen Geschlechtssystems umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Ovarien, bevorzugterweise Adenom, Adenokarzinom, Zystadenom, und undifferenzierte Karzinome;

2. Tumore der Uterus, bevorzugterweise Leiomyom, Leiomyosarkom, Adenom, Adenokarzinom, Fibrom, Fibrosarkom und Lipom;

3. Tumore der Zervix, bevorzugterweise Adenokarzinom, Adenom, Leiomyosarkom und Leiomyom;

4. Tumore der Vagina und Vulva, bevorzugterweise Leiomyom, Leiomyosarkom, Fibroleiomyom, Fibrom, Fibrosarkom, Polypen und Plattenepithelkarzinom.

Die Gruppe der Tumore der Mammarydrüse umfasst dabei bevorzugterweise:

Fibroadenom, Adenom, Adenokarzinom, mesenchymale Tumore, Karzinome, Karzinom-sarkome.

Die Gruppe der Tumore des männlichen Geschlechtssystems umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Hoden, bevorzugterweise Seminom, Interstitialzelltumor und Sertolizelltumor;

2. Tumore der Prostata, bevorzugterweise Adenokarzinome, undifferenzierte Karzinome, Plattenepithelkarzinome, Leiomyosarkome und Transitionalzellkarzinom; und

3. Tumore des Penis und der externen Genitalien, bevorzugterweise Mastzelltumor und Plattenepithelkarzinom.

Die Gruppe der Tumore des harnableitenden Systems umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Tumore der Niere, bevorzugterweise Adenokarzinom, Transitionalzellkarzinom (epitheliale Tumore), Fibrosarkom, Chondrosarkom (mesenchymale Tumore), Wilm's Tumor, Nephroblastom und embryonales Nephrom (embryonal pluripotente Blastome);

2. Tumore der Urether, bevorzugterweise Leiomyom, Leiomyosarkom, Fibropapillom, Transitionalzellkarzinom;

3. Tumore der Harnblase, bevorzugterweise Transitionalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom, Adenokarzinom, Botryoid (Embryonales Rhabdomyosarkom), Fibrom, Fibrosarkom, Leiomyom, Leiomyosarkom, Papillom und Hemangiosarkom; und

4. Tumore der Urethra, bevorzugterweise Transitionalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom und Leiomyosarkom.

Die Gruppe der Tumore des hämatopoetischen Systems umfasst dabei bevorzugterweise:

1. Lymphome, Lymphatische Leukämie, Nichtlymphatische Leukämie, Myeloproliferative Leukämie, Hodgkin's Lymphom, Non-Hodgkin's Lymphom.

Die Gruppe der vermischten und embryonalen Tumore umfasst dabei bevorzugterweise:

Hemangiosarkome, Thymom und Mesotheliom.

Ganz besonders bevorzugterweise sind diese Tumoren ausgewählt aus der Gruppe, die Brustkrebs, Ovarialkarzinom, Prostatakarzinom, Osteosarkom, Glioblastom, Melanom, kleinzelliges Lungenkarzinom und Kolorektalkarzinom umfasst. Weitere Tumoren sind jene, die resistent, wie hierin beschrieben, sind, bevorzugt Gene, die mehrfach resistent sind, insbesondere auch solche Tumoren der vorstehend beschriebenen Gruppe. Besonders bevorzugte Tumoren sind dabei auch jene, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die Brusttumore, Knochentumore, Magentumore, Darmtumore, Gallenblasentumore, Bauspeicheldrüsentumore, Lebertumore, Nierentumore, Gehirntumore, Eierstocktumore, Haut- und Hautanhangsorgantumore, Kopf-/Nackentumore, Gebärmuttertumore, Synovialtumore, Kehlkopftumore, Speiseröhrentumore, Zungentumore und Prostatatumore umfasst. Dabei ist bevorzugt, dass diese Tumoren hinsichtlich ihrer Ausprägung solche sind, wie sie hierin insgesamt offenbart sind.

Die erfindungsgemäßen Adenoviren, insbesondere der Adenoviren der Gruppe I, und die erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren, insbesondere die Adenoviren der Gruppe II

Die Verwendung der hierin offenbarten Adenoviren, insbesondere der Gruppe I und/oder Gruppe II, als Medikamente und besondere bei systemischer Anwendung kann durch ein geeignetes Targeting der Adenoviren verbessert werden. Die Infektion von Tumorzellen durch Adenoviren hängt bis zu einem bestimmten Umfang unter anderem vom Vorhandensein des Coxackievirus-Adenovirus Rezeptor CAR und bestimmten Integrinen ab. Sobald diese stark in Zellen, insbesondere Tumorzellen exprimiert werden, ist eine Infektion bereits bei sehr geringen Titern (pfu/Zelle) möglich. Verschiedene Strategien sind bisher durchgeführt worden, um ein sogenanntes Re-targeting der rekombinanten Adenoviren zu erzielen, z. B. durch Insertion von heterologen Sequenzen in der fiber knob region, Verwendung von bi-spezifischen Antikörpern, beschichten der Adenoviren mit Polymeren, Einfügen von Liganden im Ad fiber, die Substitution des Serotyps 5 knob bzw. 5 fiberb shaft und knob mit dem Serotyp 3 knob bzw. Ad 35 fiber shaft and knob und Modifikationen des penton base (Nicklin S. A. et al., Molecular Therapy 2001, 4, 534-542; Magnusson, M. K. et. al., J. of Virology 2001, 75, 7280-7289; Barnett B. G. et al., Biochimica et Biophysica Acta 2002, 1575, 1-14). Die Realisierung derartiger weiterer Ausgestaltungen bzw. Merkmale bei den erfindungsgemäßen Adenoviren und den erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren, insbesondere bei den Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II, in ihren verschiedenen Aspekten der vorliegenden Erfindung, ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung.

Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt auch ein Verfahren zum Screenen von Patienten, die mit einem modifizierten Adenovirus, d.h. einem Adenovirus, wie er erfindungsgemäß verwendet wird, wie beispielsweise AdΔ24, dl922-947, E1Ad/01/07, CB016 oder die im europäischen Patent EP 0931 830 beschriebenen Viren, und/oder einem Adenovirus der Gruppe I und/oder der Gruppe II behandelbar sind, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Untersuchen einer Probe des Tumorgewebes und
- Festellen, ob YB-1 im Kern Zellzyklus-unabhängig lokalisiert ist oder die Zellen dereguliertes YB-1 aufweisen.

Anstelle von oder in Ergänzung zu YB-1 kann auch das Vorhandensein der vorstehend beschriebenen Marker festgestellt werden.

In dem Falle, dass das Tumorgewebe oder ein Teil davon YB-1 im Zellkern, insbesondere Zellzyklus-unabhängig, lokalisiert aufweist oder dereguliertes YB-1 aufweist, können die hierin offenbarten Adenoviren, insbesondere die Adenoviren der Gruppe I und/oder der Gruppe II erfindungsgemäß verwendet werden.

In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass die Untersuchung des Tumorgewebes unter Verwendung eines Mittels erfolgt, das ausgewählt ist aus der Gruppe, die Antikörper gegen YB-1, Aptamere gegen YB-1, Spiegelmere gegen YB-1 sowie Anticaline gegen YB-1 umfasst. Grundsätzlich die gleichen Mittel können für die entsprechenden Marker hergestellt bzw. verwendet werden. Die Herstellung von Antikörpern, insbesondere monoklonalen Antikörpern, ist den Fachleuten auf dem Gebiet bekannt. Ein weiteres Mittel zum spezifischen Nachweis von YB-1 oder den Markern stellen Peptide dar, die mit hoher Affinität an ihre Zielstrukturen, im vorliegenden Falle YB-1 oder die besagten Marker, binden. Im Stand der Technik sind Verfahren bekannt, wie beispielsweise phage-display, um derartige Peptide zu erzeugen. Dabei wird typischerweise von einer Peptid-Bibliothek ausgegangen, wobei die einzelnen Peptide eine Länge von etwa 8 bis 20 Aminosäuren aufweisen und die Größe der Bibliothek etwa 10^2 bis 10^{18} , bevorzugterweise 10^8 bis 10^{15} verschiedene Peptide beträgt. Eine spezielle Form von an Zielmolekülen bindenden Peptiden stellen die sogenannten Anticaline dar, wie sie beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung DE 197 42 706 beschrieben sind.

Ein weiteres Mittel zum spezifischen Binden an YB-1 oder die entsprechenden, hierin offenbarten Marker und damit zum Nachweis einer Zellzyklus-unabhängigen Lokalisation von YB-1 im Zellkern sind die sogenannten Aptamere, d. h. D-Nukleinsäure, die auf RNA- oder DNA-Basis entweder als Einzelstrang oder als Doppelstrang vorliegen und spezifisch an ein Zielmolekül binden. Die Herstellung von Aptameren ist beispielsweise beschrieben im europäischen Patent EP 0 533 838. Eine Sonderform der Aptamere stellen die sogenannten Aptazyme dar, die beispielsweise beschrieben sind von Piganeau, N. et al. (2000), Angew. Chem. Int. Ed., 39, Nr. 29, Seiten 4369 – 4373. Dabei handelt es sich um eine spezielle Ausführungsform von Aptameren insoweit, als dass sie neben dem Aptameranteil noch einen Ribozym-

teil aufweisen und nach Bindung oder Freisetzung des an den Aptamerteil bindenden Zielmoleküls der Ribozymanteil katalytisch aktiv wird und ein Nukleinsäuresubstrat spaltet, was mit der Erzeugung eines Signals einhergeht.

Eine weitere Form der Aptamere stellen sogenannte Spiegelmere dar, d. h. zielmolekülbindende Nukleinsäuren, die aus L-Nukleinsäuren hergestellt sind. Das Verfahren zur Herstellung dieser Spiegelmere ist beispielsweise beschrieben in WO 98/08856.

Die Probe des Tumorgewebes kann dabei durch Punktion oder durch einen chirurgischen Eingriff erhalten werden. Die Feststellung, ob im Kern YB-1 Zellzyklus-unabhängig lokalisiert ist, erfolgt dabei häufig unter Verwendung mikroskopischer Techniken und/oder mittels Immunhistoanalyse, typischerweise unter Verwendung von Antikörpern oder einem der weiteren vorstehenden Mitteln. Weitere Verfahren zum Nachweis, dass YB-1 im Kern und insbesondere dort Zellzyklus-unabhängig lokalisiert ist, sind dem Fachmann bekannt. Beispielsweise kann bei dem Durchmustern von gegen YB-1 gefärbten Gewebeschnitten die Lokalisation von YB-1 leicht erkannt werden. Dabei ergibt sich bereits infolge der Häufigkeit des Auftretens von YB-1 im Kern, dass es sich um eine Zellzyklus-unabhängige Lokalisation im Kern handelt. Eine weitere Möglichkeit zum Zellzyklus-unabhängigen Nachweis von YB-1 im Kern besteht in der Durchführung einer Färbung gegen YB-1 und Feststellen, ob YB-1 im Kern lokalisiert ist, und Durchführung der Bestimmung des Zellstadiums der Zellen. Dies bzw. die Detektion von YB-1 kann aber auch unter Verwendung der vorstehend genannten, gegen YB-1 gerichteten Mittel erfolgen. Der Nachweis der Mittel erfolgt dabei durch Verfahrenswesen, die den Fachleuten auf dem Gebiet bekannt sind. Dadurch, dass die besagten Mittel spezifisch gegen YB-1 gerichtet sind und insoweit nicht an andere Strukturen innerhalb der zu untersuchenden Probe, insbesondere der Zellen, binden, kann durch eine geeignete Markierung der Mittel deren Lokalisierung und infolge der spezifischen Bindung an YB-1 auch die Lokalisierung von YB-1 entsprechend nachgewiesen und festgestellt werden. Verfahren zum Markieren der Mittel sind den Fachleuten auf dem Gebiet bekannt. Die gleichen Techniken können auch verwendet werden, um zu bestimmen, ob und wenn ja, wieviele der Zellen der Probe dereguliertes YB-1 enthalten. Da dereguliertes YB-1 gegenüber nicht-deregulierten YB-1 auch eine Überexpression zeigt kann die relative Expression von YB-1 gegenüber einer Referenzprobe verwendet werden, um zu bestimmen, ob YB-1 in der untersuchten Zelle dereguliert vorliegt.

Die vorliegende Erfindung soll im folgenden anhand der Figuren und Beispiele weiter veranschaulicht werden, wobei sich daraus neue Merkmale, Ausführungsformen und Vorteile der Erfindung ergeben. Dabei zeigt

Die vorliegende Erfindung soll im folgenden anhand der Figuren und Beispiele weiter veranschaulicht werden, wobei sich daraus neue Merkmale, Ausführungsformen und Vorteile der Erfindung ergeben. Dabei zeigt

Fig. 1 den strukturellen Aufbau der darin als AdE1/E3-minus Adenovirus bezeichneten adenoviralen Vektoren, die E1/E3-deletierte Adenoviren sind, Wildtyp-Adenovirus und Adenovirus dl520;

Fig. 2 die Bindungsdomänen des E1A-Proteins hinsichtlich der Bindung von p300, p107 und p105;

Fig. 3 U2OS-Zellen, welche nicht YB-1 im Kern aufweisen, nach Infektion mit dem darin als E1/E3-minus Ad5 bezeichneten E1/E3-deletierten Adenoviren Ad5 und dl520;

Fig. 4 257RDB-Zellen, welche YB-1 im Kern aufweisen, nach Infektion mit dem darin als E1/E3-minus Ad5 bezeichneten E1/E3-deletierten Adenoviren Ad5 und Adenovirus dl520;

Fig. 5 257RDB-Zellen und U2OS-Zellen, nach Infektion mit dem Adenovirus dl1119/1131;

Fig. 6 das Ergebnis einer EMSA-Analyse, womit belegt wird, dass YB-1 in den vielfachresistenten Zellen bzw. Zelllinien 257RDB, 181 RDB, MCF-7Ad- im Zellkern vorhanden ist, wohingegen YB-1 in U2OS und HeLa-Zellen nicht im Kern vorhanden ist;

Fig. 7 den strukturellen Aufbau des E1A-Proteins vom Wildtyp-Adenovirus, von Adenovirus dl520 und Adenovirus dl1119/1131;

Fig. 8 ein Balkendiagramm, welches die Replikationseffizienz von Adenoviren bei Anwesenheit zusätzlich exprimierter viraler Proteine in Absolutzahlen zeigt; und

Fig. 9 ein Balkendiagramm, welches die Steigerung der Replikationseffizienz von Adenoviren bei Anwesenheit zusätzlich exprimierter viraler Proteine zeigt;

Fig. 10 mit U2OS-Zellen bewachsene Näpfen nach Kristallviolett-Färbung und Infektion mit dl520 mit 10 bzw. 30 pfu/Zelle bzw. Kontrolle (K) ohne Gabe von Daunorubicin bzw. mit Gabe von 40 ng Daunorubicin pro ml;

Fig. 11 mit HeLa-Zellen bewachsene Näpfen nach Kristallviolett-Färbung und Infektion mit dl520 mit 10 bzw. 30 pfu/Zelle bzw. Kontrolle (K) ohne Gabe von Daunorubicin bzw. mit Gabe von 40 ng pro ml Daunorubicin;

Fig. 12 ein Diagramm des Tumorzellvolumens über die Zeit von Tumoren verschiedenen Ursprungs (RDB257 und HeLa) nach Behandlung mit PBS bzw. dl520;

Fig. 13 Aufnahmen von euthanasierten Mäusen, die einen Tumor auf der Grundlage von RDB257-Zellen entwickelten, nach Behandlung mit PBS bzw. mit 5×10^8 pfu dl520;

Fig. 14 das Ergebnis einer Southern Blot-Analyse eines Zellextraktes (von den subcutan gewachsenen Tumoren) von RDB257-Zellen und HeLa-Zellen nach Infektion mit dl520;

Fig. 15 ein Balkendiagramm, welches die Replikationseffizienz bzw. die Partikelbildung von dl520 und Wildtyp-Adenovirus in YB-1 Kern-positiven Tumorzellen (257RDB und 181RDB) und YB-1 Kern-negativen Tumorzellen (HeLa, U2OS) zeigt;

- Fig. 16 den strukturellen Aufbau des Adenovirus vom Wildtyp und des adenoviralen Vektors AdXvir03;
- Fig. 17 den strukturellen Aufbau des adenoviralen Vektors AdXVir03/01; und
- Fig. 18A/B mit 181RDB-Zellen (Fig. 18A) und 272RDB-Zellen (Fig. 18B) bewachsene Npfe nach Kristallviolett-Frbung und Infektion mit Ad312 (20 pfu/Zelle), Xvir03 (5 pfu/Zelle) und Kontrolle (nicht infiziert), wobei die Kristallviolett-frbung fnf Tage nach Infektion erfolgte.
- Fig. 19 das Ergebnis einer Northern Blot-Analyse der Expression des E2-Gens in A549-Zellen und U2OS-Zellen nach Infektion mit Adenovirus vom Wildtyp Ad5 und Adenovirus Ad312;
- Fig. 20 das Ergebnis einer Northern Blot-Analyse der Expression des E2-Gens in U2OS-Zellen nach Infektion mit Adenovirus vom Wildtyp und Adenovirus delta24 nach 12 und 24 Stunden;
- Fig. 21 den strukturellen Aufbau des adenoviralen Vektors XvirPSJL1;
- Fig. 22 den strukturellen Aufbau des adenoviralen Vektors XvirPSJL2;
- Fig. 23 mit HeLa-Zellen bewachsene Npfe nach Kristallviolett-Frbung und Infektion mit Adenovirus dl520 mit unterschiedlichen pfu/Zellen;
- Fig. 24 ein Balkendiagramm, welches die Aktivitt von Luciferase in U2OS-Zellen, HeLa-Zellen und 257RDB-Zellen bei Verwendung verschiedener Promotorfragmenten des adenoviralen E2-late-Promotors zeigt;
- Fig. 25 ein Balkendiagramm, welches die Anzahl der viralen Partikeln zeigt nach Infektion von U2OS-Zellen mit einem YB-1 exprimierenden Adenovirus und dem Virus Ad312 zeigt, nach zwei und fnf Tagen, wobei zwischen intrazellu-

lär verbliebenen viralen Partikeln (schwarz dargestellt) und freigesetzten, extrazellulären viralen Partikeln (quergestreift dargestellt) unterschieden wird;

Fig. 26 das Ergebnis einer Southern Blot-Analyse des Replikationsverhaltens von Adenovirus dl 520 in U373 Zellen mit und ohne Behandlung der Zellen mit Irinotecan;

Fig. 27 das Ergebnis einer Southern Blot-Analyse des Replikationsverhaltens von Adenovirus dl 520 in U373 Zellen mit und ohne Behandlung der Zellen mit Trichostatin A;

Fig. 28 das Ergebnis einer FACS-Analyse von mit Trichostatin behandelten U 373 Zellen betreffend die Expression des Coxsackievirus-Adenovirus-Rezeptors (CAR), ausgedrückt als prozentualer Anteil der CAR-positiven Zellen; und

Fig. 29 vier verschiedene Panele von Zellrasen zur Darstellung der Wirkung von replizierendem Adenovirus dl520 und Irinotecan und Trichostatin in verschiedenen Kombinationen.

Beispiel 1: Strukturen von E1A-Modifikationen, wie sie von den erfindungsgemäß verwendeten Adenoviren aufgewiesen werden können

Fig. 1 zeigt den strukturellen Aufbau der adenoviralen Vektoren AdE1/E3-minus, d.h. des E1/E3-deletierten Adenovirus, Wildtyp-Adenovirus und Adenovirus dl520.

Das Adenovirus AdE1/E3-minus weist keine funktionalen für E1A und keine für E1B und keine für E3 codierenden Bereiche auf und dient im Rahmen der durchgeführten Experimente als Toxizitätskontrolle

Das Wildtyp-E1A-Gen kodiert für insgesamt 5 Proteine, die durch alternatives splicing der RNA von E1A hervorgehen. Dabei werden unter anderem zwei unterschiedliche Proteine, nämlich ein 289 Aminosäuren großes Protein und ein 243 Aminosäuren großes Protein herge-

stellt. D1520 kodiert nicht für das 289 Aminosäure große Protein, da es eine Deletion im CR3-Bereich des E1A-Gens aufweist, das zu einem Fehlen des 13S-Genproduktes führt. Der erfindungsgemäß verwendbare Adenovirus dl520 wird unter Fachleuten als 12S-E1A Virus bezeichnet. Der im Stand der Technik bekannte Adenovirus dl347 (Wong und Ziff, J. Virol., 68, 4910-4920, 1994) ist ebenfalls ein 12S-E1A Virus, der erfindungsgemäß verwendet werden kann.

Innerhalb des 289 Aminosäuren großen Proteins, welches von 13S-E1A mRNA kodiert wird, gibt es 3 Bereiche, die bei den unterschiedlichen adenoviralen Subtypen konserviert vorliegen. Diese werden als CR1, CR2 und CR3 bezeichnet. Während CR1 und CR2 bei beiden E1A-Proteinen (E1A 12S und E1A 13S) vorkommt, d. h. sowohl bei dem 289 Aminosäure langen wie auch bei dem 243 Aminosäure langen Protein, ist der CR3-Bereich nur bei dem größeren der beiden vorstehend genannten Proteine zu finden.

Der CR3-Bereich wird für die Aktivierung der viralen Gene, insbesondere von E1B, E2, E3 und E4 benötigt. Viren, die nur das kleinere, 243 Aminosäuren lange Protein aufweisen, transaktivieren nur sehr schwach die viralen Gene und führen keine adenovirale Replikation in solchen Zellen durch, die YB-1 nicht im Kern aufweisen. Da YB-1 nur in Tumorzellen im Kern vorliegt bzw. nachweisbar ist, eignet sich dieser Vektor, um eine tumorspezifische Replikation zu induzieren.

Durch die Deletion von CR3 in dl520 ist dieser Adenovirus nicht in der Lage, zelluläres YB-1 in den Zellkern zu translokalisieren, hierin auch als Translozieren bezeichnet, und somit auch nicht in der Lage, in YB-1-Kern-negativen Zellen zu replizieren und stellt damit einen der erfindungsgemäß zu verwendenden Viren dar, wobei dieser Virus die erfindungsgemäß erforderliche Transaktivierung aufweist.

Beispiel 2: Wirkmechanismus von Adenoviren in Abhängigkeit des Rb-Status von Zellen

In Fig. 2 sind die Bindungsdomänen des E1A-Proteins hinsichtlich der Bindung von p300, p107 und p105 dargestellt. P300 ist dabei ebenso wie p107 ein zelluläres Bindungsprotein.

Die Bindung des Retinoblastoma-Proteins (pRb), ein Tumorsuppressor-Protein, erfolgt über CR1 und CR2. Studien haben gezeigt, dass pRb und p107/p300 in Verbindung mit dem zellulären Transkriptionsfaktor E2F eine transkriptionelle Regulation ausüben. Das Wildtyp E1A-Protein unterbricht die Bindung von E2F an Rb. Das solchermaßen freigesetzte E2F bindet an den E2 early Promotor und induziert dadurch die adenovirale Replikation.

Es ist im Stand der Technik bekannt, dass bestimmte Deletionen im E1A-Onkoprotein dazu führen, dass rekombinante adenovirale Vektoren wie die nachstehend genannten vornehmlich in Rb-negativen Zellen zur Replikation befähigt ist und erfindungsgemäß verwendet werden können. Zum Beispiel weist der adenovirale Vektor dl922-947 eine Deletion in der CR2-Region auf (Aminoäurepositionen 122-129) und der Vektor CB016 Deletionen in den Bereichen CR1 (Aminoäurepositionen 27-80) und CR2 (Aminoäurepositionen 122-129). Der Vektor E1Ad/01/07 weist eine Deletion im CR2-Bereich auf (Aminoäurepositionen 111-123). Durch eine zusätzliche Deletion am N-Terminus (Aminoäurepositionen 4-25), erfolgt zudem keine Bindung an das Protein p300. Der adenovirale Vektor AdΔ24 weist eine Deletion in der CR2-Region auf (Aminoäurepositionen 120-127). Der im Patent EP 0 931 830 beschriebene adenovirale Vektor weist Deletionen in dem CR1 und CR2-Bereich auf.

Der Bindungsmechanismus von E2F/RB und die durch E1A vermittelte Freisetzung von E2F ist grundlegend verschieden von dem der vorliegenden Erfindung zugrunde liegenden Mechanismus. Nicht die Freisetzung von E2F vom Rb-Protein ist, wie im Stand der Technik angenommen, ein wichtiger, um nicht zu sagen der entscheidende Vorgang der adenoviralen Replikation, sondern die Kernlokalisation des humanen Transkriptionsfaktors YB-1. Dieser Transkriptionsfaktor kommt in normalen Zellen über den größten Teil des Zellzyklus lediglich im Zytoplasma vor. Nach Infektion mit einem Adenovirus wird dieser unter bestimmten Bedingungen in den Kern induziert oder liegt bei bestimmten zellulären Systemen wie bestimmten Tumorerkrankungen, wie z.B. aber nicht darauf beschränkt, Brustkrebs, Ovarialkarzinom, Prostatakarzinom, Osteosarkom, Glioblastom, Melanom, kleinzelliges Lungenkarzinom und Kolorektalkarzinom, bereits im Kern vor.

Beispiel 3: Infektion von U2OS-Zellen

Pro Schale wurden 100.000 U2OS-Zellen ausplattiert. Am nächsten Tag wurden die Zellen wie in Fig. 3 dargestellt mit den verschiedene Adenoviren infiziert. Die Infektion erfolgte in 500 µL serumfreie DMEM-Medium für 1 h bei 37° C. Anschließend wurde das Infektionsmedium entfernt und durch 2 ml Vollmedium (10 % FKS/DMEM) ersetzt. Nach 3 Tagen erfolgte die Auswertung mit Hilfe einer Kristallviolettfröbung.

Wie aus Fig. 3 ersichtlich zeigen die U2OS Zellen, welche YB-1 nicht im Kern aufweisen, nach Infektion mit zwei verschiedenen Adenoviren, nämlich dem als E1/E3-minus bezeichneten E1/E3-deletierten Adenovirus und Adenovirus dl520, der erfindungsgemäß verwendet werden kann, keine Lyse, wie durch Kristallviolettfröbung der Zellen dargestellt. Dabei wird zunächst das Medium entfernt. Anschließend werden die Zellen mit Kristallviolett überschichtet (50 % ETOH, 3 % Formaldehyd, 5 % Essigsäure, 1 % Kristallviolett) und für 5-10 min bei Raumtemperatur inkubiert. Danach werden die Platten mit 6 Näpfen mit Wasser gründlich gewaschen und bei Raumtemperatur getrocknet.

Dies bestätigt die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis, dass das Vorhandensein von YB-1 erforderlich ist, um die erfindungsgemäß zu verwendenden Viren zu einer Lyse von infizierten Zellen zu veranlassen.

Beispiel 4: Infektion von 257RDB-Zellen

Pro Schale wurden 100.000 257RDB-Zellen ausplattiert. Am nächsten Tag wurden die Zellen wie in Fig. 4 dargestellt mit den verschiedene Adenoviren infiziert. Die Infektion erfolgte in 500 µL serumfreiem DMEM-Medium für 1 h bei 37° C. Anschließend wurde das Infektionsmedium entfernt und durch 2 ml Vollmedium (10 % FKS/DMEM) ersetzt. Nach 3 Tagen erfolgte die Auswertung mit Hilfe einer Kristallviolettfröbung.

Das Ergebnis dieses Versuchs ist in Fig. 4 dargestellt. Das Adenovirus als E1/E3-minus Ad5 bezeichnete E1/E3-deletierte Adenovirus zeigt keine Lyse bei niedrigen MOIs (pfu/Zelle) bei Infektion von 257RDB-Zellen, die YB-1 im Kern aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigt dl520,

welcher wie in Beispiel 3 belegt, in YB-1-Kern-negativen Zellen nicht repliziert und gleichzeitig mit E1A für ein im Sinne der vorliegenden Erfindung transaktivierendes Onkogenprotein codiert, eine praktisch vollständige Lyse bei einer MOI (engl. multiplicity of infection) von 40 pfu pro Zelle und eine noch überwiegende Lyse bei einer MOI von 10 pfu pro Zelle. Daraus ergibt sich, dass dl 520 und vergleichbare Viren, wie hierin beispielsweise mit dl1119/1131 oder AdXvir 03 beschrieben, eine gegenüber einem E1-deletierten oder einem E1/E3-deletierten Adenoviurs um etwa eine Größenordnung (etwa zehnfach) verringerte MOI erforderlich machen, was deren Eignung zur klinischen Anwendung begründet.

Wie in Fig. 7 dargestellt zeichnet sich das E1A-Protein von dl520 dadurch aus, dass der Bereich CR3 davon deletiert ist, was zu der für die erfindungsgemäße Verwendung des Adenovirus erforderlichen Transaktivierung und Replikation in YB-1-Kern-positiven Zellen führt.

Beispiel 5: Infektion von 257RDB und U2OS-Zellen mit dl1119/1131

Wie in Fig. 5 dargestellt kommt es bei Infektion von YB-1-Kern-negativen U2OS-Zellen mit dem Adenovirus dl1119/1131, das eine Deletion der Aminosäuren 4-138 des E1A-Proteins bzw. der dafür codierenden Nukleinsäure und ein Stop-Codon nach Aminosäure 218 aufweist, wodurch das exprimierte verkürzte E1A-Protein die CR3-Region des vollständigen E1A-Proteins enthält, bei einer MOI von 20 pfu pro Zelle zu keiner Lyse. Als Negativkontrolle wurde ein nicht-infizierter Zellrasen herangezogen.

Im Gegensatz dazu zeigt sich unter dem Einfluss von Adenovirus dl1119/1131 in einem zellulären System wie 257RDB, welches YB-1 im Kern aufweist, d. h. YB-1-Kern-positiv ist, bereits bei einer MOI von 20 pfu pro Zelle eine praktisch vollständige Lyse des Zellrasens. Insofern findet sich auch mit diesem Beispiel ein Beleg für die Aussage, dass ein modifiziertes E1A-Onkogenprotein, welches, wie in Fig. 7 dargestellt, beispielsweise lediglich den CR3-Bereich umfasst und dem der Bereich CR1 sowie CR2 fehlt, die für die erfindungsgemäße Verwendung von Adenoviren erforderliche Transaktivierung in YB-1-Kern-positiven Zellen zeigt, mit der Folge einer viralen Replikation. Der Adenovirus dl1119/1131 stellt somit einen weiteren, erfindungsgemäß verwendbaren Adenovirus dar. Dabei ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass auch solche Viren verwendet werden können, die hinsichtlich des

CR3-Bereiches wie dl1119/1131 ausgebildet sind, jedoch im Unterschied dazu den Bereich CR1 und/oder CR2 aufweisen.

Beispiel 6: Nachweis von nuklärem YB-1 bei vielfachresistenten Zellen

Dem Experiment liegt die Überlegung zugrunde, das nukläre YB-1 als Transkriptionsfaktor an die Y-Box (CAAT-Sequenz) innerhalb des *mdr1*-Promoters (engl. multiple drug resistance promoter) binden sollte. Um dies nachzuweisen, wurde eine sogenannte EMSA-Analyse (electrophoretic mobility shift assay) durchgeführt. Dabei wird Kernprotein isoliert und anschließend werden 1-10 µg Protein mit einem kurzen DNA-Fragment (Oligo) zusammen bei 37° C inkubiert. Um nukläres YB-1 zu bestimmen, wurde folgendes Oligonukleotid benutzt: *mdr1* promoter im Unterschied zu U2OS (Position -86 bis -67): TGAGGCTGATTGGCTGGGCA (SEQ. ID. No 1) (die Y-box ist unterstrichen).

Dieses DNA-Fragment wird zuvor mit einer Kinase am 5'-Ende mit ³²P radiativ markiert. Anschließend erfolgt die Auftrennung in einem nativen Polyacrylamidgel. Falls das Protein YB-1 an einer Sequenz am Oligonukleotid bindet, ist dies zu erkennen, da ungebundenes Oligonukleotid im Gel schneller wandert als das gebundene Oligonukleotid (Holm, P. S. et al., JBC 277, 10427-10434, 2002; Bargou, R. C. et al., Nature Medicine 3, 447-450, 1997).

Wie in Fig. 6 dargestellt, konnte im Rahmen einer EMSA-Analyse gezeigt werden, dass YB-1 in den vielfachresistenten Zellen 257RDB, 181RDB und MCF-7Ad-Zellen im Kern im Gegensatz zu den Zelllinien U2OS und HeLa-Zellen vorhanden ist.

Die in Beispiel 4 und 5 gezeigten Ergebnisse belegen, dass die Adenoviren dl520 und dl1119/1131 in YB-1-Kern-positiven Zellen wie z. B. 257RDB im Unterschied zu U2OS replizieren und eine Zellyse induzieren. Dies belegt somit die Aussage der erfindungsgemäßen Verwendung der Adenoviren. Weiterhin belegen die Ergebnisse, dass bereits eine schwache Transaktivierung der viralen Gene in YB-1-Kern-positiven Zellen im Vergleich zum Wildtyp-Adenovirus durch die modifizierten oder deletierten E1A-Genprodukte bei Anwesenheit von YB-1 im Zellkern erfolgreich mit einer Replikation und Lyse von derartigen Zellen ein-

hergeht, einschließlich beispielsweise von vielfachresistenten Zellen, und somit die hierin beschriebenen Adenoviren bei der Lyse derartiger Tumoren verwendet werden können.

Beispiel 7: Steigerung der Replikationseffizienz von E1-minus Adenoviren

In diesem Beispiel wird die Substitution der frühen viralen Gene E1B-55K und E4orf6 durch Transfektion mit dem Plasmid pE4orf6 und Infektion mit dem E1/E3-deletierten Adenovirus Ad-55K gezeigt. Ad-55K ist ein E1/E3 deletiertes Virus, wobei E1B-55K in die E1 kloniert wurde und unter CMV-Kontrolle steht. Diese Substitution wird mit Blick darauf erforderlich, dass AdYB-1, d. h. ein Adenovirus, der YB-1 exprimiert, diese frühen Gene nicht exprimiert und der vorliegende Erfinder erkannt hat, dass eine Substitution dieser frühen Gene in einem Replikationssystem, bei dem YB-1 im Kern vorhanden ist, in der Lage ist, die Replikationseffizienz bzw. die Partikelbildungseffizienz in einem Umfang vergleichbar derjenigen von Wildtyp-Adenoviren vom Typ Ad5 zu erhöhen.

Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

Transfektion von je 10^5 U2OS-Zellen mit dem Plasmid pE4orf6 mit Hilfe von Lipofectamin. Das Plasmid pE4orf6 trägt die für das frühe virale Gen E4orf6 codierende DNA-Sequenz unter CMV-Kontrolle.

24 h nach der Transfektion mit dem Plasmid pE4orf6 wurden die Zellen mit dem YB-1 exprimierenden E1/E3-deletierten Adenovirus AdYB-1 (50 pfu/Zelle) und dem E1/E3-deletierten E1B-55K Adenovirus Ad-55K (50 pfu/Zelle) infiziert. Ad-55K ist ein E1/E3-deletiertes Virus, welches als Transgen das virale Gen E1B-55K unter CMV-Kontrolle trägt.

Anschließend wurden die Zellen vom Medium (2ml) 5 Tage nach der Infektion (= post infectionem) entfernt. Die Freisetzung der viralen Partikel aus den isolierten Zellen erfolgte durch dreimaliges alternierendes Einfrieren und Auftauen (engl. thaw/freeze). Anschließend wurde ein Plaque Assay auf 293-Zellen zur Bestimmung der gebildeten infektiösen Partikel (plaque forming units pro ml (pfu/ml)) durchgeführt. Das Ergebnis ist in den Figs. 8 und 9 dargestellt. Dabei zeigt Figur 8 das Ergebnis des Plaque Assays, dargestellt in absoluten Zahlen. Die

deutlichste Differenz zur Infektion mit AdYB-1 alleine zeigt hierbei die Kombination aus Transfektion mit dem Plasmid pE4orf6 und Co-Infektion mit den beiden Viren AdYB-1 und Ad-55K. Fig. 9 zeigt das Ergebnis von Fig. 8, wobei hier die Steigerung der Replikationseffizienz als Vielfaches der für AdYB-1 ermittelten Replikation dargestellt ist. Die mit Plasmid pE4orf6 transfizierten und anschließend mit AdYB-1 und E1B-55K (Ad-55K) infizierten Zellen produzierten bis zu 25 mal mehr pfu/ml.

Aufgrund dieser Ergebnisse kann gefolgert werden, dass die Substitution von E1B-55K und E4orf6 die Anzahl der gebildeten Viren (pfu/ml) nach Infektion mit dem E1/E3-deletierten Adenovirus AdYB-1 um einen Faktor von bis zu 25 erhöht. Dabei sind die additiven Effekte von E1B-55K und E4orf6 auf die Produktion von plaque forming units (pfu) signifikant größer als die Effekte eines der beiden Genprodukte alleine.

Kontrollversuche mit einem Plasmid, welches EGFP exprimierte, zeigten deutlich, dass in dem gewählten experimentellen Ansatz nur etwas 10 % der Zellen erfolgreich mit dem Plasmid pE4orf6 transfiziert werden konnten. Die Anzahl der in den Zellen gebildeten Partikel, die sowohl E1B-55K als auch E4orf6 exprimierten, ist mit der des humanen Adenovirustyp 5 (Wildtyp) vergleichbar. Dies bestätigt die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis, dass die Expression von E4orf6 und E1B-55K in Verbindung mit der Kernlokalisation von YB-1 in der Lage ist, eine adenovirale Replikation bzw. Partikelbildung, insbesondere von E1A-deletierten Adenoviren zu bewerkstelligen, die vergleichbar derjenigen von Wildtyp Ad5 ist.

Beispiel 8: Verstärkung der Replikation von in YB1-Kern-negativen Zellen nicht replizierenden Adenoviren in YB-1-Kern-positiven Zellen nach Gabe von Zytostatika

Im Stand der Technik ist bekannt, dass durch die Zugabe von verschiedenen Zytostatika die Kernlokalisation des humane Transkriptionsfaktor YB-1 induziert wird. Wie vom vorliegenden Erfinder gefunden, steuert kernlokalisiertes YB-1 die adenovirale Replikation mittels Aktivierung des adenoviralen E2-late Promoters. Die Kombination beider Effekte kann dazu genutzt werden, um eine spezifische Tumorlyse herbeizuführen.

Bei der Durchführung der onkolytischen Assays wurde wie folgt vorgegangen. 200.000 Zellen (HeLa bzw. U2OS) wurden je Napf in 6-Napf-Platten ausplattiert. Am nächsten Tag wurden 40 ng/ml (Endkonzentration) Daunorubicin zugegeben. Nach 3 Stunden Inkubationszeit wurden die Zellen mit 10 bzw. 30 pfu dl520/Zelle infiziert. Anschließend wurden die Zellen in Zytostatika-freiem Medium incubiert. Nach 3-5 Tagen wurden die Zellen mit Kristallviolett angefärbt.

Wie aus Fig. 10 und 11 ersichtlich, induziert die Zugabe von Daunorubicin die Replikation von dl520 durch die Kernlokalisierung von YB-1. Somit erzielt dl520 in Verbindung mit dem Zytostatikum Daunorubicin einen größeren tumorlytischen Effekt als Daunorubicin alleine.

Beispiel 9: In vivo Tumorlyse durch dl520

Die in dieser in vivo Studie verwendeten Zellen HeLa (YB-1 Kern-negativ) und 257RDB (YB-1 Kern-positiv) werden unter sterilen Zellkulturbedingungen expandiert. Kurz vor der Injektion der Zellen in die Mäuse (Stamm CD1NuNu), um einen Tumor subcutan zu setzen, werden diese durch Trypsinierung geerntet, in DMEM-Medium (10 % FKS) aufgenommen, gezählt und einmal mit PBS gespült. Anschließend werden die Zellen zentrifugiert, das PBS abgesaugt und in frischem PBS, der gewünschten Zellzahl entsprechen, portioniert. Die subcutan injizierte Zellzahl betrug in dieser Studie je 5×10^6 Zellen von beiden Zelllinien. Die Injektion erfolgt subcutan in eine Flanke der Tiere, wobei die HELA-Zellen in die rechte Seite und die 257RDB-Zellen in die linke Flankenseite zur besseren Unterscheidung injiziert wurden. Das Wachstum der Tumoren wurde zweimal wöchentlich kontrolliert und dabei die Länge und die Breite der Tumoren mit einer Schieblehre gemessen. Daraus wurde das Tumolvolumen über folgende mathematische Formel berechnet:

$$\frac{3}{4}\pi * a/2 * (b/2)^2 \quad a = \text{Länge}, b = \text{Breite}$$

Wenn der Tumor ein Volumen von 200 bis 520 mm³ erreicht hat, wird das Virus bzw. PBS als Negativkontrolle intratumoral appliziert. Die zu injizierenden Volumina waren gleich und

betragen jeweils 50 μ l. Dies wird an 3 aufeinanderfolgenden Tagen wiederholt. Die Gesamtdosis an appliziertem Virus betrug 5×10^8 pfu. Danach wird das Tumorstadium weiterhin zweimal pro Woche dokumentiert und das Volumen berechnet. Am Ende der Studie werden die Mäuse euthanasiert und die Tumoren für weitere Analysen entnommen.

Die Ergebnisse sind in den Figuren 12 und 13 dargestellt.

Fig. 12 zeigt ein Diagramm, welches das Volumen des Tumors in Abhängigkeit von der Zeit und den verschiedenen Behandlungsschemata darstellt. Im Falle der durch RDB257 ausgebildeten Tumoren erfolgt bei Injektion von PBS ein signifikantes Wachstum des Tumors von ca. 438 mm^3 bis 1466 mm^3 . Unter dem Einfluss des erfindungsgemäß verwendeten Vektors dl520 konnte das Tumorstadium signifikant verringert werden. Ausgehend von einer durchschnittlichen Tumorstadiumgröße von 344 mm^3 erhöhte sich die Tumorstadiumgröße lediglich um 21 % auf insgesamt 543 mm^3 .

Als Kontrolle wurde im vorliegenden Beispiel der Tumor aus HeLa-Zellen verwendet, der sich bei Gabe von PBS hinsichtlich seines Wachstums ähnlich verhielt, wie der auf RDB257 zurückgehende Tumor bei Gabe von PBS. Mit dl520 behandelte HeLa-Zellen basierte Tumoren zeigten einen noch wesentlicheren Anstieg des Tumorstadiumwachstums ausgehend 311 mm^3 bis 1954 mm^3 .

Fig. 13 zeigt Aufnahmen von euthanasierten Nacktmäusen, denen unter Anwendung von RDB257 ein Tumor gesetzt wurde. Es ist deutlich zu erkennen, dass nach der erfindungsgemäßen Applikation des Adenovirus dl520 eine signifikante Rückbildung des Tumors eintrat. Im vorliegenden Falle wurde sogar eine Verringerung des Tumorstadiumvolumens erzielt (Tag 1 nach Applikation des Virus dl520: 515 mm^3 ; Tag 30 nach Applikation des Virus dl520: 350 mm^3).

Beispiel 10: Southern Blot von Tumor-DNA

Die DNA wird aus einem Tumorstück isoliert, welches aus der Mitte des in Beispiel 9 gesetzten Tumors entnommen worden ist. Für die Isolierung wird das Dneasy Tissue Kit von der Firma Qiagen benutzt. Die Durchführung der DNA-Isolierung erfolgte nach Herstellerangaben. Dabei wird die DNA aus den Zellen durch eine alkalische Lyse freigesetzt. Anschließend wird isolierte DNA über eine Säule gereinigt. Anschließend wird die Konzentration der isolierten DNA photometrisch bei 260 nm gemessen. Die Analyse erfolgte anhand von 2 µg der DNA-Proben, die mit dem Restriktionsenzym Kpn I 10 Units verdaut wurden. Dann erfolgt eine elektrophoretische Auftrennung der Proben in einem 0,8%igen Agarosegel. Anschließend wurde die DNA auf eine Nylonmembran geblottet (Durchführung nach dem System von Schleicher & Schuell). Die auf der Membran geblottete DNA wird gegen eine spezifische 1501 bp große DNA-Sonde hybridisiert. Die 1501 bp große DNA-Sonde bindet spezifisch an das 3369 bp-große Kpn I-Fragment innerhalb der E2A-codierenden Ad5-Sequenz. Die Sonde wurde zuvor per PCR (Primer: 5'- GTC GGA GAT CAG ATC CGC GT (SEQ.ID. No 2), 5'- GAT CCT CGT CGT CTT CGC TT (SEQ. ID.No.3)) hergestellt und mit ³²P radioaktiv markiert. Anschließend wird die Membran gewaschen und auf eine Filmfolie exponiert.

Das Ergebnis des Southern-Blots der Tumor-DNA ist in Fig. 14 dargestellt. Die Analyse belegt, dass nur dl520 in den resistenten Zellen RDB257 in vitro repliziert, wie in den Spuren 3, 4 und 5 dargestellt. Spur 1 zeigt als Positivkontrolle Ad-5d, Spur 6, 7 und 8 DNA von HeLa-Zellen, die mit dl520 infiziert wurden. Nachdem HeLa-Zellen keine YB-1-Kernpositivität zeigen, erfolgte darin keine Replikation des Virus dl520, so dass entsprechend die E2A-Sequenz nicht nachgewiesen werden konnte.

Ein weiteres Ergebnis mit dl520 ist in der Fig. 15 dargestellt. Anhand eines Plaque-assays wurde die Partikelbildung (pfu/ml) nach Infektion mit dl520 und Wildtyp-Adenovirus untersucht. Dabei werden verschiedene YB-1 Kern-positive (257RDB und 181RDB) Tumorzellen und YB-1 kern-negative Tumorzellen mit dl520 und Wildtyp-Adenovirus infiziert.

Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

Jeweils 100.000-200.000 Zellen werden in sog. Platten mit 6 Nöpfen (engl. 6 well plates) in L 15-Medium (resistente Zellen) bzw. DMEM (nicht-resistente Zellen) jeweils mit 10 % FKS ausplattiert. Nach 24 h erfolgt die Infektion mit dl520 und WT-Adenovirus (10 pfu/Zelle) 3 Tage nach der Infektion (post infectionem) erfolgt die Freisetzung der viralen Partikel aus der Zellsuspension (3 ml) durch dreimaliges alternierendes Einfrieren und Auftauen (engl. thaw/freeze). Anschließend wurde ein Plaque Assay auf 293-Zellen zur Bestimmung der gebildeten infektiösen Partikel (plaque forming units pro ml (pfu/ml)) durchgeführt. Das Ergebnis ist in der Fig. 15 dargestellt. Dabei zeigt das Ergebnis des Plaque Assays, dass dl520 in den YB-1 Kern-positiven Zellen (257RDB und 181RDB) vergleichbar dem Wildtyp-Adenovirus repliziert. Insoweit wird bei der erfindungsgemäßen Verwendung der hierin beschriebenen Adenoviren eine Replikationseffizienz vergleichbar derjenigen von Wildtyp-Adenoviren erreicht.

Beispiel 11: Struktureller Aufbau des adenoviralen Vektors Xvir03

Fig.16 zeigt den strukturellen Aufbau des adenoviralen Vektors Xvir03. Das Adenovirus Xvir03 ist ein sogenanntes E1/E3-deletiertes Adenovirus. Das heisst, dass keine für die adenovirale Replikation funktionellen E1A, E1B und E3 Proteine hergestellt werden. Die Deletion der E1 Region erstreckt sich von 342 – 3528; die Deletion der E3 Region von Aminosäureposition 27865 – 30995. Wie hierin verwendet, bezeichnet der Begriff „E1-deletiertes Virus“ ein solches Virus, bei dem E1 funktional nicht mehr aktiv ist. Dies kann durch eine Inaktivierung bei ansonsten weitestgehend intakter Nukleinsäure- bzw. Aminosäuresequenz erfolgen, kann jedoch auch eine unterschiedlich große Deletion des für E1-Region kodierenden Proteins bedeuten. Durch das Fehlen des E1A und E1B Proteins bzw. der dafür codierenden Nukleinsäuren wird die E4-Region, z.B. E4orf6, nicht oder nur sehr schwach (ca. 1-5% im Vergleich zum Wildtyp-Adenovirus) exprimiert. In der E1-Region werden die viralen Gene E1B55k und E4orf6 vermittelt durch den in den Xvir 03 eingeführten, heterologen CMV-Promoter (Firma Clontech: Plasmid pShuttle) exprimiert. Anstelle des CMV-Promotors können auch jene hierin beschriebenen Promotoren verwendet werden, wie im Zusammenhang mit der Expression von E1A offenbart. Der offene Leserahmen beider Gene ist über eine sogenannte IRES-Sequenz (engl.: internal ribosomal entry site) miteinander verbunden (Pelletier,

J. and Sonenberg, N. Nature, 1988, 334, 320-325). Dieses Element (Firma Novagen: pCITE) erlaubt die Expression von 2 Proteinen aus einer mRNA.

Bei der Herstellung des Vektors wurde wie folgt vorgegangen:

Das Plasmid E1B55k-pShuttle ging durch Umklonierung des offenen Leserahmens von E1B55k aus pCGNE1B von M. Dobelstein (Uni Marburg) mit XbaI und BfrI in den pShuttle-Vektor von Clontech hervor. Anschließend wurde E1B55k in pShuttle mit ApaI linearisiert, die Enden geglättet und mit NheI geschnitten.

In einem zweiten Vektor, dem pcDNA3.1(+) (Invitrogen), wurden nacheinander das IRES-Element als PCR-Produkt mit dem pCITE-4a(+) der Firma Novagen als Template über TA-Klonierung in die EcoRV-Schnittstelle und das E4orf6 aus dem Plasmid pCMV-E4orf6 (M. Dobelstein, Uni Marburg) über BamHI hineinkloniert = IRES-E4orf6-pcDNA3.1(+). IRES-E4orf6 in pcDNA3.1 (+) wurde linearisiert mit NotI, die Enden geglättet und anschließend wurde das Fragment IRES-E4ORF6 mit NheI herausgeschnitten. Das Fragment IRES-E4orf6 wurde mit dem geöffneten Vektor E1B55k-pShuttle (blunt, NheI) verknüpft. Die Kassette wurde anschließend aus dem E1B55k-IRES-E4orf6-pShuttle zusammen mit dem CMV-Promotor und dem *bovine growth hormone* (BGH)-PolyA in das ΔE1, ΔE3 Adeno-X-Plasmid (Clontech) mit I-Ceu I und PI-SceI kloniert und als AdcmvE1B/IRES/E4orf6 bezeichnet. Danach erfolgte die Adenovirusherstellung nach Herstellerangaben (Clontech). Das mit PacI linearisierte Adenoplasmid mit dem Expressionselement CMV-E1B55k-IRES-E4orf6-BGH polyA wurde mit in HEK293 Zellen transfiziert und nach 11 Tagen *post transfectionem* die sich ablösenden Zellen zusammen mit dem Medium abgenommen, um durch wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen die entstandenen Adenoviren freizusetzen.

Der vorstehend beschriebene Vektor eignet sich grundsätzlich wie die anderen hierin beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Viren. Insbesondere ist der vorstehend beschriebene Vektor dazu geeignet, in YB-1-Kern-positiven Zellen sowie Zellen, in denen YB-1 dereguliert, d.h. im Vergleich zu Normal-Zellen bzw. Nicht-Tumorzellen überexprimiert vorliegt, zu replizieren und insoweit eine Lyse herbeizuführen. Die Anwendung dieses Vektors erstreckt sich dabei auch insbesondere auf jene Krankheiten und Patientengruppen oder Pati-

entenkollektive, die für die anderen hierin beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Adenoviren und erfindungsgemäßen Adenoviren offenbart sind.

Beispiel 12: Struktureller Aufbau des adenoviralen Vektors Xvir03/01

Wie aus Fig. 17 ersichtlich, ist XVIR03/01 eine Weiterentwicklung von XVIR03. Dabei können in der E3 Region therapeutische Gene wie beispielsweise die hierin beschriebenen Gene und Transgene kloniert werden. Zudem wurde eine Deletion in der E4-Region eingeführt, um eine homologe Rekombination mit dem E4orf6 aus der Expressionskassette von Xvir03 zu vermeiden. Dies führt auch dazu, dass bei diesem Konstrukt größere Transgene kloniert werden können. Die deletierte E3-Region enthält für das Einsetzen einer Kassette nutzbare SacI, NdeI und NheI- Schnittstellen, in die beispielsweise die therapeutischen Transgene einkloniert werden können.

Vorbereitung eines Plasmids zur Klonierung therapeutischer Gene in die E3-Region sowie zur Deletion in der E4-Region:

Das pAdenoX-Plasmid von Clontech verfügt über eine SfuI –Schnittstelle hinter der 3' ITR-Region, die im wildtyp Adenovirus fehlt. Die E3-E4-Region wurde mit SpeI (Position 23644) und SfuI aus pAdenoX (Clontech) in pcDNA3.1(+) (Invitrogen) übernommen = pcDNA3.1-E3Δ27865-30995-E4. Der Großteil des E4ORF6, nämlich 33241-33875 wurde mittels PstI entfernt = pcDNA3.1-E3Δ27865-30995,E4Δ33241-33875. Für die Weiterentwicklung von XVIR03 wurde der deletierte E3/E4-Bereich aus pcDNA3.1-E3Δ27865-30995,E4Δ33241-33875 mittels SfuI und SpeI in das Plasmid pAdenoX kloniert = pAdenoX E3Δ27865-30995,E4Δ33241-33875.

Die Expressionskassette wurde anschließend wie für Xvir03 beschrieben aus dem E1B55k-IRES-E4orf6-pShuttle zusammen mit dem CMV-Promotor und dem *bovine growth hormone* (BGH)-PolyA in das pAdenoX E3Δ27865-30995,E4Δ33241-33875 mit I-Ceu I und PI-SceI kloniert und als AdcmvE1B/IRES/E4orf6-ΔE4 bezeichnet. Danach erfolgte die Adenovirusherstellung nach Herstellerangaben (Clontech).

Der vorstehend beschriebene Vektor eignet sich grundsätzlich wie die anderen hierin beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Viren. Insbesondere ist der vorstehend beschriebene Vektor dazu geeignet, bei YB-1-Kern-positiven Zellen sowie Zellen, in denen YB-1 dereguliert, d.h. im Vergleich zu Normal-Zellen bzw. Nicht-Tumorzellen überexprimiert vorliegt zu replizieren und insoweit eine Lyse herbeizuführen. Die Anwendung dieses Vektors erstreckt sich dabei auch insbesondere auf jene Krankheiten und Patientengruppen oder Patientenkollektive, die für die anderen hierin beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Adenoviren und erfindungsgemäßen Adenoviren offenbart sind.

Beispiel 13: Onkolytische Wirkung von Xvir 03 in 257 RDB- und 181 RDB-Zellen

Pro Napf einer Platte mit sechs Näpfen (engl. 6 well plate) wurden jeweils 100.000 Zellen (257RDB und 181RDB) ausplattiert. Am nächsten Tag wurden die Zellen wie in Fig. 18 dargestellt mit Ad312 (20pfu/Zelle) und Xvir03 (5pfu/Zelle) infiziert. Die Infektion erfolgte in 500 µL serumfreie DMEM-Medium für 1 h bei 37° C. Anschließend wurde das Infektionsmedium entfernt und durch 2 ml Vollmedium (10 % FKS/DMEM) ersetzt. Nach 5 Tagen erfolgte die Auswertung mit Hilfe einer Kristallviolett-färbung. Das Ergebnis ist in Figs. 18A und 18B dargestellt.

Wie aus Fig. 18A und 18B ersichtlich, zeigen die vielfachresistenten Zellen, welche YB-1 im Kern aufweisen, nach Infektion mit Ad312 und Xvir03 nur bei Xvir03 eine Lyse, wie durch Kristallviolett-färbung der Zellen dargestellt. Dabei wird zunächst das Medium entfernt. Anschließend werden die Zellen mit Kristallviolett überschichtet (50 % ETOH, 3 % Formaldehyd, 5 % Essigsäure, 1 % Kristallviolett) und für 5-10 min bei Raumtemperatur inkubiert. Danach werden die Platten mit sechs Näpfen mit Wasser gründlich gewaschen und bei Raumtemperatur getrocknet.

Es ist dem vorliegenden Erfinder bekannt, dass E1A-deletierte Viren (z. B. Ad312), die jedoch keine transaktivierenden Adenoviren im Sinne der vorliegenden Erfindung sind, bei höheren MOI's sehr effizient replizieren können (Nevins J. R., Cell 26, 213-220, 1981), die jedoch in der klinischen Anwendung nicht zu realisieren sind. Dieses Phänomen wird in der

Literatur als „E1A-like activity“ bezeichnet. Der hier eingesetzte Adenovirus Ad312 ist ein E1A-deletiertes Virus. Bei der eingesetzten Menge (20 pfu/zelle), die noch oberhalb des klinisch wünschenswerten Titters liegt, werden die frühen adenoviralen Gene wie z. B. E1B55k und E4orf6 nicht oder nur sehr gering exprimiert (Nevins J. R., Cell 26, 213-220, 1981). Wie bereits beschrieben spielen diese Gene bzw. die Proteine eine bedeutende Rolle bei der viralen Replikation. Im Gegensatz dazu werden diese Gene bzw. Proteine beim Adenovirus Xvir03 exprimiert (Fig 16). Anhand der Fig. 18A und 18B wird ersichtlich, dass die Expression der Gene E1B55k und E4orf6 zur einer effizienten viralen Replikation und Zellyse führen bei gleichzeitig geringem erforderlichen Infektionstiter (ausgedrückt als pfu/Zelle). Dies bestätigt die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis, dass die Expression von E4orf6 und E1B-55K (und das Nicht-Vorhandensein von E1A) in Verbindung mit der Kernlokalisation von YB-1 in der Lage ist, eine sehr effiziente adenovirale Replikation zu induzieren. Die dazu erforderliche Menge von nur 1 bis 5 pfu/Zelle lässt jetzt eine klinischen Anwendung zu.

Dies bestätigt die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis, dass das Vorhandensein von YB-1 im Kern, insbesondere Zellzyklus-unabhängig, erforderlich ist, um die erfindungsgemäß zu verwendenden Viren zu einer Lyse von infizierten Zellen zu veranlassen.

Beispiel 14: Northern Blot Analyse der E2-Genexpression von Adenovirus Ad312

In 10 cm Petrischalen wurden jeweils 1 Million A549 und U2OS Zellen ausplattiert. Am nächsten Tag wurden die Zellen mit Ad312 (50pfu/Zelle) und Adwt (diente zur Kontrolle, 5pfu/Zelle) infiziert. Die eingesetzte hohe Virusmenge von Ad312 führt dabei zu einer E1-unabhängigen Replikation in Tumorzellen. Die Infektion erfolgte in 1-2 ml serumfreiem DMEM-Medium für 1 h bei 37° C. Anschließend wurde das Infektionsmedium entfernt und durch 10 ml Vollmedium (10 % FKS/DMEM) ersetzt. Nach 3 Tagen wurde die RNA isoliert. Anschließend wurde die Konzentration der isolierten RNA photometrisch bei 260 nm gemessen. Dann erfolgte eine elektrophoretische Auftrennung der RNA-Proben in einem 0,8%igen Formaldehyd-Agarosegel. Anschließend wurde die RNA auf eine Nylonmembran geblottet (Durchführung nach dem System von Schleicher & Schuell). Die auf der Membran geblottete RNA wird gegen eine „frühe Sonde“ E2 und gegen eine „späte Sonde“ E2 hybridisiert. Die 1501 bp große „spät-Sonde“ bindet spezifisch hinter dem E2-late Promotor. Die Sonde wurde

zuvor per PCR (Primer: 5'- GTC GGA GAT CAG ATC CGC GT (SEQ. ID. NO. 4), 5'- GAT CCT CGT CGT CTT CGC TT (SEQ. ID. NO. 5)) hergestellt und mit ^{32}P radioaktiv markiert. Die frühe Sonde bindet dagegen zwischen dem E2-early und den E2-late Promotor (Position: 226791-227002) und wurde ebenfalls mittels PCR hergestellt (Primer: 5'- AGCTGATCTTCGCTTTTG (SEQ. ID. NO. 6), 5'- GGATAGCAAGACTCTGAC AAAG (SEQ. ID. NO. 7). Anschließend wird die Membran gewaschen und auf eine Filmfolie exponiert.

Das Ergebnis ist in Fig. 19 dargestellt. Während in der Kontrollinfektion mit Wildtyp-Adenovirus sowohl die frühe wie auch die späte Probe ein spezifisches Signal liefert, zeigen die mit Ad312 infizierten Tumorzellen nur ein spezifisches Signal bei der Verwendung der späten Probe. Dies bestätigt die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis, dass die Expression von E4orf6 und E1B-55K und das Nicht-Vorhandensein von E1A überexprimiertes bzw. dereguliertes YB-1 in den Kern transportiert und somit die E2-Genexpression als Voraussetzung für eine effiziente adenovirale Replikation induziert.

Beispiel 15: Northern Blot Analyse der E2-Genexpression von Adenovirus Addelta24

In 10 cm Petrischalen wurden jeweils 1 Million U2OS Zellen ausplattiert. Am nächsten Tag wurden die Zellen mit Adenovirus delta 24 (Addelta24) (10pfu/Zelle) und Adenovirus vom Wildtyp (Adwt) (diente zur Kontrolle, 10pfu/Zelle) infiziert. Das verwendete Addelta24 rekombinante Adenovirus (Fueyo, J. et al., Oncogene 19, 2-12, 2000) weist eine spezifische Deletion in der CR2-Region des E1A-Proteins auf und ist somit nur in der Lage, in Rb-negativen Tumoren zu replizieren. Ferner exprimiert das Virus vergleichbar wie Wildtyp-Adenovirus die Gene E1B55k und E4orf6. Die Infektion erfolgte in 1-2 ml serumfreie DMEM-Medium für 1 h bei 37° C. Anschließend wurde das Infektionsmedium entfernt und durch 10 ml Vollmedium (10 % FKS/DMEM) ersetzt. Nach 12 h und 24 h wurde die RNA isoliert. Anschließend wurde die Konzentration der isolierten RNA photometrisch bei 260 nm gemessen. Dann erfolgte eine elektrophoretische Auftrennung der RNA-Proben in einem 0,8%igen Formaldehyd-Agarosegel. Anschließend wurde die RNA auf eine Nylonmembran geblottet (Durchführung nach dem System von Schleicher & Schuell). Die auf der Membran geblottete RNA wird gegen eine „frühe Sonde“ und gegen eine „späte Sonde“ hybridisiert. Die

1501 bp große „spät-Sonde“ bindet spezifisch hinter dem E2-late Promotor. Die Sonde wurde zuvor per PCR (Primer: 5'- GTC GGA GAT CAG ATC CGC GT (SEQ. ID. NO. 4), 5'- GAT CCT CGT CGT CTT CGC TT (SEQ. ID. NO. 5)) hergestellt und mit ^{32}P radioaktiv markiert. Die frühe Sonde bindet dagegen zwischen dem E2-early und den E2-late Promotor und wurde ebenfalls mittels PCR hergestellt (Primer: 5'- AGCTGATCTTCGCTTTTG (SEQ. ID. NO. 6), 5'-GGATAGCAAGACTCTGACAAAG (SEQ. ID. NO. 7)). Anschließend wird die Membran gewaschen und auf eine Filmfolie exponiert.

Das Ergebnis ist in Fig. 20 dargestellt.

Nach 12 h zeigt nur die späte Probe ein spezifisches Signal. Erst nach 24 h zeigt auch die frühe Probe ein Signal in den mit Addelta24 infizierten Zellen. Im Vergleich zum Wildtyp-Adenovirus ist das Signal jedoch deutlich schwächer. Auch dieses Ergebnis bestätigt die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis, dass die Expression von E4orf6 und E1B-55K überexprimiertes bzw. dereguliertes YB-1 in den Kern transportiert, das dann an den E2-late Promotor bindet und somit die E2-Genexpression induziert.

Beispiel 16: Struktureller Aufbau des adenoviralen Vektors XvirPSJL1 und XvirPSJL2

Beschreibung der Vektoren: Die Vektoren der XvirPSJL-Gruppe, die Ausführungsformen der hierin als Adenoviren der Gruppe I bezeichneten Viren darstellen und beispielhaft durch die Vektoren bzw. Adenoviren XvirPSJL1 und XvirPSJL2 veranschaulicht werden, sind nicht nur wie auch der Adenovirus dl520 in der Lage, in YB-1 Kern-positiven Zellen, insbesondere Tumorzellen zu replizieren, sondern auch in Tumorzellen, in denen YB-1 überexprimiert bzw. dereguliert vorliegt. Während die viralen Gene E1B55k und E4orf6 in dl520 infizierten Zellen nur in YB-1 Kern-positiven Zellen unter dem Einfluss des E1B-Promotors bzw. des E4-Promotors exprimiert werden, erfolgt die Expression von E1B55k und E4orf6 in XvirPSJL über den Cytomegalievirus (cmv)-Promotor. Statt des cmv-Promotors können allerdings auch andere Promotoren, insbesondere Tumor-, Gewebe- oder Organ-spezifische Promotoren verwendet werden. Durch die Expression von E1B55k und E4orf6 wird das überexprimierte bzw. deregulierte YB-1 in den Kern transportiert und die adenovirale Replikation eingeleitet.

Die hierin offenbarten adenoviralen Vektoren der XvirPSJL-Gruppe vereinen somit verschiedenen Elemente und damit Funktionen der adenoviralen Vektoren dl520, Xvir03 und AdYB-1 in einem Vektor. Ähnlich dem Vektor dl520 weisen die XvirPSJL-Viren das E1A12S Gen auf. Dieses Gen bzw. das entsprechende Genprodukt ist für die Induktion der S-Phase der infizierten Zelle verantwortlich und fördert die virale Replikation und die Wirkung von Chemotherapeutika und von Bestrahlung. Wie Xvir03 enthalten die XvirPSJL-Viren die Expressionskassette CMV-E1B55k/IRES/E4orf6; die für eine effiziente Replikation benötigt wird und dereguliertes YB-1, welches bevorzugterweise in Tumorzellen vorhanden ist, indirekt oder direkt in den Kern transportiert. Damit ist eine Replikation nur in solchen Zellen, insbesondere Tumorzellen, möglich, in denen YB-1 überexprimiert bzw. dereguliert vorliegt. Zudem wird P53 durch den Komplex E1B55k/E4orf6 der Degradation zugeführt. Aus dem Virus AdYB-1 stammt die für den humanen Transkriptionsfaktor YB-1 codierende Sequenz. Das endogene, d. h. das in der Zelle bereits vorhandene Protein YB-1 verstärkt die virale Replikation. Sowohl E1A12S wie auch YB-1 werden durch den YB-1-abhängigen adenoviralen Promoter E2-Late in ihrer Expression gesteuert. Auch hier können stattdessen spezifische Promotoren verwendet werden, insbesondere Tumor-, Gewebe- oder Organ-spezifische. Als ein weiteres Merkmal dieser Viren liegt eine Deletion in der E4-Region vor. Der Vektor besitzt dort Schnittstellen, in die bei den adenoviralen Vektoren XvirPSJL1 und XvirPSJL2 verschiedene Transgene, wie in der Beschreibung offenbart, beispielsweise Ribozyme, Antisense-Moleküle, siRNA, Apoptoseinduzierende-Gene, Zytokine und Prodrug-Gene, zur Expression gebracht werden können. Deren Expression kann ebenfalls durch Tumor-, Gewebe- oder Organ-spezifische Promotoren gesteuert werden, wie in der Beschreibung offenbart. Die einzelnen Expressionskassetten sind in ihrer Lokalisation, insbesondere hinsichtlich der und innerhalb der E1-, E3- und E4-Region nicht festgelegt, sondern können beliebig angeordnet sein. Die Vektoren replizieren unabhängig vom p53 oder Rb-Status der Tumorzellen.

Der strukturelle Aufbau der rekombinanten Adenoviren XvirPSJL1 und Xvir PSJL2 sind in den Abbildungen 21 und 22 dargelegt:

Herstellung der Kassette E2-late- YB1IRES/12S:

Das hierin als Ausgangsmaterial verwendete pAdenoX-Plasmid von der Firma Clontech/ BD Biosciences umfasst die genomische Nukleinsäure von Adenovirus Ad5 und verfügt über eine SfuI –Schnittstelle hinter der 3' ITR-Region, die im Wildtyp-Adenovirus fehlt. Die E3-E4-

Region wurde mit *SpeI* (Position 23644) und *SfuI* aus pAdenoX (Clontech) in pcDNA3.1(+) (Invitrogen) übernommen und als pcDNA3.1-E3 Δ 27865-30995-E4 bezeichnet. Der Großteil des E4ORF6, nämlich die Basen 33241-33875 wurde mittels *PstI* entfernt. Das solchermaßen erhaltene Fragment wurde als pcDNA3.1-E3 Δ 27865-30995, E4 Δ 33241-33875 bezeichnet.

Der E2late-Promoter wurde aus pGL3-EGFP (Holm et al., JBC 2002, 277, 10427-10434) mit *SacI* und *NheI* ausgeschnitten und in pcDNA3.1-E3 Δ 27865-30995, E4 Δ 33241-33875 kloniert. Dabei wird die E3-Region weiter deletiert im Bereich der Basen Δ 27593-31509. Das solchermaßen erhaltene Fragment wurde als E2late-pcDNA3.1 E3 Δ 27593-31509, E4 Δ 33241-33875 bezeichnet.

Die cDNA für das E1A-243AS-Produkt wurde mittels einer RT-PCR hergestellt, isoliert und die Sequenz überprüft und wurde über *BamHI* und *EcoRI* in den pcDNA3.1(+) Vektor (Invitrogen) kloniert. E1A-12S-pcDNA3.1+ wurde mit *NheI* und *BamHI* linearisiert, die Enden mit T4-Polymerase geglättet und durch Taq-Polymerase und dTTPs mit T-Überhängen versehen. Das IRES-Element wurde als PCR-Produkt (Template = pCITE, Novagen) in den E1A-12S-pcDNA 3.1(+) Vektor kloniert (TA-Cloning-Strategie).

Das YB-1 -*EcoRI*-Fragment wurde aus dem Vektor pHVad2c (Holm et al., JBC 2002, 277, 10427-10434) isoliert und die Enden geglättet. Der Vektor pShuttle (kommerziell erhältlich von der Firma BD Biosciences) wurde mit *XbaI* linearisiert, die Enden geglättet und dephosphoryliert und mit der zuvor hergestellten für YB-1 codierenden Nukleinsäure verküpft. Der solchermaßen erhaltene Vektor wurde als YB-1-pShuttle bezeichnet. Die Umklonierung in den pShuttle-Vektor versah die für das YB-1-Fragment codierende Nukleinsäure mit einem STOP-Codon im Leserahmen. Aus YB-1-pShuttle wurde die für das YB-1 codierende Nukleinsäure mittels *NheI* und *BfrI* in den Vektor IRES- E1A-12S in pcDNA3.1 (+) kloniert. Das solchermaßen erhaltene Fragment wurde als YB-1 (*EcoRI-EcoRI* mit STOP-Codon)-IRES-E1A-12S- pcDNA3.1(+) bezeichnet.

Anschließend wurde daraus die Kassette YB-1-IRES-E1A12S mit *PmeI* ausgeschnitten und in den mit *NheI* linearisierten, geblunteten und dephosphorylierten Vektor E2late-pcDNA3.1

E3 Δ 27593-31509,E4 Δ 33241-33875 kloniert. Damit befindet sich die zweite Kassette im deletierten Bereich der E3-Region .

Die transgene Kassette umfassend das Nukleinsäurekonstrukt E2late-YB-1-IRES-E1A12S wurde zusammen mit den restlichen adenoviralen Sequenzen E3 Δ 27593-31509,E4 Δ 33241-33875 mittels *Sfi*I und *Spe*I in den Vektor pAdenoX der Firma Clontech kloniert (=AdenoX/E2late-YB-1-IRES-E1A12S/E3 Δ 27593-31509,E4 Δ 33241-33875) .

Die Kassette CMV-E1B55k/IRES/E4orf6 wurde aus dem oben unter Xvir03 beschriebenen pShuttle mittels I-CeuI und PI-SceI herausgeschnitten und in den Vektor AdenoX/E2late-YB-1-IRES-E1A12S/E3 Δ 27593-31509,E4 Δ 33241-33875 eingefügt.

Anschließend wurde der Vektor mit Pac I linearisiert, in 293-Zellen transfiziert und das rekombinante Adenovirus XvirPSJL 1 bzw. 2, ohne die in der Fig. angegebenen Transgene, nach Herstellerangaben isoliert.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung und für den Fachmann im Lichte der vorliegenden Offenbarung durchführbar, dass für die Herstellung der erfindungsgemäßen, bevorzugterweise rekombinanten Adenoviren, insbesondere solche, welche die Kassetten E4orf6-IRES-E1B55k bzw. YB-1-IRES-E1A12S einzeln und/oder zusammen enthalten, auch andere Systeme verwendet werden können, z. B. das System AdEasy der Firma QBIOSYSTEMS. Zudem können die einzelnen Transgene innerhalb der Kassetten, insbesondere der jeweiligen Kassetten untereinander ausgetauscht werden.

Beispiel 17: Infektion von HeLa-Zellen mit Adenovirus dl520

Pro Schale wurden 100.000 HeLa-Zellen ausplattiert. Am nächsten Tag wurden die Zellen mit verschiedenen Konzentrationen (pfu/ml) von Adenovirus dl520 infiziert. Die Infektion erfolgte in 500 μ L serumfreiem DMEM-Medium für 1 h bei 37° C. Anschließend wurde das Infektionsmedium entfernt und durch 2 ml Vollmedium (10 % FKS/DMEM) ersetzt. Nach 3-5 Tagen erfolgte die Auswertung mit Hilfe einer Kristallviolett-färbung.

Das Ergebnis dieses Versuchs ist in der Abbildung 23 dargestellt. Das Adenovirus dl520 zeigt keine Lyse bei niedrigen MOIs (5-10 pfu/Zelle) bei Infektion von HeLa-Zellen, welche YB-1 nicht im Kern aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigt dl520 eine praktisch vollständige Lyse bei einer MOI (engl. multiplicity of infection) von 100-200 pfu pro Zelle und eine noch überwiegende Lyse bei einer MOI von 50 pfu pro Zelle. Daraus ergibt sich, dass dl520 und vergleichbare Viren, die bei höheren MOI's die adenoviralen Gene E1B55k und E4orf6 einzuschalten in der Lage sind, überexprimiertes bzw. dereguliertes YB-1 direkt oder indirekt in den Kern zu transportieren und somit eine Zelllyse zu induzieren.

Beispiel 18: Luziferase-Assay zur Bestimmung der E2-late Promoteraktivität

Es ist bekannt, dass YB-1 im Kern an den adenoviralen E2-late-Promotor bindet (Holm et al., JBC 2002, 277, 10427-10434) und sich dieser Promotor auch sehr gut für die Expression von Nukleinsäuren eignet. Die Verwendung des adenoviralen E2-late-Promotors wird insbesondere durch seine Regulierbarkeit durch YB-1 bestimmt, wobei YB-1 als positiver Effektor wirksam ist, d.h. der Promotor erst bei Anwesenheit von YB-1 im Kern aktiv ist. Insoweit ist der besagte adenovirale E2-late-Promotor hochselektiv regulierbar und somit in Systemen verwendbar, in denen YB-1 im Kern vorhanden ist und praktisch eine jegliche Expression der unter der Kontrolle des adenoviralen E2-late-Promotors stehenden Nukleinsäure verhindert für den Fall, dass YB-1 als Effektor bzw. Regulator im Kern nicht vorhanden ist. Der E2-Late Promotor weist 3 Y-Boxen (CCAAT) auf, welche eine Rolle bei der Aktivierung des E2-Gens spielen. Verschiedene E2-late-Promotorkonstrukte wurden hergestellt und auf ihre Spezifität und Aktivität hin untersucht. Die Untersuchungen wurden wie folgt durchgeführt.

Die Zelllinien EPG-257 RDB (epitheliales Magenkarzinom), bei der YB-1 im Kern vorliegt, HeLa (epitheliales Karzinom des Gebärmutterhalses) und U2OS (Osteosarkom) wurden in drei verschiedenen Zellkonzentrationen in 6 Kavitätenplatten ausgesät. Die Kavitäten, die am nächsten Tag eine 70%ige Konfluenz aufwiesen, wurden für die Transfektion verwendet: Für jede Kavität wurden 500 ng über SpinMiniprep (Qiagen) gereinigte Plasmid-DNA von den verschiedenen E2-late-Promotorkonstrukten in Luziferasevektoren (kommerziell erhältlich von der Firma Promega, Ausgangsplasmid: pGL3-enhancer) in 500 µl OptiMEM in ein 1,5 ml Schnappdeckelreaktionsgefäß gegeben und 5 µl DOTAP in 500 µl in ein weiteres

Schnappdeckelreaktionsgefäß. Beide Lösungen wurden vereint und gemischt. Für die Komplexbildung wurde das Gemisch für 30 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert. Die Zellen wurden dreimal mit PBS gespült und mit dem Transfektionsgemisch überschichtet. Die Platten wurden für 5 Stunden bei 37 °C inkubiert, anschließend wiederum dreimal mit PBS gespült und mit Vollmedium versehen.

Die Zellen wurden 48 h nach der Transfektion mit dem Luzifase Assay System –Kit von Promega (Cat. No. E1500) aufbereitet: Jedes Well wurde mit 500 µl Lysis-Puffer überschichtet, die Zellen nach 10 Minuten bei RT mit einer 1 ml Pipette vom Plattenboden abgespült und in 1,5 ml Schnappdeckelreaktionsgefäße überführt. Die Zellysate wurden anschließend bei 4 °C für 15 Minuten bei 14 000 U/min zentrifugiert. Jeweils 50 µl des Überstandes wurde mit 100 µl Luziferase-Substrat versetzt und mit Topcount (Firma Canberra-Packard GmbH 63303 Dreieich) Microplate Scintillation & Luminescence counter in schwarzen Platten mit 96 Wells bei einer Wellenlänge von 945 nm gemessen.

Die Proteinmessung erfolgte mit dem BCA Protein Assay Reagent Kit, Katalognummer 23227 (PIERCE, Rockford, Illinois, USA) bei 570 nm in einem Bioluminometer (bioluminTM 960) kinetic fluorescece/absorbance-Plattenlesegerät der Firma Molecular Dynamics. Die relativen Lichtsignale der Proben wurden auf die Proteinmenge berechnet (RLU/ µg Protein).

Es wurden die folgenden Plasmide verwendet: pGL3-Enhancer (Firma: Promega), aus dem der Enhancer mittels BamHI (2250 bp) und BsaBI (2003 bp) entfernt wurde diente als Leerkontrolle. In den Enhancer-losen pGL3-Vektor wurden die verschiedenen E2-Promoter Konstrukte über die Schnittstellen Apa I und Sac I in die MCS einkloniert. In den pGL3-Enhancer wurde der hCMV-Promoter mit Bgl II und Hind III einkloniert und diente als Positivkontrolle. Die Positivkontrolle erlaubte eine Abschätzung der Transfektionseffizienz und diente zudem als Referenzwert für die Luziferaseaktivität. Für jede Zelllinie wurde die CMV-Kontrolle gleich 100 % gesetzt und die durch die E2-Promotor-Konstrukte erzielte Enzymaktivität darauf bezogen und als Säulendiagramm in Fig. 24 dargestellt.

Die verschiedenen Konstrukte wurden wie folgt bezeichnet:

1. umfassend die Y-Box I, II und III entsprechend den Basen 25932 – 26179 bp (bezogen auf die Wildtyp-Adenovirus-Sequenz, siehe Auschnitt der nachfolgend angegebenen adenoviralen E2-Region)
2. umfassend die Y-Box II und III entsprechend den Basen 25932 – 26127 bp (bezogen auf die Wildtyp-Adenovirus-Sequenz, siehe Auschnitt der nachfolgend angegebenen adenoviralen E2-Region)
3. umfassend die Y-Box III entsprechend den Basen 25932 – 26004 bp (bezogen auf die Wildtyp-Adenovirus-Sequenz, siehe Auschnitt der nachfolgend angegebenen adenoviralen E2-Region)
4. umfassend keine Y-box, da Leerkontrolle

Auschnitt der adenoviralen E2-Region (entnommen aus Virology 1992, 186, 280-285)
 (Die YB-1 Bindungsstellen sind in Fettdruck gehalten):

25561 aggaactttatcctagagcgctcaggaatcttgcggccacctgctgtgcacttcctagc
 25621 gactttgtgccattaagtaccgcgaatgccctccgccgctttggggccactgctacctt
 25681 ctgcagctagccaactaccttgccctaccactctgacataatggaagacgtgagcggtgac
 25741 ggtctactggagtgtcactgtcgtgcaacctatgcacccgcaccgctccctggttgc
 25801 aattcgagctgcttaacgaaagtcaaattatcggtacctttgagctgcagggtccctcg
 25861 cctgacgaaaagtccgcggctccggggtgaaactcactccggggctgtggacgtcggct
 25921 taccttcgcaaattgtacctgaggactaccacgcccacgagattaggttctacgaaga**c**
 25981 **caat**cccgcccgccaaatcgggagcttaccgcctgcgtcattaccagggccacattctt
 26041 gg**ccaatt**gcaagccatcaacaaagcccgccaagagtttctgctacgaaagggacggggg
 26101 gtttacttggaacccagtcggcgaggagctcaac**ccaat**cccccgccgcccgcagccc
 26161 tatcagcagcagccgcgggcccttgcttcccaggatggcacccaaaaagaagctgcagct
 26221 gccgccgccaccacggacgaggaggaatactgggacagtcaggcagaggaggttttga
 26281 cgaggaggaggaggacatgatggaagactgggagagcctagacgaggaagcttccgaggt
 26341 cgaagaggtgtcagacgaaacaccgtcacccctcggtcgcattcccctcgccggcgcccca
 26401 gaaatcggaaccggttcagcatggctacaacctccgctcctcaggcgccgccggcact
 26461 gcccgttcgccgacccaaccgtagatgggacaccactggaaccaggggccggttaagtcaa
 26521 gcagccgccgccggttagcccaagagcaacaacagcgccaaggctaccgctcatggcgcg
 26581 gcacaagaacgccatagttgcttgcttgaagactgtgggggcaacatctccttcgccc

26641 ccgctttcttcttaccatcacggcgtggccttccccgtaacatcctgcattactaccg
26701 tcattctacagcccatactgcaccggcgaggcagcggcagcggcagcaacagcagcggcca
26761 cacagaagcaaaggcgaccggatagcaagactctgacaaagccaagaaatccacagcgg

(SEQ. ID. No. 8)

Die in der Figur 24 dargestellten Ergebnisse belegen eindrucksvoll, dass die einzelnen Promotor-Fragmente, welche unterschiedliche E2-late/Y-boxen enthalten, für die Expression von therapeutischen Transgenen in YB-1 kernpositiven Tumorzellen geeignet sind und somit als Promotoren im Sinne der vorliegenden Erfindung verwendet werden können.

Beispiel 19: Wirkung von adenoviral exprimiertem YB-1 auf Partikalfreisetzung

Humane Osteosarkomzellen (U2OS) wurden mit dem E1/E3-deletierten adenoviralen Vektor AdYB-1 und dem lediglich E1A-deletierten Ad312 mit einer MOI von 50 pfu/cell infiziert. AdYB-1 enthält in seinem Genom die für den zellulären Transkriptionsfaktor YB-1 codierende Sequenz und exprimiert so das Y-Box bindende Protein 1 (YB-1). Um die Freisetzung viraler Partikel in Form von 'plaque forming units' (pfu) nach der Infektion zu evaluieren, wurde zum einen nur der Nährmedium-Überstand und zum anderen der verbliebene Zellrasen 2 bzw. 5 Tage post infectionem isoliert. Die intrazellulären Partikel wurden durch 3-maliges 'thaw/freeze' freigesetzt. Die Partikelzahl wurde mit Hilfe eines Plaque Assay auf 293-Zellen ermittelt.

Das Ergebnis ist in Fig. 25 dargestellt, wobei die soliden Balken die intrazellulär verbliebenen viralen Partikel und die quergestreiften Balken die freigesetzten, extrazellulären viralen Partikel anzeigen.

Das in Fig. 25 dargestellte Ergebnis belegt, dass AdYB-1 insgesamt mehr pfu bildet als Ad312 und erheblich mehr Partikel freisetzt. Nach 5 Tagen zeigen die AdYB-1-infizierten Zellen im Gegensatz zu den Ad312-infizierten Zellen deutlich einen cytopathischen Effekt (CPE) an.

Beispiel 20: Replikation von Adenovirus in Zellen nach Gabe von Irinotecan

Um die Wirkung von Irinotecan auf die adenovirale Replikation zu bestimmen, wurden 10^6 -Tumorzellen U373 in 10 cm^2 Petrischalen ausplattiert. In einem ersten Ansatz erfolgte nach 24 h die Zugabe von $5\mu\text{M}$ Irinotecan. Nach wiederum 24 h wurden die Zellen mit 10 pfu/Zelle dl520 infiziert. Nach 3 Tagen Incubation ohne Irinotecan wurde die DNA gemäß der in Beispiel 10 beschriebenen Vorgehensweise isoliert.

In einem parallelen Ansatz wurden die solchermaßen angesetzten U373-Zellen nicht mit Irinotecan präinkubiert. Nach 48-stündiger Kultivierung der Zellen ohne Irinotecan wurden diese mit 10 pfu/Zelle dl520 infiziert und anschließend ohne Irinotecan für weitere 3 Tage inkubiert. Die DNA wurde wie oben beschreiben isoliert.

Anschließend wurden $2\mu\text{g}$ DNA mit dem Restriktionsenzym Kpn I verdaut und eine Southern Blot Analyse durchgeführt. Als Sonde diente ein mittels PCR hergestellter Abschnitt des adenoviralen Genoms (Position:22734-24235).

Das Ergebnis ist in Fig. 26 dargestellt. Fig. 26 zeigt, dass nach Inkubation mit Irinotecan die adenovirale Replikation in U 373 Zellen nach Behandlung mit Irinotecan (Bahn 2) gegenüber der unbehandelten Kontrolle, bei der keine Inkubation mit Irinotecan erfolgte (Bahn 1), stark erhöht ist. Das bedeutet, dass unter dem Einfluss von Irinotecan die adenovirale Replikation erhöht ist.

Beispiel 21: Replikation von Adenovirus in Zellen nach Gabe von Trichostatin A

Um die Wirkung von Trichostatin A auf die adenovirale Replikation zu bestimmen, wurden 10^6 -Tumorzellen U373 in 10 cm^2 Petrischalen ausplattiert. Nach 24 h erfolgte die Zugabe von 0, 0,25, 0,5 und $0,75\mu\text{M}$ Trichostatin. Nach wiederum 24 h wurden die Zellen mit 10 pfu/Zelle dl520 infiziert.

Nach 3 Tagen Inkubation im Medium ohne Trichostatin wurde die DNA isoliert. Anschließend wurden 2µg DNA mit dem Restriktionsenzym Kpn I verdaut und eine Southern Blot - Analyse durchgeführt. Als Sonde diente ein mittels PCR hergestellter Abschnitt des adenoviralen Genoms (Position:22734-24235).

Das Ergebnis ist in Fig. 27 dargestellt. Fig. 27 zeigt, dass nach Inkubation mit steigenden Konzentrationen an Trichostatin A die adenovirale Replikation in U 373 Zellen (Bahnen 2,3 und 4) gegenüber der unbehandelten Kontrolle, bei der keine Inkubation mit Trichostatin A erfolgte (Bahn 1), stark erhöht ist. Das bedeutet, dass unter dem Einfluss von Trichostatin A die adenovirale Replikation erhöht ist.

Beispiel 22: Beeinflussung der Expression des Coxsackievirus-Adenovirus-Rezeptors (CAR) auf U373 Zellen in Reaktion auf die Gabe von Trichostatin A

200.000 Zellen U373 wurden in 6-Loch-Platten ausplattiert. Nach 24 h wurden die Zellen mit 1 µM Trichostatin A für 24 h kultiviert. Nach wiederum 24 h wurden die Zellen isoliert. Anschließend erfolgte die Analyse der CAR-Expression nach Standardprotokoll mittels FACS-Analyse und dem primären Antikörper anti-CAR Klon RmcB der Firma Upstate und dem sekundären Antikörper Kaninchen-anti-Maus FITC (Firma DAKO).

Das Ergebnis ist in Fig. 28 dargestellt. Ohne Trichostatin-Behandlung waren 11,3 % der Zellen CAR-positiv, wohingegen nach Inkubation der Zellen mit 1µM Trichostatin 56, 2 % der Zellen CAR-positiv. Die Zahlen sind % der insgesamt im Test verwendeten Zellen.

Aus Fig. 28 kann somit entnommen werden, dass unter dem Einfluss des Histon-Deacetylase-Inhibitors Trichostatin A der für das Binden von Adenoviren wichtige Faktor CAR unter dem Einfluss von Trichostatin A im größeren Maße exprimiert wird bzw. verfügbar ist, was die Effizienz der Transfektion der solchermaßen behandelten Zellen erhöht.

Beispiel 23: Onkolyse von U373 Zellen durch Adenovirus nach Kombinationsbehandlung der Zellen mit Irinotecan und Trichostatin A.

Es wurden 200.000 U373-Zellen in 6-Loch Platten ausplattiert. Nach 24 h wurden entweder nur 2 μ M Irinotecan oder nur 1 μ M Trichostatin A oder 1 μ M Irinotecan + 0.5 μ M Trichostatin zum Medium zugegeben. Nach 24 h Inkubation wurden die Zellen mit 10, 20 und 30 pfu/Zelle dl520 infiziert. Nach 3-5 Tagen erfolgte die Auswertung mit Hilfe der Kristallviolett-färbung. Die Versuche wurden in doppelter Ausführung durchgeführt.

Das Ergebnis ist in Fig. 29 dargestellt. Die sechs in Panel 1 dargestellten Platten zeigen einen vollständigen Zellrasen, der durch die Inkubation mit einer Kombination von Irinotecan und Trichostatin A nicht beeinträchtigt wird, wie durch die Kristallviolett-färbung dargestellt. Die beiden nächsten Doppel-Löcher von Panel 1 zeigen den Zellrasen nach Infektion mit 10 bzw. 20 pfu/Zelle dl520. Auch bei diesen Bedingungen kommt es nicht zu einer Lyse der Zellen, was auf das Ausbleiben einer Replikation von dl520 zurückzuführen ist. Damit wird gezeigt, dass weder dl520 bei 10 und 20 pfu/Zelle noch 1 μ M Irinotecan + 0.5 μ M Trichostatin A alleine eine Zelllyse induzieren können.

Die weiteren in Fig. 29 dargestellten 6-Loch-Platten 2, 3 und 4, hierin auch als Panele 2, 3 und 4 bezeichnet, wurden grundsätzlich nach folgenden Schema behandelt. Die einzelnen Löcher wurden wie eingangs beschrieben mit U 373 Zellen beimpft und die Zellen darin kultiviert. Die Näpfe wurden, jeweils doppelt mit 10, 20 oder 30 pfu/Zelle dl 520 beimpft, wobei die Unterschiede der insgesamt drei 6-Loch-Platten in der Art der verwendeten Cytostatika bestand. Bei Panel 2 wurden 2 μ M Irinotecan, bei Panel 3 1 μ M Trichostatin A und bei Panel 4 1 μ M Irinotecan und 0,5 μ M Trichostatin A zu den einzelnen Löchern zugesetzt.

In der 6-Loch Platte 2 (Panel 2) mit 2 μ M Irinotecan werden die Zellen mit 30 pfu/Zelle dl520 lysiert. In der 6-Loch Platte 3 (Panel 3) mit 1 μ M Trichostatin A werden die Zellen bei 20 und 30 pfu/Zelle dl520 lysiert. In der 6-Loch Platte 4 (Panel 4) mit 1 μ M Irinotecan + 0.5 μ M Trichostatin A werden die Zellen dagegen bereits bei 10 pfu/Zelle dl520 lysiert.

Die in den Figs. 26 bis 29 in ihrem Ergebnis dargestellten Versuche zeigen, dass die Kombination bestehend aus Irinotecan + Trichostatin A + dl520 eine effektivere Zelllyse der Tumor-

zellen induziert als jede Substanz für sich alleine. Dies wird dadurch erreicht, dass Trichostatin A einerseits die CAR-Expression erhöht und somit die Infizierbarkeit der Zellen merklich verbessert. Andererseits wird durch Irinotecan YB-1 in den Zellkern transloziert und induziert somit eine verbesserte adenovirale Replikation. Zudem dient das zelluläre YB-1 nach Infektion mit dl520 der adenoviralen Replikation und steht für DNA-Reparaturvorgänge nicht mehr zur Verfügung. Je nach Betrachtungsweise führt dies zur verbesserten Wirksamkeit einerseits von dl520 und einer verbesserten Wirksamkeit der Cytostatika andererseits.

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen sowie den Zeichnungen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebigen Kombinationen für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

BOHMANN & LOOSEN

Anwaltssozietät

BOHMANN & LOOSEN, Sonnenstr. 8, 80331 München

Deutsches Patent- und Markenamt
80297 München

Patentanwalt – European Patent Attorney
Dr. Armin K. Bohmann, Dipl.-Biol.*¹

Rechtsanwalt
Peter Loosen, LL.M.²

*Zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Markenamt, Alicante
Professional Representation at the Community Trademark Office, Alicante

Zustelladresse:
Sonnenstr. 8
D-80331 München

Unser Zeichen
Our ref

H 10020

Ihr Zeichen
Your ref

Neuanmeldung
(Patent)

Datum
Date

München, 14. April 2004

Dr. Per Sonne Holm, Meisenstr. 27, 82256 Fürstenfeldbruck

Neue Adenoviren, dafür codierende Nukleinsäuren und deren Verwendung

Ansprüche

1. Adenovirus, der ein erstes Protein, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die ein E1B-Protein und ein E4-Protein umfasst, vor einem zweiten Protein, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die ein E1A-Protein umfasst, exprimiert.
2. Adenovirus nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Protein ein E1B-Protein, bevorzugterweise ein E1B55kD-Protein ist.
3. Adenovirus nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Protein ein E4-Protein, bevorzugterweise ein E4orf6-Protein ist.

¹Sonnenstr. 8 • D-80331 München • Tel.: 089/ 51 55 64 0 • FAX: 089/ 51 55 64 13 • e-mail: BOHMANN-LAW@t-online.de
²Schaafenstr. 43 • D-50676 Köln •

4. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Protein eine Kombination aus E1B-Protein und E4-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein und E4orf6-Protein ist.
5. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das E1A-Protein ein E1A12S-Protein ist.
6. Adenovirus, bevorzugterweise nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus mindestens eine Nukleinsäure umfasst, die für ein Protein codiert, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die E1B-Proteine, E4-Proteine und E1A-Proteine umfasst, wobei das mindestens eine Protein unter der Kontrolle eines Promotors steht, der verschieden ist von dem Promotor, der die Expression des Proteins in einem Wildtyp-Adenovirus steuert.
7. Adenovirus nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Protein ein E1B-Protein, bevorzugterweise ein E1B55kD-Protein ist.
8. Adenovirus nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Protein ein E4-Protein, bevorzugterweise ein E4orf6-Protein ist.
9. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Protein ein E1A-Protein, bevorzugterweise ein E1A12S-Protein ist.
10. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Protein eine Kombination aus E1B-Protein und E4-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein und E4orf6-Protein ist.
11. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Protein eine Kombination aus E1B-Protein und E1A-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein und E1A12S-Protein ist.

12. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Protein eine Kombination aus E4-Protein und E1A-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E4orf6-Protein und E1A12S-Protein ist.

13. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Protein eine Kombination aus E1B-Protein, E4-Protein und E1A-Protein, bevorzugterweise eine Kombination aus E1B55kD-Protein, E4orf6-Protein und E1A12S-Protein ist.

14. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Expression des E1B-Proteins von einem Promotor gesteuert wird, wobei der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der adenovirale Promotor verschieden ist von dem E1B-Promotor.

15. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Expression des E4-Proteins von einem Promotor gesteuert wird, wobei der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der adenovirale Promotor verschieden ist von dem E4-Promotor.

16. Adenovirus nach einem der Ansprüche 14 und 15, wobei der adenovirale Promotor der E1A-Promotor ist.

17. Adenovirus nach einem der Ansprüche 6 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Expression des E1A-Proteins von einem Promotor gesteuert wird, wobei der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der adenovirale Promotor verschieden ist von dem E1A-Promotor.

18. Adenovirus nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der die Expression des E1A-Proteins steuernde Promotor YB-1-gesteuert oder YB-1-regulierbar ist.

19. Adenovirus nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der die Expression des E1A-Proteins steuernde Promotor der adenovirale E2-late-Promotor ist.

20. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das E4-Protein, bevorzugterweise das E4orf6-Protein, und das E1B-Protein, bevorzugterweise das E1B55kD-Protein, unter der Kontrolle eines gleichen oder eines gemeinsamen Promotors stehen.

21. Adenovirus, bevorzugterweise nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus das Protein YB-1 durch mindestens ein adenovirales Protein im Zellkern bereitstellt oder die Bereitstellung von YB-1 im Zellkern durch mindestens ein adenovirales Protein vermittelt, wobei bevorzugterweise das adenovirale Protein verschieden ist von E1A.

22. Adenovirus, bevorzugterweise nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus das Protein YB-1 durch mindestens ein adenovirales Protein für die adenovirale Replikation bereitstellt oder die Bereitstellung von YB-1 für die adenovirale Replikation durch mindestens ein adenovirales Protein vermittelt, wobei bevorzugterweise das adenovirale Protein verschieden ist von E1A.

23. Adenovirus nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass das adenovirale Protein ein Komplex aus E4orf6 und E1B55kD ist.

24. Adenovirus, bevorzugterweise nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Nukleinsäure des Adenovirus zumindest eine funktional inaktive adenovirale Region aufweist, wobei die Region ausgewählt ist aus der Gruppe, die die E1-Region, die E3-Region, die E4-Region und Kombinationen davon umfasst.

25. Adenovirus nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Region die E1-Region ist.
26. Adenovirus nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Region die E3-Region ist.
27. Adenovirus nach einem der Ansprüche 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Region die E4-Region ist.
28. Adenovirus nach einem der Ansprüche 24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Region die E1-Region, die E3-Region und die E4-Region umfasst.
29. Adenovirus, bevorzugterweise nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus mindestens eine Expressionskassette umfasst, wobei die Expressionskassette mindestens einen Promotor und eine für ein adenovirales Protein codierende Nukleinsäure umfasst, wobei das adenovirale Protein ein E1B-Protein, bevorzugterweise ein E1B55kD-Protein ist.
30. Adenovirus nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor verschieden ist von dem E1B-Promotor.
31. Adenovirus nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei der Promotor verschieden ist vom E1B-Promotor.
32. Adenovirus, bevorzugterweise nach einem der Ansprüche 1 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus mindestens eine Expressionskassette umfasst, wobei die Expressionskassette mindestens einen Promotor und eine für ein adenovirales Protein codierende Nukleinsäure umfasst, wobei das adenovirale Protein ein E4-Protein, bevorzugterweise ein E4orf6-Protein ist.

33. Adenovirus nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor verschieden ist von dem E4-Promotor.

34. Adenovirus nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei die adenoviralen Promotoren verschieden sind von dem E4-Promotor.

35. Adenovirus nach einem der Ansprüche 29 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor der E1A-Promotor ist.

36. Adenovirus, bevorzugterweise nach einem der Ansprüche 1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus mindestens eine Expressionskassette umfasst, wobei die Expressionskassette mindestens einen Promotor und eine für ein adenovirales Protein codierende Nukleinsäure umfasst, wobei das adenovirale Protein ein E1A-Protein, bevorzugterweise ein E1A12S-Protein ist.

37. Adenovirus nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor verschieden ist von dem E1A-Promotor.

38. Adenovirus nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst.

39. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus eine Nukleinsäure umfasst, wobei die Nukleinsäure für YB-1 codiert.

40. Adenovirus nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, dass die für YB-1 codierende Nukleinsäure unter der Kontrolle eines Promotors steht, wobei der Promotor bevorzugterweise der E2-late-Promotor ist.

41. Adenovirus nach Anspruch 39 oder 40, dadurch gekennzeichnet, dass die für YB-1 codierende Nukleinsäure unter der Kontrolle eines Promotors steht, wobei der Promotor YB-1 abhängig ist bzw. YB-1-reguliert ist.
42. Adenovirus nach einem der Ansprüche 35 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass die für YB-1 codierende Nukleinsäure ein Teil der Expressionskassette umfassend eine für ein E1A-Protein codierende Nukleinsäure ist, bevorzugterweise eine für ein E1A 12S-Protein codierende Nukleinsäure ist.
43. Adenovirus nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass die für das E1A-Protein codierende Nukleinsäure von der für das YB-1 codierende Nukleinsäure durch eine IRES-Sequenz voneinander getrennt sind.
44. Adenovirus nach einem der Ansprüche 29 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass die für das E4-Protein, bevorzugterweise das E4orf6-Protein, codierende Nukleinsäure und die für das E1B-Protein, bevorzugterweise das E1B55kD-Protein, codierende Nukleinsäure in einer Expressionskassette enthalten sind, wobei bevorzugterweise die beiden codierenden Sequenzen durch eine IRES-Sequenz voneinander getrennt sind.
45. Adenovirus nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet, dass der Promotor der Expressionskassette ausgewählt ist aus der Gruppe, die Tumor-spezifische Promotoren, Organ-spezifische Promotoren, Gewebe-spezifische Promotoren, heterologe Promotoren und adenovirale Promotoren umfasst, wobei die adenoviralen Promotoren verschieden sind von dem E4-Promotor und verschieden sind von dem E1B-Promotor, bevorzugterweise verschieden sind von dem Wildtyp-E4-Promotor und verschieden sind von dem Wildtyp-E1B-Promotor.
46. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus eine Expressionskassette umfassend einen Promotor und eine Nukleinsäuresequenz umfasst, wobei die Nukleinsäuresequenz ausgewählt ist aus der Gruppe, die Aptamere, Ribozyme, Aptazyme, Antisense-Moleküle und siRNA umfasst.

47. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus eine Expressionskassette umfassend einen Promotor und eine Nukleinsäuresequenz umfasst, wobei die Nukleinsäuresequenz eine codierende Nukleinsäure ist, wobei die Nukleinsäure für ein Molekül codiert, das ausgewählt ist aus der Gruppe, die Peptide, Polypeptide, Protein, Antikaline, Antikörper und Antikörperfragmente umfasst.
48. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus eine Expressionskassette umfassend einen Promotor und eine Nukleinsäuresequenz umfasst, wobei die Nukleinsäuresequenz ausgewählt ist aus der Gruppe, die Apoptoseinduzierende Gene, Prodrug-Gene, Protease-Inhibitoren, Tumorsuppressorgene, Zytokine und Angiogenese-Inhibitoren umfasst.
49. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus ein rekombinanter Adenovirus ist.
50. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 49, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus eine Adenovirusmutante ist.
51. Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 50, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus replikationsdefizient ist.
52. Adenovirus nach Anspruch 51, dadurch gekennzeichnet, dass der Adenovirus replikationsfähig ist in Zellen, die dereguliertes YB-1 aufweisen oder die YB-1 im Zellkern aufweisen.
53. Adenovirus nach Anspruch 52, dadurch gekennzeichnet, dass die Zellen YB-1 Zellzyklus-unabhängig YB-1 im Kern aufweisen.
54. Nukleinsäure codierend für einen Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53.
55. Replikationssystem umfassend eine Nukleinsäure nach Anspruch 54 und eine Nukleinsäure eines Helfervirus, wobei die Nukleinsäure des Helfervirus eine oder mehrere der Expressionskassetten des Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53 umfasst.

56. Replikationssystem nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, dass dem Adenovirus oder der diesen codierenden Nukleinsäure die vom Helfervirus umfasste Expressionkassette fehlt.
57. Vektor umfassend eine Nukleinsäure nach Anspruch 54 und/oder ein Replikationssystem nach einem der Ansprüche 55 bis 56.
58. Vektor nach Anspruch 57, dadurch gekennzeichnet, dass der Vektor ein Expressionsvektor ist
59. Zelle umfassend einen Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53 und/oder eine Nukleinsäure nach Anspruch 54 und/oder ein Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56 und/oder einen Vektor nach Anspruch 57 oder 58.
60. Zelle nach Anspruch 59, dadurch gekennzeichnet, dass die Zelle eine eukaryontische Zelle, bevorzugterweise eine tierische Zelle, bevorzugterweise eine Säugtierzelle ist.
61. Zelle nach Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, dass die Säugtierzelle eine Zelle ist, die ausgewählt ist aus der Gruppe, die Zellen von Mäusen, Ratten, Meerschweinchen, Schweinen, Schafen, Ziegen, Rindern, Pferden, Hunden, Katzen und Menschen.
62. Organismus, bevorzugterweise ein Säugtierorganismus umfassend einen Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, eine Nukleinsäure nach Anspruch 54, ein Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, einen Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder eine Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61, wobei bevorzugterweise der Organismus ausgewählt ist aus der Gruppe, die Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde, Hunden und Katzen umfasst.
63. Verwendung eines Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, einer Nukleinsäure nach Anspruch 54, eines Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, eines Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder einer Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61 zur Replikation von Adenovirus, bevorzugterweise zur in vitro Replikation von Adenovirus.

64. Verwendung eines Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, einer Nukleinsäure nach Anspruch 54, eines Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, eines Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder einer Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61 zur Herstellung von Adenovirus, bevorzugterweise zur in vitro Herstellung von Adenovirus.

65. Verwendung eines Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, einer Nukleinsäure nach Anspruch 54, eines Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, eines Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder einer Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61 zur Expression von Genen, bevorzugterweise von Genen, die die Zelllyse fördern, bevorzugterweise die Zelllyse bei adenoviraler Replikation und/oder adenoviral vermittelter Zelllyse fördern.

66. Verwendung eines Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, einer Nukleinsäure nach Anspruch 54, eines Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, eines Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder einer Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61 zur Herstellung eines Medikamentes.

67. Verwendung nach einem der Ansprüche 63 bis 66, dadurch gekennzeichnet, dass die Zelle, in der der Adenovirus repliziert, YB-1 im Kern aufweist, bevorzugterweise YB-1 Zellzyklus-unabhängig im Kern aufweist.

68. Verwendung nach einem der Ansprüche 63 bis 66, dadurch gekennzeichnet, dass die Zelle, in der der Adenovirus repliziert, dereguliertes YB-1 aufweist.

69. Verwendung nach Anspruch 66, dadurch gekennzeichnet, dass das Medikament für die Behandlung von Tumorerkrankungen ist.

70. Verwendung nach Anspruch 69, dadurch gekennzeichnet, dass die Tumorerkrankung ausgewählt ist aus der Gruppe, die maligne Erkrankungen, Krebs, Krebserkrankungen und Tumoren umfasst.

71. Verwendung nach Anspruch 70, dadurch gekennzeichnet, dass die Tumoren ausgewählt sind aus der Gruppe, die solide, nichtsolide, maligne und benigne Tumoren umfasst.

72. Verwendung nach Anspruch einem der Ansprüche 69 bis 71, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen YB-1 im Kern aufweist, bevorzugterweise YB-1 Zellzyklus-unabhängig im Kern aufweist.

73. Verwendung nach Anspruch einem der Ansprüche 69 bis 72, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen dereguliertes YB-1 aufweist.

74. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 73, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen Rb-positiv oder Rb-negativ ist.

75. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 73, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der den Tumor ausbildenden Zellen eine Resistenz, bevorzugterweise eine Mehrfachresistenz gegen pharmakologische Wirkstoffe aufweisen.

76. Verwendung nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Resistenz eine Mehrfachresistenz ist.

77. Verwendung nach einem der Ansprüche 75 oder 76, dadurch gekennzeichnet, dass die Resistenz gegen Antitumormittel, bevorzugterweise gegen Zytostatika, gerichtet ist und/oder die Resistenz durch Bestrahlung bedingt wird.

77. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 76, dadurch gekennzeichnet, dass der Patient für den das Medikament bestimmt ist, eine Mehrzahl von Zellen aufweist, wobei die Zellen solche Zellen sind, wie in einem der Ansprüche 72 bis 76 beschrieben.

78. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 77, dadurch gekennzeichnet, dass das Medikament mindestens ein weiteres pharmazeutisch aktiven Mittels umfasst.

79. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 77, dadurch gekennzeichnet, dass das Medikament zusammen mit einem weiteren pharmazeutisch aktiven Mittel verabreicht wird oder werden soll.

80. Verwendung nach Anspruch 78 oder 79, dadurch gekennzeichnet, dass das weitere pharmazeutische Mittel ausgewählt ist aus der Gruppe, die Zytokine, Metalloproteinase-Inhibitoren, Angiogenese-Inhibitoren, Zytostatika, Tyrosinkinase-Inhibitoren und Zellzyklus-Inhibitoren umfasst.

81. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 77, dadurch gekennzeichnet, dass das Medikament vor, während oder nach einer Bestrahlung verabreicht wird.

82. Verwendung nach Anspruch 81, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlung zum Zwecke der Behandlung eines Tumors verabreicht wird.

83. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 82, dadurch gekennzeichnet, dass die Zelle oder der zu behandelnde Organismus einer Maßnahme unterzogen wird, wobei die Maßnahme aus der Gruppe ausgewählt ist, die Bestrahlung, Gabe von Zytostatika und Hyperthermie umfasst.

84. Verwendung nach einem der Ansprüche 69 bis 83, dadurch gekennzeichnet, dass die Maßnahme lokal oder systemisch angewandt wird.

85. Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlung mit energiereicher Strahlung erfolgt, bevorzugterweise mit einer Strahlung, wie sie bei der Behandlung von Tumorerkrankungen verwendet wird.

86. Verwendung eines Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, einer Nukleinsäure nach Anspruch 54, eines Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, eines Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder einer Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61, zur Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung einer Tumorerkrankungen, dadurch gekennzeichnet, dass die Tumorerkrankung ausgewählt ist aus der Gruppe, die Brusttumore, Knochentumore, Magentumore, Darmtumore, Gallenblasentumore,

Bauspeicheldrüsentumore, Lebertumore, Nierentumore, Gehirntumore, Eierstocktumore, Haut- und Hautanhangsorgantumore, Kopf-/Nackentumore, Gebärmuttertumore, Synovialtumore, Kehlkopftumore, Speiseröhrentumore, Zungentumore und Prostata Tumore, bevorzugterweise eine der vorstehenden Tumorerkrankungen, die wie in einem der vorangehenden Ansprüche beschrieben ausgeprägt ist.

87. Verwendung eines Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, einer Nukleinsäure nach Anspruch 54, eines Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, eines Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder einer Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61, zur Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung einer Tumorerkrankungen, wobei der tumor-spezifische Promotor ein solcher Promotor ist, der spezifisch ist für den Tumor, für den das Medikament verwendet wird.

88. Pharmazeutische Zusammensetzung umfassend einen Adenovirus nach einem der Ansprüche 1 bis 53, eine Nukleinsäure nach Anspruch 54, ein Replikationssystem nach Anspruch 55 oder 56, einen Vektor nach einem der Ansprüche 57 oder 58 oder eine Zelle nach einem der Ansprüche 59 bis 61, und optional ein pharmazeutisch geeignetes Trägermittel.

89. Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Medikament eine Kombination von mindestens zwei Mittel umfasst, wobei ein jedes Mittel einzeln und unabhängig aus der Gruppe ausgewählt ist, die Cytostatika umfasst.

90. Verwendung nach Anspruch 89, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei der Mittel an unterschiedlichen Zielmolekülen angreifen.

91. Verwendung nach Anspruch 90, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei der Mittel über einen unterschiedlichen Wirkmechanismus aktiv sind.

92. Verwendung nach einem der Ansprüche 89 bis 91, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel die Infizierbarkeit einer Zelle erhöht, in der das Virus repliziert.

93. Verwendung nach einem der Ansprüche 89 bis 92, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel die Verfügbarkeit einer Komponente der Zelle beeinflusst, bevorzugterweise die Verfügbarkeit der Komponente erhöht, wobei die Komponente die Aufnahme des Virus vermittelt.

94. Verwendung nach einem der Ansprüche 89 bis 93, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel den Transport von YB-1 in den Zellkern vermittelt, bevorzugterweise erhöht.

95. Verwendung nach einem der Ansprüche 89 bis 94, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel ein Histon-Deacylase-Inhibitor ist.

96. Verwendung nach Anspruch 95, dadurch gekennzeichnet, dass der Histon-Deacylase-Inhibitor aus der Gruppe ausgewählt ist, die Trichostatin A, FR 901228, MS-27-275, NVP-LAQ824, und PXD101 umfasst.

97. Verwendung nach einem der Ansprüche 89 bis 95, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel aus der Gruppe ausgewählt ist, die Trichostatin A, FR 901228, MS-27-275, NVP-LAQ824, und PXD101 umfasst.

98. Verwendung nach einem der Ansprüche 89 bis 97, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel ein Topoisomerase-Inhibitor ist.

99. Verwendung nach Anspruch 98, dadurch gekennzeichnet, dass der Topoisomerase-Inhibitor aus der Gruppe ausgewählt ist, die Camptothecin, SN-38, Topotecan, DX-8951f, Irinotecan 9-aminocamptothecin, 9-nitrocamptothecin umfasst.

100. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel Trichostatin A und Irinotecan umfasst.

101. Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Virus, insbesondere der Virus nach einem der vorangehenden Ansprüche, getrennt von den mindestens zwei Mitteln ist.

102. Verwendung nach Anspruch 68, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Einheitsdose des Virus von mindestens einer Einheitsdose von einem oder den mindestens zwei Mitteln getrennt ist.

103. Kit umfassend einen Virus, insbesondere einen Virus nach einem der vorangehenden Ansprüche, und mindestens zwei Mittel, wobei ein jedes Mittel einzeln und unabhängig aus der Gruppe ausgewählt ist, die Cytostatika umfasst.

Neue Adenoviren, dafür codierende Nukleinsäuren und deren Verwendung

Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Adenovirus, der ein erstes Protein, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die ein E1B-Protein und ein E4-Protein umfasst, vor einem zweiten Protein, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die ein E1A-Protein umfasst, exprimiert.

Fig. 1





Fig. 2




E1/E3-minus Ad5

Fig. 3

40 pfu/Zelle

10 pfu/Zelle

Nicht infiziert



Nicht infiziert

40 pfu/Zelle

10 pfu/Zelle

dl520

E1/E3-minus Ad5

Fig. 4




Fig. 5

nicht infiziert 20 pfu/Zelle



257RDB

U20S

Fig. 6


HeLa

U2OS

257RDB

181RDB


MCF-Adr





←
YB-1

Fig. 7



WT-AD5



dl520



dl1119/1131



pfu/ml

Fig. 8




Fig. 9





Fig. 10

Kontrolle:
Kein Daunorubicin



Daunorubicin:
40 ng/ml





Fig. 11

Kontrolle:
Kein Daunorubicin



Daunorubicin:
40 ng/ml




Fig. 12




Fig. 13

PBS

5×10^8 dl520




Fig. 14




Fig. 15





Fig. 16

Wildtyp Adenovirus



Xvir03




Fig. 17

Xvir03/01




Fig. 18A

Nicht infiziert 20 pfu Ad312 5 pfu Xvir03




Fig. 18B

Nicht infiziert 20 pfu Ad312 5 pfu Xvir03





Fig. 19


**Northern blot Analyse der E2-Gen
expression in Ad312 infizierten Zellen**

Wt-Ad5 Ad312, 50 pfu/cell

A-549 A-549 U2OS



**E2-früh-
Probe >**



**E2-spät
Probe >**

Fig. 20 Northern blot Analysis der E2-Gen Expression in infizierten Zellen




Fig. 21

XvirPSJL1





Fig. 22

XvirPSJL2

Apoptoseinduzierende-Gene
Prodrug-Gene, Protease-
inhibitoren
siRNA, Antisense, Ribozyme
Tumorsuppressor-Gene
Zytokine, Angiogenese-
Inhibitoren

Spez.
Prom.



●●
HeLa-Zellen infiziert mit dI520
unterschiedlicher MOI

Fig. 23




Fig. 24




Fig. 25





Fig. 26


●
●
U373 Zellen infiziert mit 10 pfu/Zelle
dl520 nach 24 h Inkubation
mit 5 μ M Irinotecan



Southern Blot Analyse

Fig. 27

**U373 Zellen infiziert mit 10 pfu/Zelle dl520
nach 24 h Inkubation mit steigender
Trichostatinkonzentrationen**




Southern Blot Analyse




**Facsanalyse: Car-Expression von U373 Zellen
nach 24h Inkubation mit Trichostatin**

Fig. 28



Onkolytischer Effekt von dl520 in 3373 Zellen in Kombination mit Irinotecan und Trichostatin

Fig. 29



Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP04/012931

International filing date: 15 November 2004 (15.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE
Number: 10 2004 018 117.9
Filing date: 14 April 2004 (14.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 March 2005 (14.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.